4. A vércukorszint a „C” személyben is csökken kissé a 90. percet követően. Mi magyarázza ezt?

……

5. Ez a vizsgálat még nem mutatja egyértelműen, hogy a „C” beteg I. vagy II. típusú cukorbetegségben szenved-e, azaz inzulinhiány, vagy a szénhidrát-anyagcsere általános zavara-e az ok. Mit kellene mérni a fenti kísérletben annak igazolására, hogy I. típusú cukorbetegség lépett-e fel? Mit tapasztalnánk ebben az esetben?

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

V. Szivacsok, laposférgek 10 pont

Hasonlítsa össze a szivacsok és a laposférgek tulajdonságait! A megfelelő betűjellel válaszoljon!

A) Szivacsok
B) Laposférgek
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	Elő- és középbelük van.	
2.	Kemotrófok.	
3.	Jellemző rájuk a kétnyílású bélcsatorna.	
4.	Egész testfelületükön át diffúzióval lélegeznek.	
5.	Ivartalan szaporodásuk bimbózás, sarjadzás.	
6.	Kehelyszemük a fénysugarak erősségét és irányát érzékeli.	
7.	Harántcsíkolt izomszövetük van.	
8.	Álszövetesek.	
9.	Élősködő fajaik is vannak.	
10.	Űrbelüket galléros ostoros sejtek bélelik.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen