
IX. Véradás 7 pont

A vércsoportok fölfedezője, Karl Landsteiner osztrák orvos vette észre, hogy a vérátömlesztésre szoruló betegek szervezete csak bizonyos személyektől (donoroktól) kapott vért fogad el, egyébként kicsapódik. Az ábrán összetapadt körök jelzik ezt az állapotot, míg a sikeres vérátömlesztés esetén működőképesen maradt vérsejteket különálló körök jelzik. Tételezzük fel, hogy a véradó csak vérsejteket ad, vérplazmát nem.



1. Egészítse ki a rajzot a két üresen hagyott cella kitöltésével! (2 pont)

2. Magyarázza meg az előző pontban kapott eredményt a „vércsoport-antigén” és az „antitest” fogalmak felhasználásával! A mondat első felében a tapasztalt jelenséget írja le, a második felében annak magyarázatát fogalmazza meg! (2 pont)

   Az első esetben (0 donor) ……..

   ……

   mert ……..

   ……

   A második esetben (AB donor) …….

   ……

   mert ……

   ……

3. A vörösvérsejtek kicsapódása súlyos következményekkel jár. Írja le ezen sejtek fő feladatát az emberi szervezetben!

……

……

A vérátömlesztés alapszabálya szerint ma mindenki a saját csoportjának megfelelő vért kaphat. Végszükségben azonban a táblázatnak megfelelően más lehetőségek is vannak.

4. Előfordulhat-e, hogy ilyen esetben egy A vércsoportú gyermek nem adhat vért a saját édesanyjának az AB0 vércsoportrendszer szerint? Ha igen: mely esetben? Ha nem: miért nem? Érveljen állítása mellett!

……

……

……

……

5. Bár anya és magzata nem mindig azonos vércsoportú, ez a különbség (az AB0 rendszer esetében) ritkán jelent problémát. Az Rh vércsoportrendszer esetében viszont előfordulhat összeférhetetlenség. Mely esetben?

…….

…….

…….

1.	2.	3.	4.	5.	összesen