
II. Mételyes csiga 10 pont

„ Juha mételyt legel a rossz lapályon”
Arany János: Tengerihántás

A májmétely a kérődző gazdaállat (például juh) epevezetékében 2-3 hónap alatt éri el ivarérettségét. Az egyedek kölcsönösen megtermékenyítik egymást, utódaik ezrei a fertőzött juh ürülékével kerülnek a külvilágba. A lárvák egyedfejlődésének egyik szakasza egy vízicsiga, a patakok vizében élő és táplálkozó törpe iszapcsiga szervezetében zajlik, ahol osztódással is képesek sokasodni. A lárvák a vízicsigát elpusztítva a kiáradt patakok vizéből a fűszálakra másznak és betokozódnak. Ha itt a legelésző állatok, különösen a kérődzők a mételyt is elfogyasztják, úgy a féreg a májukba, majd az epeutak falába kerül.
Hasonlítsa össze a laposférgek csoportjába tartozó májmétely és a törpe iszapcsiga testfelépítését és életmódját! A megfelelő betűjeleket írja az üres négyzetekbe! (5 pont)


A) májmétely
B) iszapcsiga
C) mindkettő
D) egyik sem

1.	Testfelépítése szelvényezetlen.	
2.	Bélcsatornája gazdagon elágazik.	
3.	Kérődzők testnedveivel táplálkozik.	
4.	Hajszálerek találhatók testében.	
5.	Bélcsatornája egynyílású.	



Májmétely bélrendszere

Hasonlítsa össze a szövegben szereplő három faj szaporodását! Az állítás számát írja a megfelelő helyre! (4 pont)



6. Egyedfejlődése során a gazdaállat vérében keringő szerves anyagokat hasznosítja.
7. Hímnős.
8. Csak ivaros úton szaporodik.
9. A zigóta két különböző egyed génállományát tartalmazza.

10. Egyetlen iszapcsiga szervezetében sok mételylárva fejlődhet. Miből állapítható meg, hogy ezek ivaros úton vagy ivartalan szaporodás eredményeként jöttek létre?

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen