I. Különleges lepkéink, a hangyaboglárkák 7 pont

A hangyaboglárka fajok jellegzetes életmenetet mutató lepkék. Táplálkozásukat jellemzi, hogy tápnövényspecialisták, azaz egy-egy fajuk lárvája általában egy-egy adott tápnövényt fogyaszt. A vérfű hangyaboglárka tápnövénye például a legelőkön gyakori őszi vérfű, a szürkés hangyaboglárkáé a kornistárnics. A lepkék petéiket a tápnövényük virágára, vagy azok közelébe a hajtásvégekre teszik le. A kikelő hernyók kezdetben a magkezdeményekkel táplálkoznak, majd néhány vedlést követően levetik magukat a talajra, ahonnan bizonyos hangyák (a Myrmica nemzetség különböző fajai) behurcolják őket fészkeikbe. A hangyabolyban egyes hangyaboglárka fajok, pl. a vérfű hangyaboglárka lárvái a hangyák lárváit és bábjait fogyasztják. A szürkés hangyaboglárka lárvái másképp táplálkoznak: a gazda hangyák dolgozói táplálják és nevelik fel őket. A szürkés hangyaboglárka hernyó édes nedvet választ ki, amelyet a hangyák szeretnek lenyalogatni.

Nevezze meg a következő populációk közötti kölcsönhatások típusát! Válaszait indokolja a szöveg alapján! (2+2 pont)

1. szürkés hangyaboglárka – Myrmica hangyafaj: …….

Indoklás: …….


2. vérfű hangyaboglárka – Myrmica hangyafaj: ……

Indoklás: …….



3. A szöveg alapján a gazdanövény virágának mely részében táplálkoznak kezdetben a kikelő hernyók?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A takarólevelekben
B) A porzóban
C) A termőben
D) A vacokban
E) A pártában



4. A szöveg alapján a gazdanövény virágának mely részében táplálkoznak kezdetben a kikelő hernyók?
Az ábra megfelelő betűjelét írja a négyzetbe!

A hangyaboglárka fajok veszélyeztettek, ezért védelem alatt állnak. Angliában egy fajuk ki is halt a legeltetés csökkenése miatt.

5. Indokolja, miért okozhatta a legeltetés megszűnése a hangyaboglárkafaj kihalását!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	összesen