
I. Füvek egymás közt 8 pont

Kutatók két fűfaj, a réti perje és az amerikai mézpázsit sótűrő képességét vizsgálták, azonos sűrűségben külön-külön vetve (monokultúrában) és vegyes vetés után is. A talajvíz sótartalmát literenként 2-2 grammal emelték, és minden esetben lemérték a területegységenként azonos időegység alatt kifejlődött biomassza tömegét. Minden mérést háromszor ismételtek meg, amit a grafikonon a körök, ill. négyzetek jelölnek. (A két grafikon skálázása eltérő.)



1. Olvassa le, hogy hányszor mérték összesen a réti perje biomasszáját a kísérletsorozat során!

   .....

2. Melyik faj biomasszája gyarapodott gyorsabban 0% NaCl koncentráció mellett monokultúrában?.....

3. Melyik faj biomasszája gyarapodott gyorsabban 0% NaCl koncentráció mellett vegyes vetésben? .....

Hasonlítsa össze a két fűfaj jellemzőit! A megfelelő betűjeleket írja az üres négyzetekbe!

A) a réti perje
B) az amerikai mézpázsit
C) mindkettő
D) egyik sem

4.	Monokultúrában a 4 g/dm^3 fölötti sókoncentráció gátolja a biomasszája növekedését.	
5.	Adott sókoncentráció mellett a vegyes vetés mindig csökkenti biomasszáját a monokultúrában mérthez képest.	
6.	Vegyes vetés esetén a növekvő sókoncentráció mellett bekövetkező biomasszája növekedését a csökkenő mértékű versengés magyarázza.	
7.	A környező talajvíz sótartalma befolyásolhatja gyökerének vízfelszívó képességét.	
8.	Vegyes vetésben a biomasszagörbe változását a közös NaCl forrásért folyó versengés magyarázza.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen