VI. A szklerózis multiplex 6 pont

1. Hozza kapcsolatba az ingerületvezetés mechanizmusának változását a szklerózis multiplex betegség kialakulásával! (2 pont)

.....

.....

A kutatók a következő adatokat gyűjtötték a szklerózis multiplex (SM) kialakulásáról:

- Az SM leggyakrabban 20 és 50 éves kor között alakul ki.
- Bevándorlók vizsgálata azt mutatta, hogy akik gyerekkorukban költöznek más kontinensre, azok a befogadó terület népességéhez hasonló valószínűséggel betegszenek meg szklerózis multiplexben, míg a felnőttkorukban kivándoroltak megbetegedésének valószínűsége az anyaországihoz hasonló.
- A betegség családi halmozódást mutat: a betegek gyermekeinek 15%-a maga is megbetegszik SM betegségben. Az egypetéjű ikrek egyikének SM betegsége esetén 30% az esélye, hogy a másik iker is mutatja a tüneteket, ez jóval magasabb, mint a közönséges testvérek körében.
- Az SM betegek között több a nő. A nő:férfi arány = 3:2.

2. Milyen következtetés vonható le a fenti tényekből? A megfelelő válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A szklerózis multiplex betegség kizárólag genetikai eredetű.
B) A szklerózis multiplex hirtelen, aktuális környezeti hatásra alakul ki.
C) A szklerózis multiplex betegség valószínűleg egygénes, domináns-recesszív módon öröklődik.
D) A szklerózis multiplex hajlama öröklődik.
E) A szklerózis multiplex kialakulásában meghatározó a fiatalkori környezet.

3. A fentiek alapján valószínűsíthető-e, hogy az SM betegség X ivari kromoszómához kötötten öröklődik? Válaszát indokolja!

.....

.....

4. Milyen célból vizsgálják az egypetéjű ikrek együttes megbetegedését?

.....

1.	2.	3.	4.	összesen