
V. Szemek, mindenható szemek… 11 pont

A retinaleválás viszonylag ritka szembetegség. Lényege, hogy az ideghártya elválik az alatta lévő rétegtől. A leválás órák alatt rosszabbodik. A beteg látótérkiesésre panaszkodik. Ha nem kezelik időben műtétesen, a beteg soha nem nyeri vissza a látását. Az 1. ábra az egészséges emberi szem részeit mutatja. A „C” a retina, a „D” annak egy részlete.



1. ábra

1. Mi a retina szerepe a látás folyamatában? A megfelelő betűjelekkel válaszoljon!

   A) Fénytörő közeg.
   B) A látás receptorsejtjei ülnek benne.
   C) Benne alakul ki az adekvát inger.
   D) Benne alakul ki és továbbítódik az ingerület.
   E) Benne alakul ki a látásérzet.

2. Nevezze meg a retinával az ínhártya irányából közvetlenül érintkező réteget és betűjelét! (2 pont)
   Neve: …….. Betűjele: ……

3. A retinát határoló réteg funkciójának leírásával magyarázza meg, hogy miért okozza a retina végleges pusztulását, ha elválik ettől a rétegtől és nem tapasztják vissza idejében?

   .....

   .....

Ha a leválás eléri a retina egy bizonyos pontját, akkor a beteg elveszti éleslátását.

4. Melyik ez a pontja a retinának? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A) A látóideg kilépési helye
B) A retina sugárizom felőli része
C) A vakfolt
D) A sárgafolt
E) A sugárizom


A retina leválásának rizikófaktora (kockázati tényezője) lehet a szemgolyó normálistól eltérő alakja, amely a 2.ábrán látható módon töréshibát okoz.

5. Írja le, mit jelent a „rizikófaktor” (kockázati tényező) kifejezés!

.....

.....

Tanulmányozza az ábrát, és egészítse ki a mondatokat!



2. ábra

A jobb oldali képen látható szem tengelye a normálisnál (6) ..... , ezért a szemlencsébe párhuzamosan érkező fénysugarak a retina (7) ..... metszik egymást. A keletkező töréshibát (8) ..... nevezzük. (9) ..... lencsetípusú szemüveggel orvosolható.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen