III. Kedvencünk, a sütőtök 12 pont

Télen az egyik legkedveltebb, könnyen hozzáférhető csemege a finom, omlós, édes sült tök. Őshazája Közép- és Dél-Amerika trópusi része. Olcsósága miatt a második világháborút követő szűkös esztendőkben néptáplálóknak számított. Szénhidráttartalma, karotin- és vitamintartalma is felülmúlja a többi tökfajtáét. Fehérje, rost és zsírtartalma elenyésző, de annál gazdagabb a különböző, A-, B-, C-, E-vitaminokban.
A sütőtök kifejezetten melegigényes növény, amit az is mutat, hogy az elvetett magjai csak 12 °C fölötti hőmérsékleten kezdenek el csírázni. A magvakat csak akkor érdemes elvetni, amikor fagyokkal már kevésbé kell számolni, tehát április végén. A kikelt növények ugyanis fagyérzékenyek, a virágok például már –0,5 °C-nál elfagynak. Szinte mindenütt megterem, még a laza homoktalajon, sőt a szikes földön is.

1. Válasszon ki a sütőtökben találhatók közül egy-egy zsírban, illetve vízben oldódó vitamint, és írja le, mi a hiány tünete! Az információkat írja a táblázat megfelelő cellájába! (4 pont)

	A vitamin neve	A vitaminhiány hatása
Zsírban oldódó		
Vízben oldódó		

2. Írja le a sütőtök egy olyan jellemzőjét, amely a származási helyére utal, és magyarázza meg az összefüggést!

.....

.....

A sütőtök húsának színét leginkább a nagy mennyiségű karotin okozza. Ez a vegyület a növények levelében is megtalálható, mert – egyéb színanyagokkal együtt – elengedhetetlen a fotoszintézishez.

3. Milyen szerepet játszik a fotoszintézisben a karotin és a többi színanyag?

.....

.....

4. Nevezze meg azt a szövetet, amely a fotoszintézis legjellemzőbb helye a sütőtök levelében!

.....

Mindegyik tökfélére jellemző, hogy mind hímivarú, mind nőivarú virágok megtalálhatók ugyanazon növény indáin, egymástól viszonylag nagy távolságban. A nőivarú virágok rendszerint a növény tövének közelében jelennek meg, alsó felükön apró, duzzadt „terméskezdeményt” fedezhetünk fel, ezekből fog kifejlődni a termés. A hímivarú virágok jóval hivalkodóbbak, és jellemzően hosszú, vékony kocsányon ülnek. A hímivarú virágokból jóval több van, mint nőivarú virágból és korábban is kezdenek szirmot bontani.
Az alábbi képeken tökvirágok láthatók, a jobb oldali képen mindkét típusú virág sziromleveleinek egy részét eltávolították, hogy láthatóvá váljék a virág belseje.





5. Melyik két állítás jellemző a tökre? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Virágainak többségéből termés fejlődik.
B) Virágai egyivarúak.
C) A növény kétlaki.
D) A növény egylaki.
E) Virágai kétivarúak.

6. A virág melyik része a szövegben említett „terméskezdemény”?

A) A porzó.
B) A bibe.
C) A csészelevél.
D) A magház.
E) A sziromlevél.

7. Melyik nagy növénycsoportba (növénytörzsbe) tartoznak a tökfélék? Támassza alá állítását a szöveg és/vagy a képek alapján!

.....

8. Indokolja, miért van szükség rovarok közreműködésére a sütőtök termésérleléséhez!

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen