V. Hazai kőrisfajok 6 pont

A Növényismeret című könyv a következő határozót írja a kőrisfajok meghatározására.

2 a A virágtakaró részben vagy egészében megvan. A levélkék szélesebbek (2-4 cm) ….. *3*
2 b A virágtakaró hiányzik, azaz a virág csupasz. A levélkék keskenyebbek (1-2 cm) ….. *4*
3 a A virágtakaró csésze és párta. Utóbbi illatos, sárgásfehér, a virágok dús virágzatban állnak. A rügy világosszürke, a kéreg is hasonló. Napos, meleg lejtőkön a bokorerdők egyik alkotója. **Virágos vagy mannakőris**
3 b A virágtakaró csak csésze, a virágzat dús. A rügy vörösbarna. Üde, nedves talajú erdőkben gyakran ültetik. Park- és sorfa is. Észak-amerikai eredetű. **Vörös kőris**
4 a Rügye fekete. A levélkék lándzsásak vagy szélesebbek, rendszerint begörbült fűrészfogasak. A virágzat bogas. Hegy- és dombvidéki üde erdőkben, Kis-Alföld árterein. **Magas kőris**
4 b Rügye barna. A levélkék keskeny lándzsásak, szélükön elálló fogasak. Virágzata egyszerű fürt. Égerlápok szélén, az Alföld ártéri ligeterdeiben gyakori. **Magyar kőris**

1. Melyik, a szövegben olvasható megjelenési bélyeg alapján lehet a három őshonos kőrisfajt egymástól könnyen, lombtalan és virágtalan állapotában elkülöníteni?

.....

2. A szöveg alapján írja az ökológiai mutatók előtti cellába a megfelelő kőrisfajok nevét!

Fajnév	T	W	TVÉ
	6	2	E
	5	5	GY/G

Hőigény (T): 5: lomberdő klíma, 6: szubmediterrán lomberdő
Vízigény (W): 2 – száraz, 5 – üde, 7 – nedves
Természetvédelmi érték (TVÉ): E – társulásalkotó, K – kísérő fajok, GY – gyomfajok, G – gazdasági növények

A magas kőrist az 1990-es években egy addig ismeretlen kórokozó, a *Chalara fraxinea* támadta meg, mely mára már jelentős károkat okozott a kőris állományaiban. A kórokozó növekedését a kutatók sötétben, burgonya-glükóz agar táptalajon vizsgálták. A kifejlődő fonalak (micélium) növekedésének ütemét bizonyos szerekkel csökkenteni lehetett.

3. A leírás alapján rendszertanilag mely nagy élőlénycsoportba (ország) tartozik a *Chalara fraxinea* nevű kórokozó? Indokolja válaszát!

.....

4. A leírtak figyelembevételével vázolja egy lehetséges kutatás tervét az erdőpusztulás mértékének enyhítésére!

.....

.....

5. Az eddigi tapasztalatok alapján a magas kőrisek néhány százaléka nem érzékeny az új betegségre. Az evolúciós változás melyik típusa indulhatott meg a hazai kőrisállományban a fertőzés hatására?

.....

1.	2.	3.	4.	5.	összesen