
II. Légúti szűkület 12 pont

„A COPD [krónikus obstruktív légúti betegség] a tüdőben lévő légutak tartós beszűkülésével (légúti szűkület) járó betegség, amely az egyik fő halálozási tényező világszerte. A betegség visszafordíthatatlan károsodásokat okoz […]. […] két fő csoportja a krónikus bronchitis (idült hörgőgyulladás) és a tüdőtágulás (emphysema). Előbbi esetén a gyulladt nyálkahártya és a csillószőrök mozgásának megbénulása okán alakulnak ki a tünetek, utóbbinál a gyulladás [következtében] a gázcserében részt vevő léghólyagocskák fokozatos pusztulása, összeolvadása történik meg. […]”



Az ábrán a légutak láthatók, valamint egy egészséges és egy tüdőtágulásban szenvedő beteg tüdejének mikroszkópos szerkezete.

1. A légzőrendszer részeit bemutató rajz melyik betűvel jelzett részei jelölik a légcsövet, a hörgőcskéket és a léghólyagocskákat? Írja a megfelelő betűjeleket a négyzetekbe! (3 pont)

Légcső: ☐ Hörgőcske: ☐ Léghólyagocska: ☐

Hasonlítsa össze a hörgőt a léghólyagocskával! Írja a megfelelő betűjelet az állítások mellé!

A) Hörgő
B) Léghólyagocska
C) Mindkettő
D) Egyik sem

2.	Falában simaizom található.	
3.	Falát egyrétegű laphám építi fel.	
4.	Részt vesz a gázcserében.	
5.	Aktív mozgása áramoltatja a levegőt a tüdőben.	

6. Mi a funkciója a szövegben említett csillószőröknek a légutakban?

A) A porszemcséket, egyéb idegen anyagokat a gége, garat felé hajtják a légutakból.
B) Az oxigén áramoltatásában működnek közre.
C) A porszemcséket, egyéb idegen anyagokat lefelé hajtják, hogy eltávolítsák a levegő útjából.
D) Felszívó felületet képeznek a tüdőben.
E) A köhögés kivitelezésében játszanak szerepet.

7. Indokolja meg, hogy miért szenved légszomjban a tüdőtágulásos beteg! (2 pont)

……

……

……

8. A tüdőtágulás legfőbb oka a dohányzás. Nevezzen meg *két* további betegséget, amelynek fontos rizikófaktora a dohányzás! (2 pont)

…… ……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen