
6. Mi jellemzi a *Clostridium botulinum* felépítő anyagcseréjét? Írja a megfelelő állítás betűjelét a négyzetbe!

A) Kemoautotróf
B) Kemoheterotróf
C) Fotoautotróf
D) A leírás alapján nem dönthető el.
E) Nincs felépítő anyagcseréje.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

V. Csírázó magvak 5 pont

Egy méter hosszú, egyik végén zárt üvegcsövet higannyal színültig töltünk, majd higannyal telt tálba nyílásával lefelé állítjuk. A higany a csőben kb. 76 cm magasságig ereszkedik le (Torricelli kísérlete). A csőbe 10–15 csírázó borsószemet (az ábrán *b* betűvel jelölve) juttatva, azok a higanyszint fölé emelkednek. A higanyoszlop kezdeti magasságát bejelöljük. 6–10 óra múlva a higanyszint csökkenését tapasztaljuk. A borsószemek mellé meszes vízzel átitatott szövetet (az ábrán *m* betűvel jelölve) juttatva a higanyszint hamarosan az eredeti magasságig emelkedik. A higany(gőz) nem befolyásolja a borsószemek életműködését.



1. Volt-e levegő a cső higany fölötti részében a kísérlet kezdetén? …..……

2. Melyik gáz fejlődése okozta a higanyszint csökkenését a borsószemek behelyezése után? ……

3. Mely folyamat magyarázza a csírázó borsószemek csőbe való behelyezését követően a higanyszint csökkenését? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Biológiai oxidáció
B) Alkoholos erjedés
C) A fotoszintézis sötét szakasza
D) Tejsavas erjedés
E) A fotoszintézis fényszakasza

4. Miből keletkezett a higanyszint változását okozó anyag?

A) Szén-dioxidból
B) Keményítőből
C) Vízből
D) Cellulózból
E) Oxigénmolekulákból

5. Miért okozta a meszes vízzel átitatott szövet a higanyszint változását a kísérletben?

……...

1.	2.	3.	4.	5.	összesen