
VII. Véres esetek 9 pont

Véralvadási zavar számos okból kialakulhat a szervezetünkben. Vérzékenységet okozhat például a vér bizonyos alakos (sejtes) elemeinek vagy egyes plazmafehérjéinek hiánya, illetve az ezeket termelő szervrész működési zavara. Szóba jöhet vitaminhiány is, továbbá a túl hosszú alvadási és protrombin idő (PI). Az alábbi ábrán megfigyelhető vérkenetben a vér sejtes elemeinek a típusai láthatók (betűkkel jelölve).



1. Melyik alakos elem csökkent mennyisége vezet vérzékenységhez? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

2. Hol képződnek a vér alakos elemei egy egészséges felnőtt ember szervezetében? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A. a vörös csontvelőben
   B. a sárga csontvelőben
   C. a májban
   D. a lépben
   E. a vesében

3. Hasonlítsa össze – egy egészséges emberi szervezetet alapul véve – az alábbi értékeket! Írja a megfelelő relációs jelet (>, =, <) a négyzetbe!

   protrombin idő hossza ☐ alvadási idő hossza

4. Nevezze meg azt a vérplazmafehérjét, amelynek hálózatos szerkezetűvé alakulását a trombin teszi lehetővé! .....

5. Melyik vitamin hiánya vezet véralvadási zavarhoz és vérzékenységhez? .....

A vérzékenység egyik típusa ivari kromoszómán, recesszíven öröklődik.

6. Mivel magyarázható, hogy a vérzékenység ezen típusa a férfiaknál lényegesen gyakoribb a populációkban, mint a nőknél?

   .....

   .....

7. Egy ideális populációban 2500 nő közül egynél figyelhető meg a vérzékenység ezen típusa. A nők hány százaléka heterozigóta ebben a populációban? Válaszában a számolás menetét is rögzítse! A választ két tizedesjegy pontossággal adja meg! (2 pont)

8. Ugyanebben a populációban a férfiak hány százaléka vérzékeny? .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen