e) Határozza meg a monszunszél fogalmát!

.....

.....

2 pont

11 pont


8. Oldja meg a földrajzi övezetességhez kapcsolódó feladatokat!

a) Állapítsa meg, hogy a következő fogalmak hogyan viszonyulnak egymáshoz a földrajzi övezetesség rendszerében! Tegyen relációs jeleket (>, =, <) a fogalmak közötti négyzetekbe!

öv ☐ övezet ☐ *terület*

2 pont

b) A térképvázlat alatt olvasható állítások a betűkkel jelölt tájakra vonatkoznak. Döntse el, hogy az egyes állításokhoz melyik táj kapcsolható! Írja ennek a betűjelét az állítás előtti pontozott vonalra! Az egyik állításhoz nem tartozik betű, írjon X –et ennek a sorszáma elé! *A térképen nem szerepel az Antarktisz.*



..... 1. A vidék jellemző természetes növényzete a bambuszerdő.

..... 2. A négy évszak nem egyenlő hosszú. Jellegzetessége az enyhe, csapadékos július és a forró, száraz december.

..... 3. Az év legnagyobb részében a passzát szélrendszer leszálló ága uralkodik itt.

..... 4. Itt mérik évről évre a legnagyobb abszolút hőingadozást a Földön.

..... 5. A kiegyenlített éghajlat változatos időjárást takar: kiadós esők és kék egű, derült időszakok, majd ködös napok váltakoznak.

..... 6. Az északi félgömb meleg-mérsékelt övében fekszik.

..... 7. Az évi csapadék 200-400 mm, ami döntően hó formájában hullik.

..... 8. A mállás feltételei hiányoznak, ezért váztalajok alakulhatnak ki.

..... 9. Az év legnagyobb részében a passzát szélrendszer felszálló ága alakítja az időjárást.

..... 10. Területén két évszak, a száraz és a nedves váltakozik.

10 pont	

c) Állítsa növekvő sorrendbe a megadott szempont alapján a térképvázlaton szereplő, a megadott betűkkel jelölt tájakat! Írja betűjelüket megfelelő sorrendben a négyzetekbe! *Pontot csak a három betű helyes sorrendje esetén kap.*

1. Az évi középhőmérséklet: **A, G, D**: ☐ → ☐ → ☐
2. Az évi csapadék mennyisége: **C, D, G:** ☐ → ☐ → ☐
3. A nappalok hossza június 22-én: **D, A, C**: ☐ → ☐ → ☐

3 pont	

15 pont	

9. Olvassa el az alábbi szövegrészleteket, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat!

A)
Ha a hullámok mély vízről sekélyebb vízre jutnak, akkor a vízrészecskék mind jobban a fenékhez súrlódnak. Ez abban nyilvánul meg, hogy a vízrészecskék nem tudják a körpályájukat leírni. […] A hullám elveszti szimmetrikus alakját, elülső lejtője meredekebbé válik, taraja kiszélesedik, és keresztülbukik az alatta lévő részeken.

B)
Meredek partokon ezzel szemben a vízrészecskék körpályája függőleges irányban torzul. A hullám röviden felmagasodik, és a sziklafalon toronymagasan felszökken.