


10 pont	

19 pont	

7. Oldja meg az Ázsia éghajlatával kapcsolatos feladatokat!

a) Ázsia éghajlatát tekintve a legváltozatosabb kontinens. Fekvéséből következően területén minden éghajlati övezet és szinte minden éghajlat megtalálható, a szabályos övezetességet (zonalitást) azonban több tényező is módosítja.

Nevezze meg az övezetességet módosító tényezőket! Segítségként a magyarázó térképvázlaton számokkal utaltunk ezekre.



1 .....

2 .....

3 .....

3 pont	

b) Ázsia nagy általánosságban három, alapvetően különböző éghajlatú területre osztható a Kis-Ázsiától a Himalájáig, és a Himalájától a Csendes-óceánig húzódó vonalak mentén. A határokat a térképvázlaton vastag szaggatott vonalakkal ábrázoltuk. E három különböző területet nagybetűvel (A, B, C) jelöltük a térképen.

Rendelje a területeket jelölő betűket a következő éghajlati jellemzők mellé, azaz írja az A, B és C betűket a táblázat első oszlopába a megfelelő helyre az évszakok jellemzői alapján!

Ázsia éghajlati területei	**Az évszakok jellemzői**		
	nyár	**tél**	**csapadék**
	forró	*enyhe*	*kevés, szárazság*
	meleg	*enyhe*	*bőséges, nyáron*
	hűvös	*hideg*	*kevés*

2 pont	

c) Az alábbiakban néhány ázsiai országról szóló leírást olvashat. Ezek alapján nevezze meg, hogy mely éghajlat lehet az uralkodó az adott országban! Írja az éghajlatok nevét a pontozott vonalra!

1. A szántóföldek felén rizst vetnek. A tengerpartokat jóformán mindenütt kókuszpálma ültetvények foglalják el. A kivitelre szánt termékek listáját a trópusi gyümölcsök egészítik ki. Nyáron a szigetek délnyugati partját sok csapadék öntözi, míg télen az északkeleti passzát kevés csapadékot szállít. Az év egy részében gyakori tájfunok elsősorban a part menti települések, lakosságát veszélyeztetik.

   .....

2. A sziget déli-délkeleti hegyvidékeinek a lejtőin a rizs mellett a tea, a dohány, a szója és a főzelékfélék termesztése jellemző. Az utóbbi időben gyorsan terebélyesedtek a mandarin-, a narancs- és gesztenyeültetvények is. Az országot júniusban délkeletről éri el a „baiu”, azaz az esős évszak. Beköszöntével akár 40 napot is meghaladó esős időszak veszi kezdetét.

   .....


3. Ehhez az éghajlathoz a gesztenyebarna mezőségi talaj és a füves puszta (sztyepp) kapcsolódik. A füves pusztát egy részét művelésbe fogták. A gesztenyebarna vagy fekete mezőségi talajon főként búzát és szemes takarmányt termesztenek. A termést azonban sokszor veszélyezteti az aszály. A legeltető állattartás ma is fontos. A jobb minőségű legelőkön szarvasmarhát, a ritkás, sovány pusztákon juhot és kecskét tartanak. Télen a hideg, száraz szél útját csak itt-ott állja egy-egy fa.

   .....


3 pont	


d) Tanulmányozza az alábbi éghajlati diagramokat, majd oldja meg a hozzájuk kapcsolódó feladatokat! *Az éghajlati diagramok az északi félgömbre vonatkoznak.*

A



B





Az alábbi állítások az A-val jelölt vagy a B-vel jelölt diagramra, illetve a diagramokhoz kapcsolható éghajlatokra vonatkozhatnak. Lehetnek olyan állítások, amelyek mindkettőre és olyanok is, amelyek egyikre sem vonatkoznak. Írja az állítások elé az A, B, C és D betűket az alábbiak szerint:

A) ha az állítás az **A-val** jelölt éghajlati diagramra, illetve éghajlatra igaz
B) ha az állítás a **B-vel** jelölt éghajlati diagramra, illetve éghajlatra igaz
C) ha az állítás az **A és a B** éghajlati diagramra, illetve éghajlatra egyaránt igaz
D) ha az állítás **egyik** éghajlati diagramra, illetve éghajlatra **sem** vonatkozik

..... 1. A leghidegebb téli és a legmelegebb nyári hónapok közötti hőmérséklet-különbség meghaladja a 25 ºC-ot.

..... 2. Ezen az éghajlaton több erősen nedves időszak különböztethető meg, amelyek között egy-egy szárazabb hónap van.

..... 3. Az évi középhőmérséklet meghaladja a 10 ºC-ot.

..... 4. A legkevesebb csapadék nyáron hullik.

..... 5. Legalább hat hónapban a csapadék mennyisége eléri a 100 mm-t.

..... 6. A meleg-mérsékelt övben előforduló éghajlat diagramja.

..... 7. A nedves kontinentális éghajlatra jellemző diagram.

7 pont	

15 pont	