
…… 4. Az évi napfénytartam Magyarországon ***A)*** *a Dél-Alföldön /* ***B)*** *az Észak-Alföldön* a legmagasabb.

…… 5. Magyarország folyóinak vízkészlete ***A)*** *sokszorosan meghaladja az ország területén lehullott csapadék mennyiségét /* ***B)*** *jelentősen kevesebb az ország területén lehullott csapadék mennyiségénél.*

5 pont	

14. Oldja meg a Magyarországgal kapcsolatos feladatokat a térképvázlat és saját ismeretei alapján! Írja a pontozott vonalakra a megfelelő topográfiai nevet, majd a nevek után a négyzetekbe a leíráshoz tartozó betűt, illetve számot! *Nem tud minden betűt és számot felhasználni. A térképvázlaton a betűk hegységeket, a számok városokat jelölnek.*



1. A döntően középidei mészkőből felépülő hegység karrmezőjéről (népies nevén ördögszántásáról), szőlőültetvényeiről és a déli lábánál található gyógyfürdőjéről nevezetes.

…… ☐

2. A Duna jobb partján fekvő hegység jellemzően andezitből épül fel.

…… ☐

3. A dolomitból, mészkőből és homokkőből felépülő hegység a Móri-árok tól keletre fekszik. Területén egykor barnakőszenet és bauxitot is bányásztak.

…… ☐

4. A város Magyarország legkisebb népességszámú megyeszékhelye. Lakosságának mintegy 5%-a német nemzetiségű. A település és környéke híres szőlőtermő vidék.

…… ☐

5. A Zalai-dombság területén fekvő város a (gumi)bitumengyártás mellett az önvezető és elektromos gépjárművekhez kapcsolódó innovációs központjáról és tesztpályájáról ismert.

…… ☐


10 pont	

15. Olvassa el a szemelvényt, majd oldja meg a feladatokat!

A Kiskunságban számos helyen alakulnak ki szikes tavak. Ezek sekély vízmélységű, de többnyire nagy kiterjedésű tavak, amelyek a szárazabb időszakokban kiszáradnak, majd a csapadékosabb években ismét megtelnek vízzel. Ilyen például a Kondor-tó, amely a csapadékosabb időszakokban 3-4 km hosszú, 1-1,5 km széles és 1 m körüli vízmélységű volt. A térségben azonban rövid idő alatt hat métert csökkent a talajvíz szintje, ezért a tó medre ma már száraz. A homokhátság vízellátásában a faültetés sem segít, sőt... A kutatások szerint a faültetvények többletpárologtató hatása is hozzájárult a talajvízszint csökkenéséhez, ezáltal a szárazodáshoz. Az éghajlatváltozásnak sokkal kevésbé látványos jelei is vannak, mint egy tó kiszáradása. A térség egyik jellemző élőhelye, a buckaközi lápvidék szinte teljesen eltűnt élővilágával együtt.

a) Állítsa sorba a Kiskunságban jellemző szikesedés szakaszait! Írja a részfolyamatok sorszámát a megfelelő négyzetekbe! *Csak hibátlan sorrend esetén kap pontot.*

1. a talajban a felszín irányába szivárgó víz oldatba viszi a talaj sóit
2. a magas hőmérséklet hatására fokozódik a párolgás
3. a felszínre szivárgó sós oldatokból a víz elpárolog, a só pedig a felszínen marad
4. a víz a talajvíz szintjétől a talajszemcsék közötti réseken keresztül a felszín irányába mozog



1 pont	