3. A dolomitból, mészkőből és homokkőből felépülő hegység a Móri-árok tól keletre fekszik. Területén egykor barnakőszenet és bauxitot is bányásztak.

…… ☐

4. A város Magyarország legkisebb népességszámú megyeszékhelye. Lakosságának mintegy 5%-a német nemzetiségű. A település és környéke híres szőlőtermő vidék.

…… ☐

5. A Zalai-dombság területén fekvő város a (gumi)bitumengyártás mellett az önvezető és elektromos gépjárművekhez kapcsolódó innovációs központjáról és tesztpályájáról ismert.

…… ☐


10 pont	

15. Olvassa el a szemelvényt, majd oldja meg a feladatokat!

A Kiskunságban számos helyen alakulnak ki szikes tavak. Ezek sekély vízmélységű, de többnyire nagy kiterjedésű tavak, amelyek a szárazabb időszakokban kiszáradnak, majd a csapadékosabb években ismét megtelnek vízzel. Ilyen például a Kondor-tó, amely a csapadékosabb időszakokban 3-4 km hosszú, 1-1,5 km széles és 1 m körüli vízmélységű volt. A térségben azonban rövid idő alatt hat métert csökkent a talajvíz szintje, ezért a tó medre ma már száraz. A homokhátság vízellátásában a faültetés sem segít, sőt... A kutatások szerint a faültetvények többletpárologtató hatása is hozzájárult a talajvízszint csökkenéséhez, ezáltal a szárazodáshoz. Az éghajlatváltozásnak sokkal kevésbé látványos jelei is vannak, mint egy tó kiszáradása. A térség egyik jellemző élőhelye, a buckaközi lápvidék szinte teljesen eltűnt élővilágával együtt.

a) Állítsa sorba a Kiskunságban jellemző szikesedés szakaszait! Írja a részfolyamatok sorszámát a megfelelő négyzetekbe! *Csak hibátlan sorrend esetén kap pontot.*

1. a talajban a felszín irányába szivárgó víz oldatba viszi a talaj sóit
2. a magas hőmérséklet hatására fokozódik a párolgás
3. a felszínre szivárgó sós oldatokból a víz elpárolog, a só pedig a felszínen marad
4. a víz a talajvíz szintjétől a talajszemcsék közötti réseken keresztül a felszín irányába mozog



1 pont	

b) Döntse el a leírás alapján, hogy melyik két növény élhet a szemelvényben bemutatott térségben! Írjon X-et a növények neve előtti cellába! *A feladat megoldásához nem kell a növényeket ismernie.*

	Növény	**A növény élőhelyének jellemzője**
	nyúlfarkfű	Többnyire dolomit- és mészkőterületek vékony talajjal.
	kisvirágú pozdor	Tavasszal víz borítja a felszínt, nyáron a talajvíz szintje 1 m-nél is mélyebbre süllyed.
	orvosi székfű	A talaj fehér színű, a terület korán, még tavasszal kiszárad, csak néhány növényfaj ad rajta csekély borítást.
	mocsári kosbor	Jellemző a tőzeg felhalmozódása, a virágos növények mellett gyakoriak a mohák is.

2 pont	

c) Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a kiskunsági Kondor-tóra vonatkozó megállapítások! Írjon **I** betűt az igaz, és **H** betűt a hamis megállapítások sorszáma elé!

……. 1. A talajvízszint süllyedése, a talaj csökkenő nedvesség-tartalma növeli az aszályhajlamot.

……. 2. A talajvízszint süllyedése növeli a talajvíztől függő felszíni víz utánpótlását, nő a belvízveszély.

……. 3. A Kondor-tó kiszáradását közvetve az is fokozhatta, hogy a levegő szén-dioxid-tartalma az elmúlt évtizedekben emelkedett.


……. 4. A Kondor-tó környékére telepített erdők káros hatással voltak a tóra, mert gyorsították annak kiszáradását.

……. 5. A talajvízszint csökkenése hozzájárult a Kondor-tó kiszáradásához.

……. 6. A Kondor-tó kiszáradásával számos élőlény élőhelye szűnt meg.

6 pont	

d) Tanulmányozza a diagramot, majd oldja meg a feladatokat!



Az 1961−1965-ös időszakhoz viszonyított talajvízszint változás és a tengerszint feletti magasság (méter) kapcsolata a Duna–Tisza közén

1. Mikor volt a legnagyobb mértékű a talajvízszint változás a 130 m tengerszint feletti magasságban az ábrázolt időszakban? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

   A) 1981–1985 között
   B) 1995–1999 között
   C) 2000–2004 között
   D) 2011-ben

2. Hány méter tengerszint feletti magasságban veszítette el a talaj a legtöbb nedvességet az ábrázolt időszakban? Karikázza be a helyes válasz betűjelét!

   A) 135 méter
   B) 115 méter
   C) 105 méter
   D) 85 méter

2 pont	

11 pont	