3. Nevezze meg azt a folyamatot, amely során egy kalderató medencéje létrejöhet!

……

1 pont	

4. Húzza alá annak az országnak a nevét, amelyben nem találkozhatunk hasonló vulkáni formakinccsel!

Amerikai Egyesült Államok *Svédország* *Japán* *Olaszország*

1 pont	

16 pont	

5. Oldja meg a levegőburokkal kapcsolatos feladatokat!

a) Olvassa el a szövegrészletet, majd a táblázat adatait felhasználva válaszoljon a kérdésekre!

Korán reggel indultunk az 1500 méteres tengerszint feletti magasságban kialakított táborhelyünkről a 4000 méteres hegycsúcs meghódítására. Műszereink ekkor 5 °C-ot és 71,42%-os relatív páratartalmat jeleztek. Felfelé haladva a hőmérséklet jelentősen csökkent. A szeles, hideg idő és az intenzív csapadékhullás ellen a kapucni sem nyújtott megfelelő védelmet. Mivel már sötétedett, úgy döntöttünk, hogy a legközelebbi menedékházban éjszakázunk. Ez a hegy túloldalán, 3000 méteres tengerszint feletti magasságban állt.

Az adott hőmérsékleten maximálisan befogadható vízgőz mennyisége											
°C	–25	–15	–10	0	5	10	15	20	25	30	40
g/m³	0,7	1,5	2	5	7	9	13	17	23	30	52

1. Hány gramm vízgőzt tartalmazott m^3-ként a kiindulóponton a levegő?
Írja le a számítás menetét is! Válaszát egész számra kerekítve adja meg!

A kiindulóponton 1 m^3 levegő …… gramm vízgőzt tartalmazott.

2 pont	

2. Hány méteres tengerszint feletti magasságban mutattak 100%-os relatív páratartalmat a műszerek?
Írja le a számítás menetét is! Válaszát egész számra kerekítve adja meg!

…… méteres tengerszint feletti magasságban mutattak 100%-os relatív páratartalmat a műszerek.

2 pont	

3. Hány °C volt a levegő hőmérséklete a hegy tetején?
Írja le a számítás menetét is!

A hegy tetején …… °C volt a levegő hőmérséklete.

3 pont	

4. Hány °C volt a levegő hőmérséklete hegy túloldalán álló menedékháznál?
Írja le a számítás menetét is!

A menedékháznál …… °C volt a levegő hőmérséklete.

3 pont	

b) Írja be a táblázatba a helyes (<, >, =) relációs jelet!

A légnyomás fordított hőrétegződés (hőmérsékleti inverzió) esetén egy adott hegység lábánál.		A légnyomás fordított hőrétegződés (hőmérsékleti inverzió) esetén ugyanazon hegység csúcsán.
A csapadékhullás időtartama melegfront esetén.		A csapadékhullás időtartama hidegfront esetén.
Egy forró övezeti sivatagban a napi hőingás értéke.		Egy forró övezeti sivatagban az évi közepes hőingás értéke.
A víz sugárzás-visszaverő képessége (albedója).		A jég sugárzás-visszaverő képessége (albedója).
A tenyészidőszak hossza az egyenlítői övben.		A tenyészidőszak hossza a valódi mérsékelt övben.
A nyugalomban lévő levegő hőmérsékletének változása a földfelszíntől távolodva100 méterenként.		A felemelkedő levegő hőmérsékletének átlagos változása a telítettség elérését követően 100 méterenként.
Egy ciklon közepén a földfelszín közelében mért légnyomás.		Egy anticiklon közepén a földfelszín közelében mért légnyomás.
Egy adott helyen mért évi közepes hőingás értéke.		Ugyanazon a helyen mért évi abszolút hőingás értéke.
A Nap maximális delelési magassága az év során az északi szélesség 10°-on.		A Nap maximális delelési magassága az év során az Egyenlítőn.
Az éjszaka hossza március 20-án az Északi sarkkörön.		Az éjszaka hossza március 20-án a Baktérítőn.

10 pont	

20 pont	