4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik molekulában található a legnagyobb kötésszög?

A) CF_4
B) SO_2
C) H_2S
D) PH_3
E) SiH_4

2. Melyik az a sor, amelyben mind a négy alapvető rácstípusra találunk példát?

A) K, N_2, NH_3, NaCl
B) SiO_2, Fe, Ne, NH_3
C) SiO_2, Ne, Zn, KCl
D) NH_3, NaCl, Si, Ne
E) MgO, NaCl, KCl, N_2

3. Melyik sor tartalmazza helyesen a vegyületeket növekvő forráspontjuk szerint?

A) Dietil-éter, etil-formiát, butanon, butanol, propánsav.
B) Dietil-éter, butanon, etil-formiát, butanol, propánsav.
C) Dietil-éter, etil-formiát, butanon, propánsav, butanol.
D) Etil-formiát, dietil-éter, butanon, propánsav, butanol.
E) Etil-formiát, dietil-éter, propánsav, butanon, butanol.

4. Melyik esetben viselkedik oxidálószerként a megadott vegyület?

A) A kén-dioxid, ha kén-hidrogénnel (H_2S) reagál.
B) A kén-hidrogén, ha jódoldattal reagál.
C) A kálium-jodid, ha vizes oldatban klórgázzal reagál.
D) A formaldehid, ha elvégezzük vele az ezüsttükörpróbát.
E) A szén-monoxid, ha vas(III)-oxiddal lép reakcióba.

5. Melyik esetben szennyezzük legkevésbé környezetünket?

A) A kimerült akkumulátort a szemetesbe helyezzük.
B) Szelektív hulladékgyűjtőbe műanyag poharat dobunk.
C) Autógumit elégetünk.
D) Trisóval vizet lágyítunk.
E) Ha benzollal hígított olajfestéket kenünk a kerítésre.

6. Melyik esetben fejlődik klórgáz az alábbiak közül?

A) Ha cinket reagáltatunk sósavval.
B) Ha kálium-klorid-oldathoz jódot adunk.
C) Ha kálium-permanganátot reagáltatunk sósavval.
D) Ha a nátrium-kloridot tömény kénsavval reagáltatjuk.
E) Ha hypohoz nátrium-hidroxid-oldatot öntünk.

7. Üvegmaratásra használható:

A) a kemény víz.
B) a tömény kénsav.
C) a sósav.
D) a királyvíz.
E) a hidrogén-fluorid-oldat.

7 pont		

5. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Maltóz
B) Szacharóz
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Összegképlete $C_{12}H_{22}O_{12}$.
2. Köznapi neve répacukor.
3. Gyűrűs molekulája 10 darab királis szénatomot tartalmaz.
4. Vízben jól oldódik.
5. Adja a Fehling-próbát.
6. Hidrogénkötés kialakítására képes.
7. Hidrolízisekor α-D-glükóz (is) keletkezik.
8. A keményítő hidrolízise során ez is képződik.
9. Észteresíthető.
10. A növényekben megtalálható.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

10 pont		