6. Az alábbiak közül melyik károsítja az élő szervezetet már kis mennyiségben is?

A) Benzol
B) Ecetsav
C) Ribóz
D) Glicerin
E) Glicin

6 pont	

3. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két rácstípust kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Ionrács (ionrácsos anyag)
B) Molekularács (molekularácsos anyag)
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	A legerősebb rácsösszetartó erő benne a hidrogénkötés.	
2.	Elemek kristályosodhatnak ilyen rácsban.	
3.	Vegyületek kristályosodhatnak ebben a rácsban.	
4.	Standard nyomáson alacsony olvadáspontú, sokszor könnyen szublimálódó anyagok.	
5.	Szilárd állapotban vezeti az elektromosságot.	
6.	Szobahőmérsékleten, standard nyomáson szilárd halmazállapotú anyagok.	
7.	Többségük vízben jól, apoláris oldószerben viszont nem oldódó anyag.	
8.	A szilícium-dioxid rácstípusa.	
9.	Rácspontjaiban ellentétes töltésű ionok vannak.	
10.	Keménysége általában kicsi.	

10 pont	