

判断推理





逻辑论证

归因论证

对比实验归因

另有他因质疑
在题干认为的原有原因之外，增加一个也可能导致结果的原因，从而降低原有原因成立的可能性。另有他因选项往往只是“将水搅混”，而并非完全否定原有原因。

选项特征

正确选项

回归实验，找到实验组和对照组的另一可能影响结果的不同点。

错误选项

未谈论原因、未分组的典型伪他因、“有些”类选项、实验瑕疵类选项。

“继发关联”的另有他因

A与B不存在因果关联，A与B均是其共同原因C导致的结果。

利用分组正确找到另有他因选项

题干中有多种实验分组方式时，根据最终的结论确定实验组和对照组，并根据正确的分组找出另有他因选项。

因果倒置质疑

是一种在相对确定的条件下把原因和结果相互颠倒，视结果为原因和视原因为结果而引起的谬误。

因果倒置和另有他因
力度比较

前者直接确定“不是此因”，后者一般只是“把水搅浑”，二者同时出现选“因果倒置”。

否定此因质疑

并不探讨题干中某结果的原因是什么，只是否定题干中认定的原因。

排除他因支持

排除其他可能影响结果的原因的可能性，让题干中认定的原因成为唯一的可能原因，从而进行支持。

逻辑论证

归因论证

时间对比归因

当前与以往相比出现某种变化，
并找到此种变化的可能原因。
此时，可通过找到当前与过去的另一点不同，
来进行他因削弱。

注意：

一直存在且无变化的事实不会是某种变化的原因，
“变化”才是“变化”的原因。

一般归因

没有明显的对比实验和时间对比，只针对某个既成事实进行归因（也可以看作是某种情况和其他情况的对比）。

直接根本原因

一般由原观点、反对者观点组成，
多数设问为质疑反对者。

正确答案一般为“原观点认为的原因”导致了“反对者认为的原因”，
即原观点是根本原因，反对者是直接原因。

构成或补充对比实验

构成对比实验

选项与题干分别为实验组和对照组，
通过“异因异果”进行支持（四圈支持）
或通过“异因同果”/“同因异果”进行质疑（三圈质疑）。

补充对比实验

选项本身即是一个对比实验，
通过对比实验结果进行支持或削弱。

逻辑论证

一般质疑

无论据有结论的一般质疑

题干常由“背景、分析和结论”构成，常用提出反向论据的方式反驳论点；注意话题一致，主体正确，贴合题干。

质疑论据

在论据存在错误时，可通过指出论据问题质疑，论据有误，自然推不出题干结论。
论据是个人观点、个人判断时，可能存在论据有误的错误。
另，对比实验归因题目可看作是特殊的“质疑论据”。

增加反向论据

很多时候，题干可能通过一些有利因素得出积极结论或通过一些不利因素得出消极结论，犯了考虑不全面的错误；有些时候，因少数样本得出普遍结论，犯了以偏概全的错误；针对上述问题，可通过增加反向论据来进行质疑。

有论据有结论的一般质疑

断点拆桥

若题干的论据和结论并不十分相关，根据论据推不出结论，犯了“推不出”的错误，可通过拆桥来进行质疑。

质疑结论中的“无中生有”

若题干结论中出现了程度较重的“无中生有”内容，可重点关注，进行质疑。

严谨逻辑关系的一般质疑

若题干的结论存在逻辑关联词（例如如果就、只有才、所有都等），可翻译为 $A \rightarrow B$ ，再在选项中寻找 A 且非 B ，少数题目可用 $A \rightarrow$ 非 B 代替 A 且非 B 进行质疑。

“ A 且非 B ”质疑 $A \rightarrow B$

“ $A \rightarrow$ 非 B ”质疑 $A \rightarrow B$

比例类论证

此类问题常犯的逻辑错误是用“分子的多少”代替“分子/分母的比例”得出结论，题干往往包含数字（分子部分），我们需要在选项中找到带“数字”的分母部分。

逻辑论证

支持、前提、解释

五种常见支持方式

解释说明

解释了为什么得到此结论，
读懂了该选项应有豁然开朗之感。
此类问题相对简单。

断点搭桥

若题干的结论中存在论据没有的“新内容”，
此新内容一定在选项中要有所体现，
并能够和论据中的关键信息进行搭桥。

“ $A \rightarrow B$ ”搭桥A和B

增加正向论据

若题干的论证存在漏洞，可通过增加正向论据补充漏洞来进行支持；
若题干的论证过程较完整，也可通过增加数据、事实等正向论据进行支持。

必要条件（反向代入）

此类选项一般没有极大的力度让结论肯定正确，
但却是结论成立的必要前提，属于“没他不行”选项，
缺了这类选项，整个推理过程必然失败。
可采用反向代入的办法验证选项，
若实际情况与选项相反，则必然得出题干的结论，
那么此选项就是结论成立的必要条件。

举例支持

一手最全公考资源加微信 SYA378

变化/比较的支持方式

用“变化”支持/解释“变化”，比较尽量说“两边”。

三种常见的前提假设

断点搭桥

补充漏洞

必要条件/能与不能

解释说明类

逻辑推理

推出推理

等价推出

指将题干逻辑关系和选项逻辑关系分别翻译后，二者完全一致。
常用知识点：
命题的传递和原命题与逆否命题
($a \rightarrow b$ 和非 $b \rightarrow$ 非 a 等价)

与题干等价

解题技巧

①若将题干翻译为 $A \rightarrow B$ ，
可以翻译为 $A \rightarrow B$ 或非 $B \rightarrow$ 非 A 为正确选项。
因此以 B 或者非 A （肯后或否前）
开头的选项可先排除。

②若题干有多个带有逻辑关联词的句子，
先不需要联立，有时答案只与一句有关。

③“ a, b ” “ $a、b$ ”，表示“ a 且 b ”，
不能写成“ $a \rightarrow b$ ”或“ $b \rightarrow a$ ”

与题干不等价

解题技巧

若题干只有一个逻辑关系，可直接翻译选项，
选项三个相同一个不同，直接选不同选项即可。

正推逆推

根据已知事实正推

解题技巧

无需将题干中多个命题联立，
根据已知事实，按照逻辑传递规则推出即可。

根据所需结果逆推

解题思路

首先将要得出的结论翻译到箭头后。
要想得到 C ，根据 $B \rightarrow C$ ，需要 B 成立，
要想得到 B ，根据 $A \rightarrow B$ ，需要 A 成立，
一步步逆推即可，
常考考点：
“ a 或 b ”的“否一推一”，即要想 a 成立，需要 b 不成立。

两难推理

解题方法

$A \rightarrow B$ 、非 $A \rightarrow B$ ，可推出 B 成立（可翻译成无论是否 A ，都会 B ）；
 $A \rightarrow B$ 、 $A \rightarrow$ 非 B ，可推出非 A 成立。

范畴推理

指的是根据直言命题（所有、有些、特指）
之间关系和性质进行推理的题目，
也包括判定各集合之间包含、交叉等关系的题目。

直言命题考察

集合关系考察



逻辑推理

逻辑基础知识点

一个符号两种条件

“一个推出符号表示两个条件”，
对于 $A \rightarrow B$ ，A是B的充分条件，B是A的必要条件。

命题形式与真假

命题的四种形式

原命题

逆命题

否命题

逆否命题

命题的真假

对于 $A \rightarrow B$ ，只有在A且非B时，
命题为假，其他情况均视为真

对于命题 $A \rightarrow B$ ，
若判断出A为假，则命题必然为真（对应3、4行），
若判断出B为真，则命题也必然为真（对应1、3行）

A 为真	B 为真	$A \rightarrow B$ 为真
A 为真	B 为假	$A \rightarrow B$ 为假
A 为假	B 为真	$A \rightarrow B$ 为真
A 为假	B 为假	$A \rightarrow B$ 为真

三种推理方式

演绎推理

从一般性的前提得出了特殊性的结论的推理

归纳推理

从个别到一般，从特殊性的前提推出普遍的一般结论

类比推理

从特殊性的前提得出特殊性的结论

逻辑推理

逻辑基础知识点

四种相对关系

或且关系

A或B 否定态：非A且非B

A且B 否定态：非A或非B

否定态转化

“所有A都是B”的否定为“有些A不是B”

“有些A是B”的否定为“所有A都不是B”

范畴关系

所有、有些、特指间的推出关系



“有些”的逻辑含义，与言语不同

“有些是”无法推出“有些不是”、
“有些A是B”可推出“有些B是A”

可能关系

可能 否定为“必然不是”

必然 否定为“可能不是”

A与B矛盾，则必然存在一真一假

矛盾关系

常见的矛盾关系

一是A和非A、A且B与非A或非B、A或B与非A且非B

二是所有和有些不（有些和所有不）、可能和必然不（必然和可能不）

三是 $A \rightarrow B$ 和 A 且非B

“所有”与“有些不”为矛盾，
“所有”与“特指不”（例如，“所有同学都是”和“小张同学不是”）为反对，可以同时为假。

逻辑推理

逻辑基础知识点

五种命题

- 如果A那么B
 - 逻辑关系为 $A \rightarrow B$ （前推后）
 - 类似的连接词：如果...就...、一...就...、只要...就...、若...就...等，“所有...都是...”表达的逻辑关系也是前推后
- 只有A才B
 - 逻辑关系为 $B \rightarrow A$ （后推前），也可记为“非A $\rightarrow$ 非B”（不不）
- 除非A否则B
 - 谜底就在谜面上，除（非A）否则（B），即非A $\rightarrow$ B
- 或者A或者B（A、B至少一个为真）
 - 等价于“非A $\rightarrow$ B”（否一推一），为相容选言命题，只有A、B都假才为假
 - A和B至多一个为真（即至少一个为假），可写为“非A或非B”
- 要么A要么B
 - 为不相容选言命题，A、B只能一真一假，不能同时为真或为假

图形推理

十五字口诀

定性分析

口诀：屈臣氏整风


什么时候考虑定性分析？

1、图形比较随意、具有生活化的特点，
比如：阴影、简笔画等。

2、图形比较凌乱、有不协调的图形，
代表考察数量的可能性不大，考察性质的可能性非常大。


存在曲线时可以考虑

有无曲线




屈一曲直性

全曲、全直、曲直



曲线数量



曲线（圆）与直线关系：相切相交相离



图形推理

十五字口诀

定性分析


一一对称性

出现对称提示时可考虑

对称性质




对称轴方向



对称轴数量



对称轴过点过线过面



多条对称轴位置关系



图形整体对称



图形推理


十五字口诀

定性分析


同一—相同相似

存在相同元素、非常凌乱时可以考虑


各图形间均存在同一元素



各图形内部存在相同元素或内外元素相似




相邻图形有相同相似元素



比较随意、凌乱的图形可以考虑


整—整体部分

整体图形与多部分图形



各个图形的部分数





图形推理

十五字口诀

定量分析


口诀：点线面角素

什么时候考虑定量分析？


- 1、图形越来越复杂，数量在增加，点、线很多。
- 2、图形规整且复杂。

包括曲直、曲曲、圈内、圈外交点等，
图形线多交叉多或存在圆，考虑点数量


曲直交点



十字交点




切点




点一点数量


内部交点




外框交点



拐点处特征





图形推理


十五字口诀

定量分析


面一面数量

封闭空间数、面积，
存在很多封闭空间时可考虑

封闭空间数



相同面数量



面的面积



存在修正图形、垂线、直角时可考虑


角一角数量

直角



锐角、钝角





图形推理

十五字口诀


位置分析

口诀：直接想位移

直—垂直平行关系

出现相似三角形、四边形时也需要考虑平行线组数

垂直平行关系




平行线组数




除了点连接、线连接也需要考虑连接处的线段数，
题干中存在简笔画时可考虑

接—连接方式


点连接、线连接




连接处特征



连接处线段数





图形推理


十五字口诀

位置分析


移—移动

移动的方式有旋转、翻转、内外圈不同的移动、固定数的移动，
递增的移动，当元素种类不变，出现位置变动时可考虑


上下、左右、圆周移动，步数可能不变或递增




内外圈双移动



旋转、翻转



图形重合后，去同存异或去异存同；
或者黑白块/点运算，
可能会和翻转、旋转结合考察



图形推理

四大类

对称图类

性质

图形是否为对称图形，包括中心对称和轴对称

Z、S、




数量

考察对称轴数量的变化




方向

图形以轴对称图形为主，一般只有一条对称轴



过点过线过面

对称轴经过原图形上交点、线段、封闭空间




位置关系

图形由两个或以上轴对称图形组成，
可考虑两条对称轴之间的平行、垂直等关系



整体对称

填入选项后，图形呈整体对称样式



图形推理


四大类

背景图类

“三大哥”


移动

背景图中所有图形轮廓相同
且元素数量基本一致
且元素数量远小于轮廓格子数量，
可以优先考虑背景图中的移动




叠加

背景图中图形轮廓相同
且元素数量不一致（参差不齐），
并且已知图形为“3×3”或“3+3”排列时，
可优先考虑叠加



部分数

背景图中黑点呈顶格状，接到外框上，
有一种切断的感觉，可考虑部分数




图形推理

四大类


背景图类

“六小弟”


笔 黑点或白点连成线条状




面 有清晰的一个图形轮廓，可考虑面积和周长




连 阴影位置存在点连接或线连接




报 图形比较杂乱分散，小黑块几几聚在一起，考虑抱团



对 所有图形黑格或白格分布规则，考虑对称



滴 所有图形每行（列）均有阴影且相邻图形相似，图形行列很多，一般在5×5以上，考虑递推



图形推理

四大类

分割图类


连接方式

图形中有一部分被标记，且与其他封闭空间连接




大小

被分割的各部分有明显的最大或最小图形




三不沾

中间图形与外部轮廓无公共点和公共边




边数

最大面、最小面、外部轮廓为规整的多边形，例如三角形、四边形、五边形等




对称

最大面、最小面或其他特殊空间为对称图形



相似

内部存在相同相似图形或内部与外部图形相似



图形推理

四大类

汉字类

文字结构

文字的左右、上下等结构

风 山 凶 匡 ?

笔画数、第一笔

文字差别较大时考虑

大 仁 主 吉 ?

为	文	房
王	龚	一
日	呈	?

偏旁部首、部分

有相同偏旁部首或部分可考虑

达 窝 顺 离 脑 ?

拼音

考虑拼音的一致

巴 参 ?

空间数量、部分数、横竖撇捺数量

有明显封闭面、部分时

屏	号	星
①	②	③
翟	真	知
④	⑤	⑥

山 明 归 引 品 ?

曲直性

有明显曲直差别时

曲 旧 王 丰 叵 ?

图形推理

六提示


平行组数

两个相同或相似三角形、轮廓自带平行线、N字型、Z字型、工字型、H字型




圆提示

各个图形均存在“圆（或曲线）”，
常见考点为圆内或圆上的交点数量、
圆内空间数、直线与圆的相交相切相离、
包围和半包围等




笔画数

出头、T点、分离、特殊字符（田、日、☆、奥迪车标等），
一笔画可用“吹捏”判断，
也可数奇点（发射奇数条射线的点、奇点数0或2为一笔画，
否则笔画数为奇点数的一半）



连接方式

简笔画图形，例如树叶、蜡烛




直角数

垂线、直角三角形、电话卡（修正图形）、矩形



数量加减

规整的外部轮廓，多为多边形；
只有两种元素组成；
存在“十”可考虑横竖线的数量关系。
多考察外部线条与内部点、线、面之和差



图形推理


立体展开图

六面体

理论知识


点连接面 (5-2 3-6) : 可绕公共点旋转
线连接面 (2-3 4-6) : 保持公共边不变
对立面 (1-3 2-4 5-6) : 永远不存在连接关系

母图




点连接面 (1-3 4-6) : 可绕公共点旋转
线连接面 (2-3 4-5) : 保持公共边不变
对立面 (1-4 2-5 3-6) : 永远不存在连接关系

变种1



点连接面 (3-56) : 可绕公共点旋转
线连接面 (1-2 3-4 5-6) : 保持公共边不变
对立面 (1-3 4-6 2-5) : 永远不存在连接关系

变种2



图形推理


立体展开图

六面体

解题三板斧


可通过对立面关系，排除不符合对立面条件的选项。
如，某选项中，应为对立面的两个面居然相邻，可迅速排除

一手最全公考资源加微信 SYA378



处理母图时，可将1直接平移至4的右侧（反之亦可），
且5、6均可随着1、4一起平移。

若5、6为中心对称图形，
则可直接平移两格
（若非中心对称图形，则需旋转180°）。




图形推理



立体展开图

四面体


理论知识



可沿三角形顶点进行旋转，变形为



1、4可以直接平移到另一边，变形为



解题方式

关注两连接面的公共边，注意公共边的顶点和底点。

图形推理


立体截面图

理论知识

1. 长方体截面

可截出来的图形：


锐角三角形、梯形、
平行四边形（包括长方形、正方形）、
非正五边形、六边形。



2. 圆柱截面

可截出来的图形：


正圆形、椭圆形、
椭圆形的部分（不可截出正圆形的部分）、
长方形（是否能截出正方形取决于圆柱体的高与直径之比）。



3. 圆锥截面

可截出来的图形：

圆形、等腰三角形、椭圆形、
椭圆形的部分（不可截出正圆形的部分）。



解题方法

一般可截出简单、规整的图形，“缺失”的部分一般也是规整图形。











注意：

- 1、选项所给截面图如果由两部分组成，注意两部分截面图的入刀角度是否一致。
- 2、把题干中不规整的立体图形还原成常见的立体图形（正方体、圆柱体、圆锥体），再进行判断。

图形推理

立体截面图

常见的截面

长方体	下刀方向	垂直	斜着 (从顶点或者从棱下刀)		斜着 (从顶面下刀)	
	截面形状	矩形 	三角形 (可以截出等腰三角形或者等边三角形，不能截出直角三角形) 		梯形 	
圆柱体	下刀方向	垂直 (顶面)	斜着 (顶底)	斜着 (侧面进刀，侧面出刀)	斜着 (侧面进刀，底面出刀)	水平 (侧面进刀，侧面出刀)
	截面形状	矩形 	酒桶形状 	椭圆 	半个椭圆 	圆 
圆锥体	下刀方向	垂直 (过顶点底面)	斜着 (侧面进刀，侧面出刀)	斜着 (侧面进刀，底面出刀)	水平	
	截面形状	三角形 	椭圆 	半个椭圆 	圆 	

图形推理

立体视图

立体视图可按方向分为：
主视图、后视图、左视图、右视图、
俯视图（从上看）、仰视图（从下看）
视图由轮廓+内部线条组成

轮廓


立体视图的外轮廓

内部

不平滑的“棱”产生的实线线条

立体拼合

立体拼合题，
一般出现的图形都是由小立方体堆叠成的。
通常需要从四个选项中选出能够和题干中
出现的部分图形拼合成整体图形的选项。



A

B

C

D

定义判断

解题原则

理解为王，可联系生活实际，找到现实所指，也可利用已有的相关知识与经验进行判断

整体解题思路

总体思想

定义判断更重理解，要站在一定高度上把握，可联系生活中的人或事或某种现象，试着猜测其现实所指；

切记定义判断不是“连连看”，找出一堆关键要素——对应，这样做的结果就是“只见树木不见森林”

单定义

抓住被定义词、主动理解被定义词

“被定义词”，才是最关键信息，试想，此定义有好多特征和要素，为什么选取其中一或两词作为其“名”，无其他原因，只因“名”里有最重要特征！

根据后续解释，修正对定义词的理解

特别关注主体、对象

特别关注特殊要求

多定义

注意一一对应

特别关注中心语

此类信息在被定义词中往往无法包含

特殊注意

属于、不属于一定分清，养成良好读题习惯，不属于题目的错误选项都是“例子”，可以借用例子理解定义

多定义或多情况定义要注意找一一对应，正确选项有时会完美对应定义结构

