

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Finančna matematika – 2. stopnja

Žan Kastelic
Random walks

Matematika z računalnikm

Mentor: prof. dr. Sergio Cabello Justo
Somentor: asist. Gašper Domen Romih

Ljubljana, 2012

1. OPIS IN PROGRAMSKO OKOLJE

Pogledali si bomo naključne sprehode na premici, ravnini in prostoru ter različnih družinah grafov z nekaterimi parametri (d-dimenzionalna mreža, neskončna d-pravilna drevesa, 2-pravilna drevesa višine d , d-dimenzionalna hiperkocka itd.). S simulacijo naključnih sprehodov se bomo sprehajali po takšnih objektih: simulirali bomo čas pokrivanja, čas zadetkov za različna oglišča, število obiskov oglišč, itd.

Za simulacije in izračune bom uporabil programsko okolje R.

2. NAKLJUČNI SPREHODI

Naj bo X slučajna spremenljivka porazdeljena kot

$$(1) \quad X_t \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}$$

za $t = 1, 2, \dots$, kjer je $p \in [0, 1]$. Če je $p = \frac{1}{2}$, pravimo, da je naključni sprehod simetričen. Naključni sprehod sledi kumulativni vsoti teh naključnih spremenljivk, kar lahko zapišemo kot

$$(2) \quad S_t = \sum_{k=1}^t X_k,$$

kjer je

$$S_0 = 0.$$

Poglejmo si najprej naključen sprehod po celih številih. Iz verjetnosti vemo, da naključni sprehod spada med markovske procese. Naj bosta $a, b > 0, a, b \in \mathbb{N}$. Naj bo b zgornja meja, $-a$ pa spodnja meja. Potem velja:

$$(3) \quad P(S_t = b) = \begin{cases} \frac{a}{a+b} & \text{če je } p = \frac{1}{2}, \\ \frac{1 - (\frac{q}{p})^a}{1 - (\frac{q}{p})^{a+b}} & \text{če je } p \neq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

oziroma

$$(4) \quad P(S_t = -a) = \begin{cases} \frac{b}{a+b} & \text{če je } p = \frac{1}{2}, \\ \frac{1 - (\frac{q}{p})^b}{1 - (\frac{q}{p})^{a+b}} & \text{če je } p \neq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

2.1. Simetrični naključni sprehodi. Poglejmo si najprej eno simulacijo simetričnega naključnega sprehoda, torej $p = \frac{1}{2}$. Da lahko dodamo še časovno komponento zarotirajmo os tako, da bo na abscisni osi čas, na ordinatni pa vrednost slučajnega sprehoda. Za spodnjo mejo si izberemo -5 , za zgornjo pa 5 .


S slike 1 razberemo, da smo prej dosegli spodnjo mejo in da smo za to potrebovali 40 korakov. Simulirajmo sedaj 10.000 sprehodov z zgornjo mejo 25 in spodnjo mejo -25 .

Zaradi velikega števila sprehodov so na sliki 2 sprehodi obarvani. Sprehodi, ki dosežejo zgornjo mejo, so obarvani z modro, ostali pa z oranžno. Simulacije sprehodov se med seboj razlikujejo tudi po svetlosti - tisti bolj temni prej dosežejo mejo, kot svetlejši.

Poglejmo si verjetnost, da prej dosežemo zgornjo mejo - preverimo torej, če drži formula (3).

S pomočjo slike 3 se lahko prepričamo, da zgornja formula (3) drži. Če je $p = \frac{1}{2}$, $-a = -25, b = 25$ je verjetnost enaka 0.5. Simulirana vrednost pa znaša 0.5063.

Poglejmo si še primer, ko sta a in b različna. Naj bo $-a = -17$ in $b = 24$.



SLIKA 1. Simetrični naključni sprehod.

S slike 4 opazimo, da je spodnja meja dosežena večkrat kot zgornja. To je povsem smiselno, saj je manj oddaljena od izhodišča. Formula nam pove (3), da je verjetnost, da prej dosežemo zgornjo mejo enaka $\frac{17}{17+24} = \frac{17}{41} \approx 0.4146341$.

Simulirana vrednost znaša 0.4223, kar nam prikazuje slika 5.

2.2. Nesimetrični naključni sprehodi. Sem spadajo vsi naključni sprehodi katerih p je različen od $\frac{1}{2}$.

Poglejmo si simulacijo 10.000 naključnih sprehodov, kjer je $p = \frac{3}{4}$. Za spodnjo mejo vzemimo -4 , za zgornjo pa 36 .


V konkretnem primeru je bila zgornja meja dosežena kar 9875-krat. Kolikokrat in v koliko korakih je bila meja dosežena, si bomo pogledali v naslednjem razdelku. Poglejmo si še verjetnost, da pri danem p -ju prej dosežemo zgornjo mejo. Formula 3 nam da

$$\frac{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^a}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^{a+b}} = \frac{1 - \left(\frac{0.25}{0.75}\right)^4}{1 - \left(\frac{0.25}{0.75}\right)^{4+36}} = \frac{80}{81} \approx 0.98765.$$


S pomočjo simulacije dobimo 0.9875 kar je zelo dober približek.

3. PRIČAKOVANO ŠTEVILO KORAKOV ZADETJA MEJE

3.1. Simetrični sprehod. Naj bo $T = T_{-a} \wedge T_b$ čas ustavljanja, kjer sta $T_{-a} = \inf\{t \geq 0 | S_t = -a\}$ oziroma $T_b = \inf\{t \geq 0 | S_t = b\}$. Koliko korakov bomo naredili



SLIKA 2. 10.000 naključnih simetričnih sprehodov.



SLIKA 3. Verjetnost, da prej dosežemo zgornjo mejo.


v povprečju, preden zadanemo a oziroma b ? S predavanj pri predmetih Verjetnost 2 in Finančna matematika vemo, da velja

$$E(T) = a \cdot b.$$


Če se spomnimo primera, kjer je bila spodnja meja -25 in zgornja meja tudi 25 , je torej $E(T) = 625$. S pomomčjo simulacije dobimo 625.328 .

Iz tabele 2 je razvidno, da simulacije podajo kar dober približek.

3.2. Nesimetrični sprehod.



SLIKA 4. 10.000 naključnih sprehodov.




SLIKA 5. Verjetnost, da prej dosežemo zgornjo mejo.


3.3. Pričakovana vrednost kumulativne vsote.

3.3.1. Simetrični sprehod. Vemo, da velja

$$E(X_i) = 0.$$



SLIKA 6. 10.000 nesimetričnih naključnih sprehodov.



SLIKA 7. Verjetnost, da prej dosežemo zgornjo mejo.

Potem je

$$\begin{aligned}
 E(S_n) &= E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \\
 &= \sum_{i=1}^n E(X_i) \\
 &= \sum_{i=1}^n 0 \\
 &= 0.
 \end{aligned}
 \tag{5}$$

| število korakov: 10.000 | Pričakovano št. korakov | Št. korakov v simulaciji |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| $a = -5, b = 5$ | 25 | 25.0814 |
| $a = -10, b = 10$ | 100 | 100.1404 |
| $a = -7, b = 18$ | 126 | 126.2341 |
| $a = -20, b = 17$ | 340 | 340.3122 |
| $a = -25, b = 25$ | 625 | 625.328 |

TABELA 1. Tabela simulacij pričakovanih vrednosti.

| število korakov: 10.000 $p = 0.61$ | Pričakovano št. korakov | Št. korakov v simulaciji |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| $a = -5, b = 5$ | ?? | 18.1628 |
| $a = -10, b = 10$ | ?? | 44.9518 |
| $a = -7, b = 18$ | ?? | 76.9416 |
| $a = -20, b = 17$ | ?? | 77.1638 |
| $a = -25, b = 25$ | ?? | 113.7568 |
| $a = -5, b = 25$ | ?? | 98.8776 |

TABELA 2. Tabela simulacij pričakovanih vrednosti.

3.3.2. *Nesimetrični sprehod.* Izpeljimo formulo za nesimetrični sprehod: vemo, da je:


$$E(X_i) = p \cdot 1 + q \cdot (-1) = 2p - 1.$$

Računamo naprej:

$$\begin{aligned}
 (6) \quad E(S_n) &= E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \\
 &= \sum_{i=1}^n E(X_i) \\
 &= \sum_{i=1}^n (2p - 1) \\
 &= n(2p - 1).
 \end{aligned}$$

4. NAKLJUČNI SPREHOD V RAVNINI S CELIMI ŠTEVILI

4.1. **Simetrični sprehod.** Simetričen sprehod v ravnini se začne v točki $(0,0)$ in gre z verjetnostjo $p = 0.25$ gor, dol, levo ali desno.




SLIKA 8. Naključni simetrični sprehod v ravnini.

Na sliki 10 je prikazan simetričen sprehod po 100 korakih.

4.2. **Nesimetrični sprehod.**

5. NAKLJUČNI SPREHOD V PROSTORU S CELIMI ŠTEVILI



SLIKA 9. Naključni simetrični sprehod v prostoru.

5.1. **Simetrični sprehod.** Še HTML datoteka


5.2. Nesimetrični sprehod.

6. NAKLJUČNI SPREHOD V GEOMETRIJSKIH TELESIH

6.1. **Kocka.** Brez škode za splošnost lahko sprehod v kocki začnemo v kateremkoli oglišču (npr. v 1). V vsako sosednje oglišče (v tem primeru 2,4 ali 5) lahko skočimo z verjetnostjo $\frac{1}{3}$ in tako naprej. Poglejmo si nek naključen sprehod po kocki

1, 2, 3, 2, 6, 5, 8, 4, 3, 2, 6, 2, 6, 5, 1.

Izračunajmo pričakovani čas vrnitve. Iz verjetnosti vemo, da je pričakovani čas 8 korakov.



SLIKA 10. Predstavitev kocke v programu R.

Izračunajmo pričakovani čas vrnitve. Iz verjetnosti vemo, da je pričakovani čas 8 korakov.

| Število simulacij | Pričakovano št. korakov do vrnitve |
|-------------------|---------------------------------------|
| 5 | 6.8 |
| 10 | 11.2 |
| 15 | 8.8 |
| 20 | 6.7 |
| 30 | 7.6 |
| 100 | 7.68 |
| 500 | 8.024 |
| 1000 | 7.918 |
| 10000 | 8.0252 |

TABELA 3. Tabela simulacij pričakovanih vrednosti vrnitve.

Iz tabele 4 lahko opazimo, da zadeva relativno hitro skonvergira in lahko verjamemo, da je pričakovan čas vrnitve v izhodišče enak 8.

Poglejmo si pričakovan čas, ko obiščemo vsa vozlišča. Spet lahko začnemo v 1:

1, 4, 8, 5, 8, 4, 8, 5, 6, 2, 3, 4, 8, 5, 1, 5, 8, 7.

Ko prvič zagledamo vsa različna oglišča nehamo šteti. Matematični izračun je kompleksen, zato verjemimo simulacijam.

| Število simulacij | Pričakovano št. korakov do vrnitve |
|-------------------|---------------------------------------|
| 10 | 24.6 |
| 100 | 19.36 |
| 1000 | 21.495 |
| 10000 | 21.2305 |

TABELA 4. Tabela simulacij pričakovanih vrednosti obsika vseh oglišč.