



૧૦ સપ્ટેમ્બર થી ૧૬ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૪ દરમ્યાન કપાસની ખેતી પધ્ધતિ માટે ૧૪ મી અઠવાડિક સલાહ

ગુજરાત		છેલ્લા અઠવાડિયામાં પડેલ ખરેખર વરસાદ (મીમી)					આગામી અઠવાડિયા માટે સુચિત / પુર્વાનુમાન વરસાદ (મીમી)				
		સપ્ટેમ્બર					સપ્ટેમ્બર				
		૦૬	૦૭	૦૮	૦૯	૧૦	૧૨	૧૩	૧૪	૧૫	૧૬
	અમરેલી	૩૧.૮	૦	૦	૨		૦.૨	૦.૬	૦.૬	૧.૩	૦.૫
	ભાવનગર	૮.૨	૨૩	૦	૦		૦.૨	૦.૪	૩.૬	૫.૫	૧
	જામનગર	૦	૦	૦	૦		૦	૦	૦	૦	૦
	રાજકોટ	૨૮.૪	૦	૦	૦		૦	૦	૦	૦	૦
	જુનાગઢ	૧.૬	૨.૫	૧.૪	૧૦		૦	૦	૦	૦	૦
	સાબરકાંઠા						૦	૦	૦	૦	૦
	સુરેન્દ્રનગર	૦	૦.૪	૦	૦		૦	૦	૦	૦	૦
	અમદાવાદ	૨૫.૧	૦.૬	૦	૦		૦	૦	૦	૦	૦
	વડોદરા	૬.૯	૭.૨	૦.૩	૦		૦	૧.૨	૨.૭	૨.૭	૨.૮
	પાટણ						૦.૧	૦.૫	૦.૪	૦.૪	૦.૨
	મહેસાણા						૦	૦	૦	૦	૦
કુલ પડેલ વરસાદ અને પ્રમાણિત રંગ		૦.૧ થી ૨.૪ મીમી		૨.૫ થી ૧૫.૫ મીમી		૧૫.૬ થી ૬૪.૪ મીમી	૬૪.૫ થી ૧૧૫.૫		૧૧૫.૬ થી ૨૦૪.૪ મીમી		
પડેલ વરસાદનું વર્ગીકરણ		ખૂબ જ ઓછો વરસાદ		ઓછો વરસાદ		મધ્યમ વરસાદ	ભારે વરસાદ		અતિ ભારે વરસાદ		

પાક પરિસ્થિતિ :

સુરત ખાતે વાવણી કરેલ પાક ૭૦ થી ૭૬ દિવસનો વાન્સપતિક અને કળી અવસ્થાએ છે. અહેવાલના અઠવાડિયા દરમ્યાન વાતાવરણ વાદળછાયું અને વરસાદી હતું. જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં હાથથી નિંદામણોની સાફ સફાઈ અને આંતરખેડનાં કાર્યો કરવા. ખેતરમાં નિંદામણોનો ઉપદ્રવ જોવા મળેલ છે. રોગો જોવા મળેલ નથી. શ્રીપ્સનો ઉપદ્રવ આર્થિકક્ષમ્ય માત્રાથી વધારે જોવા મળેલ છે.

જુનાગઢ ખાતે વાવણી કરેલ પાક વાનસ્પતિક વૃદ્ધિ અને કળી અવસ્થાએ છે. આંતર ખેડ, ખાતર પૂર્તિ અને દવા છંટકાવ જેવા કાર્યો થયેલ નથી. ખેતરમાં નિંદામણોનો ઉપદ્રવ જોવા મળેલ છે. ઓછા વત્તા પ્રમાણમાં શ્રીપ્સ, તડતડિયા અને સફેદમાખીનો ઉપદ્રવ કેટલાક સ્થળો પર જોવા મળેલ છે. મોટાભાગના ખેડૂતોના ખેતરોમાં (સુકારા) પેરાવિલ્ટ મુખ્ય સમસ્યા છે.

સલાહ :

સુરત ખાતે ખેડૂતોને ખેતરોમાંથી વધુ પડતાં પાણીનો નિતાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ખેતરો પાક અવશેષોથી મુક્ત રાખવા. પુરતો વરસાદ મળતા નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરનો બીજો પૂર્તિ ખાતરનો જથ્થો આપવો. યુસિયાં પ્રકારની જીવાતોના વ્યવસ્થાપન માટે લીમડા આધારિત દવા અથવા લીબોળીના મીજનું દ્રાવણ ૫% અને લીબોળીનું ઓઈલ ૫ મીલી/લી. અથવા લીમડાના ઓઈલ આધારિત બજારમાં મળતી દવા ૫ મીલી/લી (૩૦૦ અથવા ૧૫૦૦ પીપીએમ) અને ૦.૦૫% કપડા ધોવાનો પાઉડર ઉમેરી છંટકાવ કરવો. ગુલાબી ઈયળની મોજણી માટે પ્રતિ એકર ૨ ફેરોમોન ટ્રેપ લગાડવા. દેશી કપાસના ખેતરોમાં ૧ મીટરની ત્રિજ્યાના વિસ્તારમાં તંદુરસ્ત છોડોમાં ફ્યુઝારીયમથી થતા સુકારાની ચકાસણી કરવી. જો જુદા સુકારાના (પેરા વીલ્ટ) લક્ષણો જોવા મળે તો ઉપદ્રવીત છોડોના મૂળ વિસ્તારમાં કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ ૨૫ ગ્રામ+૨૦૦ ગ્રામ યુરીયા ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી ૪૮ કલાકમાં છોડને પુનર્જીવીત કરવા માટે આપવું. રોગકારકોને દાખલ થતા અટકાવવા માટે ક્રેસોલીમ મિથાઈલ ૪૪.૩ એસસી @ ૧૦ મીલી અથવા પ્રોપીનેબ ૭૦ ડબલ્યુપી @ ૨૫ ગ્રામ અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઈસી @ ૧૦ મીલી અથવા મેટીરામ ૫૫% + પાયરોક્લોસ્ટ્રોબીન ૫% ડબલ્યુજી @ ૨૦ ગ્રામ અથવા એઝોક્ષાસ્ટ્રોબીન ૧૮.૨% ડબલ્યુ/ડબલ્યુ + ડાયફેનોકોનાઝોલ ૧૧.૪% ડબલ્યુ/ડબલ્યુ એસસી @ ૧૦ મીલી અથવા ફ્લુક્ષાપાયરોક્સાડ ૧૬૭ ગ્રામ/લી. + પાયરોક્લોસ્ટ્રોબીન ૩૩૩ ગ્રામ/લી. એસસી @ ૬ મીલી/૧૦ લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવાથી ફૂગથી થતાં પાનના ટપકાંઓ અને ઝાળના રોગોનું વ્યવસ્થાપન થાય છે. ફૂગો અને બેક્ટેરીયાથી થતાં ઝીડવાના સડા રોગના વ્યવસ્થાપન માટે કાર્બેન્ડેઝીમ ૧૨% + મેન્કોઝેપ ૬૩% ડબલ્યુપી @ ૩ગ્રામ/લી. અથવા પ્રોપીનેબ ૭૦ ડબલ્યુપી @ ૨.૫ થી ૩ ગ્રામ/લી. અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઈસી @ ૧ મીલી/લી. અથવા કાર્બેન્ડેઝીમ ૫૦ ડબલ્યુપી @ ૦.૪ ગ્રામ પ્રતિ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

જુનાગઢ ખાતે ખેડૂતોને ખેતરોમાં ભરાયેલ વધુ પડતાં પાણીનો નિતાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. છોડોના મૂળ વિસ્તારમાં રાસાયણિક ખાતર એમોનીયમ સલ્ફેટ % ૧૦ કિગ્રા પ્રતિ એકર અથવા યુરીયા ૧૫ કિગ્રા પ્રતિ એકર આપવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આંતર ખેડ અને નિંદામણના કાર્ય સાથે પાણિયા ચઢાવી એકર દિઠ ૨૫ કિલો મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ અને ૨૫ કિલો યુરીયા ભેજવાળી પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે જમીનમાં આપવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. નિંદામણની સાફ-સફાઈ અને આંતર ખેડનાં કાર્યો સમયસર કરવા. જ્યાં હાથથી નિંદામણ શક્ય ન હોય ત્યાં ઘાસીયા પ્રકારના નિંદામણો માટે ક્વીઝલોફોપ ઈથાઈલ ૫% ઈસી % ૨ મીલી પ્રતિ લી. પાણીમાં ભેળવી આપવું અથવા મોટા પાંદડાના નિંદામણો માટે પાયરીથાઇઓબેક સોડીયમ ૧૦% ઈસી % ૧.૫ મીલી/લી. અથવા પાયરીથાઇઓબેક સોડીયમ ૬% ઈસી + ક્વીઝલોફોપ ઈથાઈલ ૪% એમઈસી % ૨ થી ૨.૫ મીલી પ્રતિ લી. પ્રમાણે ઘાસીયા પ્રકારના અને મોટા પાંદડાના નિંદામણો નિયંત્રણ માટે છંટકાવ કરવો. શ્રીપ્સની વસતી આર્થિકક્ષમ્ય માત્રા વટાવે ત્યારે થાયોમીથોક્ઝામ ૨૫% ડબલ્યુજી % ૨ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લી. પાણીમાં (૧૦૦ ગ્રામ/હેક્ટર) અથવા સ્પાયનેટોરોમ ૧૧.૭% એસ.સી. % ૮.૪ મીલી/૧૦ લી પાણીમાં (૪૨૦ મીલી/હેક્ટર) પ્રમાણે છંટકાવ કરવો. ફૂગથી થતાં રોગોનાં નિયંત્રણ માટે ફ્લુક્ષાપાયરોક્સાડ ૧૬૭ ગ્રામ/લી. + પાયરોક્લોસ્ટ્રોબીન ૩૩૩ ગ્રામ/લી. એસસી % ૦.૬ મીલી/લી. અથવા મેટીરામ ૫૫% + પાયરોક્લોસ્ટ્રોબીન ૫% ડબલ્યુજી % ૨ ગ્રામ/લી. પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો. ફૂગો અને બેક્ટેરીયાથી થતાં ઝીડવાના સડા રોગના વ્યવસ્થાપન માટે કાર્બેન્ડેઝીમ ૧૨% + મેન્કોઝેપ ૬૩% ડબલ્યુપી % ૩૦ ગ્રામ અથવા પ્રોપીનેબ ૭૦% ડબલ્યુપી % ૨.૫-૩ ગ્રામ/લી. અથવા પ્રોપીકોનાઝોલ ૨૫ ઈ.સી. % ૧ મીલી/લી. અથવા કાર્બેન્ડેઝીમ ૫૦ ડબલ્યુપી % ૦.૪ ગ્રામ પ્રતિ લી. પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

પાણી ભરાયેલ પરિસ્થિતિમાં, ખેતરોમાં પર્યાપ્ત ઢાળ આપીને અને વહેલામાં વહેલી તકે છોડના મુળની આસપાસના વિસ્તારમાંથી સ્થિર પાણીનો નિકાલ કરવો. પાણી ભરાયેલ પરિસ્થિતિને કારણે કપાસના છોડને પોષક તત્વોની ઉણપથી અને જમીનમાં હવાની અવરજવર અટકી જવાની પરિસ્થિતિથી કપાસના મૂળો પોષક તત્વોના નબળા શોષણને કારણે છોડના પાંદડાઓ લાલ થાય છે અને સમય જતા કપાસનો છોડ પીળો તથા સુકાતો થતો જોવા મળે છે. કપાસના છોડ ઉપર ૧% યુરીયા અથવા ડીએપી અથવા એન.પી.કે ૧૯:૧૯:૧૯ નો ૧૫ દિવસના આંતરે છંટકાવ કરવાની ભલામણ છે.