

25级数学分析I第2次月考试题参考解答

一、(本题共15分) 设 $y = x^3 \sin x$, 求 $y^{(10)}$.

解 由高阶导数的Leibniz公式, 有

$$\begin{aligned} & y^{(10)} \\ &= x^3 (\sin x)^{(10)} + C_{10}^1 (x^3)' (\sin x)^{(9)} + C_{10}^2 (x^3)'' (\sin x)^{(8)} + C_{10}^3 (x^3)''' (\sin x)^{(7)} \\ &= x^3 \cdot (-\sin x) + 10 \cdot 3x^2 \cdot \cos x + 45 \cdot 6x \cdot \sin x + 120 \cdot 6 \cdot (-\cos x) \\ &= -x^3 \sin x + 30x^2 \cos x + 270x \sin x - 720 \cos x. \end{aligned}$$

□

二、(本题共15分) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y = 1 + xe^y$ 确定的隐函数, 求 $y = y(x)$ 的一阶导数 y' 和二阶导数 y'' .

解法一 方程 $y = 1 + xe^y$ 两边对 x 求导, 得

$$y' = e^y + xe^y y'.$$

解得

$$y' = \frac{e^y}{1 - xe^y}.$$

由原方程得 $xe^y = y - 1$, 代入上式得

$$y' = \frac{e^y}{2 - y}. \quad (1)$$

再将(1)式两边对 x 求导, 得

$$y'' = \frac{e^y(2 - y) - e^y \cdot (-1)}{(2 - y)^2} \cdot y' = \frac{(3 - y)e^y}{(2 - y)^2} \cdot y'.$$

将(1)式代入上式, 得

$$y'' = \frac{(3 - y)e^y}{(2 - y)^2} \cdot \frac{e^y}{2 - y} = \frac{(3 - y)e^{2y}}{(2 - y)^3}.$$

□

解法二 方程 $y = 1 + xe^y$ 两边对 x 求导, 得

$$y' = e^y + xe^y y'. \quad (1)$$

解得

$$y' = \frac{e^y}{1 - xe^y}. \quad (2)$$

再将(1)式两边对 x 求导, 得

$$y'' = e^y y' + e^y y' + xe^y (y')^2 + xe^y y''.$$

解得

$$y'' = \frac{2e^y y' + xe^y (y')^2}{1 - xe^y}.$$

将(2)式代入上式, 得

$$y'' = \frac{2e^y \cdot \frac{e^y}{1 - xe^y} + xe^y \cdot \left(\frac{e^y}{1 - xe^y}\right)^2}{1 - xe^y} = \frac{e^{2y} (2 - xe^y)}{(1 - xe^y)^3}. \quad \square$$

三、(本题共15分) 设函数 $f(x)$ 是区间 (a, b) 上的下凸函数. 证明: 对于任何 $x \in (a, b)$, 左导数 $f'_-(x)$ 和右导数 $f'_+(x)$ 都存在并且有 $f'_-(x) \leq f'_+(x)$.

证 对任意固定的 $x \in (a, b)$, 由三弦引理知, 对任意 $h_1, h_2 \in (a - x, 0)$, $h_1 < h_2$, 有

$$\frac{f(x + h_1) - f(x)}{h_1} \leq \frac{f(x + h_2) - f(x)}{h_2},$$

即 $\varphi(h) = \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$ 作为 h 的函数在 $(a - x, 0)$ 单调递增. 同理可知 $\varphi(h)$ 在 $(0, b - x)$ 也单调

递增. 记 $\delta = \min\{x - a, b - x\} > 0$, 由三弦引理知, 对任意 $h \in (0, \delta)$, 有

$$\frac{f(x - h) - f(x)}{-h} \leq \frac{f(x + h) - f(x)}{h},$$

即对任意 $h \in (0, \delta)$, 有 $\varphi(-h) \leq \varphi(h)$. 因此, $\varphi(h)$ 在 $(x - a, 0)$ 单调递增有上界, 在 $(0, b - x)$ 单

调递增有下界. 由单调函数的单侧极限存在定理知 $f'_-(x) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \varphi(h)$ 和 $f'_+(x) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \varphi(h)$ 都

存在. 在 $\varphi(-h) \leq \varphi(h)$ 两边令 $h \rightarrow 0^+$ 取极限, 由极限的保序性得 $f'_-(x) \leq f'_+(x)$. \square

四、(本题共15分) 证明: 对于任何 $x \in (0, 1)$, 存在唯一的 $\theta(x) \in (0, 1)$, 使得 $\ln(1+x) = \frac{x}{1+\theta(x)x}$ 成立. 并求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x)$.

证 令 $f(x) = \ln(1+x)$, 则 $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上可导. 对于任何 $x \in (0, 1)$, 由拉格朗日中值定理知存在 $\theta(x) \in (0, 1)$, 使得

$$\ln(1+x) = f(x) - f(0) = f'(\theta(x)x)(x-0) = \frac{x}{1+\theta(x)x}.$$

由 $\ln(1+x) = \frac{x}{1+\theta(x)x}$ 解得

$$\theta(x) = \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)},$$

故满足条件的 $\theta(x)$ 是唯一的. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 有 $\ln(1+x) \sim x$, 故由等价无穷小量替换和洛必达法则得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

□

注 也可以用泰勒公式来计算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x)$.

五、(本题共15分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} \cdot \sin x - (1+x)x}{\ln(1+x^2) \cdot \sin x}$.

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $\ln(1+x^2) \sim x^2$, $\sin x \sim x$, 故 $\ln(1+x^2) \cdot \sin x \sim x^3$. 记 $f(x) = \tan x$, 则由 $f(x)$ 是奇函数知 $f'(x)$ 是偶函数, $f''(x)$ 是奇函数, 从而 $f(0) = f''(0) = 0$. 由 $f'(x) = \sec^2 x$ 得 $f'(0) = 1$, 故 $\tan x = x + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$). 进而得

$$\begin{aligned} e^{\tan x} &= 1 + \tan x + \frac{1}{2} \tan^2 x + o(\tan^2 x) \\ &= 1 + (x + o(x^2)) + \frac{1}{2} (x + o(x^2))^2 + o(x^2) \\ &= 1 + x + \frac{1}{2} x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0). \end{aligned}$$

因此由等价无穷小量替换和泰勒公式得

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} \cdot \sin x - (1+x)x}{\ln(1+x^2) \cdot \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} \cdot \sin x - (1+x)x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2))(x-\frac{1}{6}x^3+o(x^3))-(1+x)x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3))-(1+x)x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{3}+o(1)\right) \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

□

六、(本题共15分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 满足 $f(0) = 2, f(1) = 1$. 证明:

存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $2f(\xi) + f'(\xi)\left(\xi + \frac{1}{\xi}\right) = 0$ 成立.

证 令 $\varphi(x) = (x^2 + 1)f(x)$, 则由题设条件知 $\varphi(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 满足 $\varphi(0) = 2 = \varphi(1)$. 由罗尔定理知存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$, 即

$$2\xi f(\xi) + (\xi^2 + 1)f'(\xi) = 0.$$

又因为 $\xi > 0$, 所以上式两边同除以 ξ 就得到

$$2f(\xi) + f'(\xi)\left(\xi + \frac{1}{\xi}\right) = 0.$$

□

七、(本题共10分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上两次可导, $f(0) = f(2) = 0$, $f(x)$ 的最小值为 -1 . 证

明: 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f''(\xi) = 2$.

证 由最值定理知存在 $x_0 \in [0, 2]$, 使得 x_0 是 $f(x)$ 的一个最小值点. 根据题设条件知 $x_0 \in (0, 2)$, $f(x_0) = -1$. 由费马定理知 $f'(x_0) = 0$. 于是由泰勒公式, 有

$$0 = f(0) = f(x_0) + f'(x_0)(0 - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - x_0)^2 = -1 + \frac{f''(\xi_1)}{2}x_0^2, \quad 0 < \xi_1 < x_0,$$

$$0 = f(2) = f(x_0) + f'(x_0)(2 - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(2 - x_0)^2 = -1 + \frac{f''(\xi_2)}{2}(2 - x_0)^2, \quad x_0 < \xi_2 < 2.$$

于是 $f''(\xi_1) = \frac{2}{x_0^2}$, $f''(\xi_2) = \frac{2}{(2-x_0)^2}$. 若 $x_0 = 1$, 则取 $\xi = \xi_1$, 就有 $f''(\xi) = \frac{2}{x_0^2} = 2$; 若 $x_0 \neq 1$, 则 $x_0 \in (0, 1)$ 或者 $x_0 \in (1, 2)$, 从而 $f''(\xi_1)$ 和 $f''(\xi_2)$ 这两个数中, 一个大于2, 另一个小于2, 故由达布定理知存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subseteq (0, 2)$ 使得 $f''(\xi) = 2$. □