



1 Notion de l'information génétique

08 Mécanisme de la réplication d'ADN



N.B: La réplication se déroule lors de la phase S où la quantité d'ADN passe de q à $2q$ et pendant l'anaphase se dissocie les chromatides sœurs et la quantité s'ADN passe de $2q$ à q


La réplication d'ADN se fait selon le modèle semi-conservatif



09 Compaction d'AND

Après la synthèse d'ADN, les nouvelles molécules d'ADN subissent un processus de compactage qui suit les étapes ci-dessous:


- 1) La molécule d'ADN s'enroule autour des protéines Histones;
 - 2) L'ADN enroulé autour des Histones constitue le nucléofilament;
 - 3) Le nucléofilament s'enroule autour de lui-même pour former une structure appelée Chromatine;
 - 4) La chromatine s'enroule autour de lui-même pour se transformer en chromosome;
- Un fragment d'ADN enroulé autour des protéines histones constitue une unité appelée Nucléosome;



2

Mécanismes de l'expression de l'information génétique

01 Notion de gène, Allèle, Mutation et Caractère



- ✓ La molécule d'ADN est un ensemble de gènes et chaque gène code pour un caractère bien déterminé (gène → caractère).
- ✓ Le caractère peut se trouver sous plusieurs formes appelées phénotypes (Ex couleur noire des yeux)
- ✓ Le phénotype c'est la forme observable ou mesurable que prend un caractère
- ✓ Un gène peut être représenté par un ou plusieurs allèles