# Prednášky z Matematiky (4) – Logiky pre informatikov

Ján Kľuka, Jozef Šiška

Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK Bratislava

Letný semester 2017/2018

### 3. prednáška

## Vyplývanie, ekvivalentné úpravy

5. marca 2018

# Obsah 3. prednášky

# Opakovanie

# Ohodnotenie výrokových premenných

#### Definícia 2.19

Nech (t, f) je usporiadaná dvojica pravdivostných hodnôt,  $t \neq f$ , pričom hodnota t predstavuje pravdu a f nepravdu.

Ohodnotením množiny výrokových premenných  $\mathcal V$  nazveme každé zobrazenie v množiny  $\mathcal V$  do množiny  $\{t,f\}$  (teda každú funkciu  $v:\mathcal V\to\{t,f\}$ ).

Výroková premenná p je pravdivá pri ohodnotení v, ak v(p) = t. Výroková premenná p je nepravdivá pri ohodnotení v, ak v(p) = f.

# Splnenie formuly ohodnotením premenných

#### Definícia 2.22

Nech  $\mathcal V$  je množina výrokových premenných. Nech v je ohodnotenie množiny  $\mathcal V$ . Pre všetky výrokové premenné p z  $\mathcal V$  a všetky formuly A, B nad  $\mathcal V$  definujeme:

- $v \operatorname{spĺňa}$  atomickú formulu  $p \operatorname{vtt} v(p) = t$ ;
- $v \operatorname{spĺňa}$  formulu  $\neg A \operatorname{vtt} v \operatorname{nespĺňa} A$ ;
- v spĺňa formulu  $(A \land B)$  vtt v spĺňa A a v spĺňa B;
- v spĺňa formulu  $(A \lor B)$  vtt v spĺňa A alebo v spĺňa B;
- v spĺňa formulu  $(A \rightarrow B)$  vtt v nespĺňa A alebo v spĺňa B.

#### Dohoda

Reláciu ohodnotenie v spĺňa formulu X skrátene zapisujeme  $v \models X$ . V ďalších definíciách a tvrdeniach predpokladáme, že sme si pevne zvolili nejakú množinu výrokových premenných W a hodnoty t, f.

# Spĺňanie formuly ohodnoteniami

#### Tvrdenie 2.25

Splnenie výrokovej formuly pri ohodnotení výrokových premenných závisí iba od ohodnotenia (konečného počtu) výrokových premenných, ktoré sa v nej vyskytujú.

Presnejšie: Pre každú formulu X a všetky ohodnotenia  $v_1$  a  $v_2$ , ktoré zhodujú na množine výrokových premenných vyskytujúcich sa v X, platí  $v_1 \models X$  vtt  $v_2 \models X$ .

#### Dôsledok

Na preverenie všetkých možností splnenia a nesplnenia formuly X postačuje preveriť konečne veľa ohodnotení ( $2^{|\mathsf{vars}(X)|}$ ), ktoré sa vzájomne líšia iba na množine výrokových premenných  $\mathsf{vars}(X)$  vyskytujúcich sa v X.

#### 2.4

# Tautológia, (ne)splniteľnosť, falzifikovateľnosť

# Tautológia, (ne)splniteľnosť, falzifikovateľnosť

#### Definície 2.24, 2.27, 2.28, 2.29

- Formulu X nazveme tautológiou (skrátene |= X) vtt je splnená pri každom ohodnotení výrokových premenných.
- Formulu X nazveme splniteľnou vtt je splnená pri aspoň jednom ohodnotení výrokových premenných.
- Formulu X nazveme nesplniteľnou vtt každé ohodnotenie výrokových premenných nespĺňa X.
- Formulu X nazveme falzifikovateľnou vtt je nesplnená pri aspoň jednom ohodnotení výrokových premenných.



# Tautológie a (ne)splniteľnosť

#### Tvrdenie 2.30

Formula X je tautológia vtt keď  $\neg X$  je nesplniteľná.

#### Dôkaz.

- $(\Rightarrow)$  Nech X je tautológia, teda je splnená pri každom ohodnotení výrokových premenných. To znamená, že  $\neg X$  je nesplnená pri každom ohodnotení (podľa definície splnenia formuly ohodnotením), a teda  $\neg X$  je nesplniteľná.
- ( $\Leftarrow$ ) Opačne, nech  $\neg X$  je nesplniteľná. To znamená, že pri každom ohodnotení výrokových premenných je  $\neg X$  nesplnená. Podľa definície spĺňania je teda X pri každom ohodnotení splnená, a teda je tautológia.

### **Teórie**

Neformálne slovom *teória* označujeme nejaký súbor presvedčení o fungovaní sveta alebo jeho časti.

#### Definícia 2.31

(Výrokovologickou) teóriou nazývame každú množinu formúl.

#### Dohoda

Teórie budeme označovať písmenami T, S, podľa potreby s indexmi.

#### Príklad 2.32

Formalizácia problému pozývania známych na párty je teóriou:

$$\begin{split} T_{\mathsf{party}} &= \{\, ((\mathsf{kim} \vee \mathsf{jim}) \vee \mathsf{sara}), & (\mathsf{kim} \to \neg \mathsf{sara}), \\ & (\mathsf{jim} \to \mathsf{kim}), & (\neg \mathsf{jim} \to \neg \mathsf{sara}) \, \} \end{split}$$

# Splnenie teórie, model

Pojem spĺňania sa jednoducho rozšíri na teórie.

#### Definícia 2.33

Nech T je teória. Ohodnotenie v spĺňa teóriu T (skrátene  $v \models T$ ) vtt v spĺňa každú formulu X z množiny T. Spĺňaiúce ohodnotenie nazývame modelom teórie T.

#### Príklad 2.34

Aké ohodnotenie spĺňa (teda je modelom)  $T_{party}$ ?

#### Tvrdenie 2.35

Splnenie teórie T pri ohodnotení výrokových premenných závisí iba od ohodnotenia výrokových premenných, ktoré sa vyskytujú vo formulách v T.

Presná formulácia je podobná ako pri spĺňaní formúl. Dôkaz sporom, lebo množina formúl môže byť nekonečná.

# 2.5

# Výrokovologické vyplývanie

# Splniteľnosť teórie

- Kedy je teória "zlá"?
- Keď nepopisuje žiaden svet (stav sveta).
- "Dobrá" je teda taká teória, ktorá má aspoň jeden model.

#### Definícia 2.36

Teória T je súčasne výrokovologicky splniteľná (skrátene splniteľná) vtt existuje aspoň jeden model T.

Teória je nesplniteľná vtt nie je splniteľná.

#### Príklad 2.37

 $T_{party}$  je súčasne splniteľná množina formúl.

 $T_{\mathsf{party}} \cup \{\mathsf{sara}\}$  je súčasne nesplniteľná množina formúl.

# Logické dôsledky a vyplývanie


- Aký je účel teórií? Kedy je teória užitočná?
  - Keď z nej dokážeme odvodiť (uvažovaním alebo počítaním) doteraz neznáme skutočnosti (teda nezapísané v teórii), ktoré platia vo všetkých stavoch sveta spĺňajúcich teóriu.
- Takéto skutočnosti nazývame logickými dôsledkami teórie a hovoríme, že z nej vyplývajú.

#### Príklad 2.38

Všimnime si, že v *každom* ohodnotení, ktoré spĺňa  $T_{\text{party}}$ , je splnená aj premenná *kim*.

Ktorá ďalšia formula vyplýva z  $T_{party}$ ?


# Výrokovologické vyplývanie



#### Definícia 2.39 (Výrokovologické vyplývanie)

Z teórie T výrokovologicky vyplýva formula X (tiež X je výrokovologickým dôsledkom T, skrátene  $T \models X$ ) vtt každé ohodnotenie výrokových premenných, ktoré spĺňa T, spĺňa aj X.

# Nevyplývanie



#### Príklad 2.40

Ktoré atomické formuly a ich negácie nevyplývajú z  $T_{\text{party}}$ ? Vyplýva z  $T_{\text{party}}$  formula  $(kim \rightarrow jim)$ ?

# Vyplývanie a (ne)splniteľnosť

Použitie SAT solvera na rozhodovanie vyplývania je založené na:

#### Tvrdenie 2.41

Formula X výrokovologicky vyplýva z teórie T vtt množina  $T_1 = T \cup \{\neg X\}$  je nesplniteľná.

#### Dôkaz.

Nech  $T = \{X_1, X_2, ..., X_n, ...\}.$ 

 $(\Rightarrow)$  Predpokladajme, že X vyplýva z množiny T. Nech v je nejaké ohodnotenie  $\mathcal V$ . Potrebujeme ukázať, že v nespĺňa  $T_1$ . Máme dve možnosti:

- Ak v nespĺňa T, tak nespĺňa ani T<sub>1</sub>.
- Ak v spĺňa T, tak v musí spĺňať aj X (definícia vyplývania). To znamená, že ¬X je nesplnená pri v, a teda v nespĺňa T<sub>1</sub>.
- ( $\Leftarrow$ ) Opačne, nech  $\mathcal{T}_1$  je nesplniteľná a nech v je nejaké ohodnotenie  $\mathcal{V}$ . v teda nespĺňa  $\mathcal{T}_1$ . Potrebujeme ukázať, že ak v spĺňa  $\mathcal{T}$ , tak potom v spĺňa aj X. Ak v spĺňa  $\mathcal{T}$ , potom spĺňa každé  $X_j$ . Keďže ale v nespĺňa  $\mathcal{T}_1$ , v musí nespĺňať  $\neg X$  (jediná zostávajúca formula z  $\mathcal{T}_1$ ), čo znamená, že v spĺňa X.

### Nezávislosť

#### Definícia 2.42

Formula X je nezávislá od teórie T, ak existuje dvojica ohodnotení  $v_1$ ,  $v_2$  spĺňajúcich T, pričom  $v_1$  spĺňa X, ale  $v_2$  nespĺňa X.

#### Príklad 2.43

Ktorá atomická formula je nezávislá od  $T_{\text{party}}$ ? Je aj jej negácia nezávislá od  $T_{\text{party}}$ ?

# Vzťahy vyplývania, implikácií a tautológií

#### Tvrdenie 2.44

Nech S a T sú teórie,  $S \subseteq T$ , A je formula.

 $Ak S \models A$ ,  $tak T \models A$ .

#### Tvrdenie 2.45

Nech T je teória, nech A, B,  $A_1$ ,  $A_2$ , ...,  $A_n$  sú formuly.

- a  $T \cup \{A\} \models B \text{ vtt } T \models (A \rightarrow B).$
- **b**  $\{\} \models A \text{ vtt } A \text{ je tautológia } (\models A).$
- Nasledujúce tvrdenia sú ekvivalentné:
  - $\{A_1, A_2, ..., A_n\} \models B$

  - $\{\} \models ((\cdots (A_1 \land A_2) \land \cdots) \land A_n) \rightarrow B)$
  - $[v] \models (((\cdots (A_1 \land A_2) \land \cdots) \land A_n) \rightarrow B)$

# Hlasujte

#### Spomeňte si III.1

Formula X vyplýva z teórie T vtt každý model T spĺňa X. Pravda alebo nepravda?

# 2.6

# Ekvivalencia formúl

### Ekvivalencia formúl

Ako vieme pomocou doterajších **sémantických** pojmov vyjadriť, že dve formuly sú ekvivalentné?

#### Definícia 2.46

Dve formuly X a Y sú (výrokovologicky) ekvivalentné ( $X \Leftrightarrow Y$ ) vtt pre každé ohodnotenie v výrokových premenných platí, že v spĺňa X vtt v spĺňa Y.

Ako súvisí takto sémanticky zadefinovaná ekvivalencia formúl so skratkou ↔?

Podľa dohody z 2. prednášky je  $(X \leftrightarrow Y)$  je skráteným zápisom  $((X \to Y) \land (Y \to X))$ .

#### Tvrdenie 2.47

Formuly X a Y sú výrokovologicky ekvivalentné vtt formula  $(X \leftrightarrow Y)$  je tautológia.

# Ekvivalencia a vyplývanie

Ako súvisí ekvivalencia formúl s vyplývaním?

#### Tvrdenie 2.48

Formuly X a Y sú ekvivalentné vtt  $\{X\} \models Y$  a  $\{Y\} \models X$ .

#### Dôkaz.

( $\Rightarrow$ ) Nech X a Y sú ekvivalentné formuly. Chceme dokázať, že  $\{X\} \models Y$ , teda že (podľa definície vyplývania) pre každé ohodnotenie v platí, že ak  $v \models \{X\}$ , tak  $v \models Y$ . Nech v je ľubovoľné ohodnotenie, nech  $v \models \{X\}$ . Potom  $v \models X$  (podľa definície splnenia teórie), a teda  $v \models Y$  (z predpokladu a podľa definície ekvivalencie). Teda platí, že ak  $v \models \{X\}$ , tak  $v \models Y$ . Pretože v bolo ľubovoľné, môžeme túto vlastnosť zovšeobecniť na všetky ohodnotenia, a teda  $\{X\} \models Y$ .

Dôkaz  $\{Y\} \models X$  je podobný.

( $\Leftarrow$ ) Nech X a Y sú formuly a nech  $\{X\} \models Y$  a  $\{Y\} \models X$ . Chceme dokázať, že X a Y sú ekvivalentné.

Nech v je ľubovoľné ohodnotenie. Ak  $v \models X$ , tak  $v \models \{X\}$  a podľa prvého predpokladu  $v \models Y$ . Ak  $v \models Y$ , tak  $v \models \{Y\}$  a podľa druhého predpokladu  $v \models X$ . Teda  $v \models X$  vtt  $v \models Y$ . Pretože v bolo ľubovoľné, môžeme túto vlastnosť zovšeobecniť na všetkv ohodnotenia. a teda X a Y sú ekvivalentné.

#### Tranzitivita ekvivalencie

#### Tvrdenie 2.49 (Tranzitivita ekvivalencie)

Nech X, Y a Z sú formuly.

Ak X je ekvivalentná s Y a Y je ekvivalentná so Z,

tak X je ekvivalentná so Z.

#### Dôkaz.

Nech X, Y a Z sú formuly. Nech X je ekvivalentná s Y a Y je ekvivalentná so Z. Nech v je ľubovoľné ohodnotenie.

Ak  $v \models X$ , tak  $v \models Y$  podľa prvého predpokladu, a teda  $v \models Z$  podľa druhého predpokladu. Ak  $v \models$ , tak  $v \models Y$  podľa druhého predpokladu, a teda  $v \models X$  podľa prvého predpokladu. Teda  $v \models X$  vtt  $v \models Z$ .

Zovšeobecnením na všetky ohodnotenia dostávame, že X a Z sú ekvivalentné.

П

# 2.7 Ekvivalentné úpravy

# Ekvivalentné úpravy

- Už ste určite ekvivalente upravovali formuly
- Aké kroky ste pri tom robili?

#### Príklad 2.50

$$A = \neg \neg (r \land q) \qquad B = (r \land q) \qquad X = (p \to \neg \neg \neg (r \land q))$$

$$\begin{cases} \xi \\ Y = (p \to \neg (r \land q)) \\ \end{cases}$$

Nahradenie podformuly A vo formule X formulou B, ktorá je ekvivalentná s A

# Pravidlá ekvivalentných úprav

#### Príklad 2.50

- Ako vieme, že A a B sú ekvivalentné?
  - ► Môžeme odvodiť sémanticky
  - Naozaj ste dosadili  $(r \land q)$  za pv známej ekvivalencii medzi  $\neg \neg p$  a p (princíp dvojitej negácie)

#### Príklad 2.51

# Korektnosť ekvivalentných úprav

```
Príklad 2.51
C = \neg \neg p \qquad D = p
\begin{matrix} \xi & & \xi \\ A = \neg \neg (r \land q) & B = (r \land q) \end{matrix}
```

- Prečo sú tieto úpravy korektné (správne)?
- Teda:
   Prečo, ak je C ekvivalentné s D,
   tak je aj A ekvivalentné s B a X ekvivalentné s Y?

# Substitúcia a ekvivalentné úpravy

Oba druhy dosadení pri ekvivalentných úpravách sú substitúcie

#### Definícia 2.52 (Substitúcia)

Nech X, A, B sú formuly.

Substitúciou B za A v X (skrátene X[A|B])) nazývame formulu, ktorá vznikne nahradením každého výskytu A v X formulou B.

Substitúciu si vieme predstaviť ako cyklus prechádzajúci cez X alebo ako rekurzívne definovanú operáciu: (cv02)

Pre všetky formuly A, B, X, Y, všetky výrokové premenné p a všetky binárne spojky  $b \in \{\land, \lor, \rightarrow\}$ :

$$A[A|B] = B$$

$$p[A|B] = p$$

$$(\neg X)[A|B] = \neg (X[A|B])$$

$$(X b Y)[A|B] = ((X[A|B]) b (Y[A|B]))$$

$$ak A \neq \neg X$$

$$ak A \neq (X b Y)$$

# Korektnosť ekvivalentných operácií

Korektnosť ekvivalentných úprav vyjadrujú nasledujúce tvrdenia:

#### Tvrdenie 2.53 (Dosadenie do ekvivalentných formúl)

Nech A a B sú navzájom ekvivalentné formuly, p je výroková premenná a Y je formula. Potom formuly A[p|Y] a B[p|Y] sú ekvivalentné.

#### Veta 2.54 (Ekvivalentné úpravy)

Nech X je formula, A a B sú ekvivalentné formuly. Potom formuly X a X[A|B] sú tiež ekvivalentné.

### Sémantické vlastnosti substitúcie

Obe tvrdenia o korektnosti sú dôsledkami nasledujúcej lemy:

#### Lema 2.55

Nech X je výroková formula, p je výroková premenná, A je formula a v je ohodnotenie výrokových premenných.

Potom  $v \models X[p|A]$  vtt  $v_{p|A} \models X$ , kde  $v_{p|A}$  je ohodnotenie, pre ktoré platí:

- $v_{p|A}(r) = v(r)$ , ak r je výroková premenná a  $p \neq r$ ;
- $v_{p|A}(p) = t$ ,  $ak \ v \models A$ ;
- $v_{p|A}(p) = f$ ,  $ak \ v \not\models A$ .

O jej platnosti sa môžeme presvedčiť indukciou na stupeň formuly X.

# Ekvivalencie pre ekvivalentné úpravy

#### Veta 2.56

Nech A, B a C sú ľubovoľné formuly,  $\top$  je ľubovoľná tautológia a  $\bot$  je ľubovoľná nesplniteľná formula.

Nasledujúce dvojice formúl sú ekvivalentné:

$$(A \land (B \land C)) \ a \ ((A \land B) \land C) \qquad asociatívnosť \\ (A \lor (B \lor C)) \ a \ ((A \lor B) \lor C) \qquad komutatívnosť \\ (A \land B) \ a \ (B \land A) \qquad komutatívnosť \\ (A \lor B) \ a \ (B \lor A) \qquad distributívnosť \\ (A \land (B \lor C)) \ a \ ((A \land B) \lor (A \land C)) \qquad distributívnosť \\ (A \lor (B \land C)) \ a \ ((A \lor B) \land (A \lor C)) \qquad de \ Morganove \\ \neg (A \land B) \ a \ (\neg A \land \neg B) \qquad pravidlá \\ \neg \neg A \ a \ A \qquad dvojitá negácia$$

J. Kľuka, J. Šiška

Logika pre informatikov

# Ekvivalencie pre ekvivalentné úpravy

#### Veta 2.56 (Pokračovanie)

$$(A \land A) \ a \ A \qquad idempotencia$$

$$(A \lor A) \ a \ A \qquad identita$$

$$(A \lor \bot) \ a \ A \qquad identita$$

$$(A \lor \bot) \ a \ A \qquad absorpcia$$

$$(A \lor (A \lor B)) \ a \ A \qquad absorpcia$$

$$(A \land (A \lor B)) \ a \ A \qquad vylúčenie tretieho$$

$$(A \land \neg A) \ a \ \bot \qquad spor$$

$$(A \to B) \ a \ (\neg A \lor B) \qquad nahradenie \rightarrow$$

### 2.8

# Konjunktívna a disjunktívna normálna forma

#### Dohoda

Nech  $A_1, A_2, ..., A_n$  je konečná postupnosť formúl.

- Formulu ((( $A_1 \wedge A_2) \wedge A_3$ )  $\wedge \cdots \wedge A_n$ ) budeme skrátene zapisovať ( $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \cdots \wedge A_n$ ), prípadne  $\bigwedge_{i=1}^n A_i$  a nazývať konjunkcia postupnosti formúl  $A_1, \ldots, A_n$ .
- Formulu  $(((A_1 \lor A_2) \lor A_3) \lor \cdots \lor A_n)$  budeme skrátene zapisovať  $(A_1 \lor A_2 \lor A_3 \lor \cdots \lor A_n)$ , prípadne  $\bigvee_{i=1}^n A_i$  a nazývať disjunkcia postupnosti formúl  $A_1, \ldots, A_n$ .
- Pre n = 1 chápeme samotnú formulu A<sub>1</sub> ako konjunkciu aj ako disjunkciu jednoprvkovej postupnosti formúl A<sub>1</sub>.
- Konjunkciu prázdnej postupnosti formúl (n = 0) chápeme ako ľubovoľnú tautológiu (napríklad (p₁ ∨ ¬p₁)) a označujeme ju ⊤.
- Disjunkciu prázdnej postupnosti formúl chápeme ako ľubovoľnú nesplniteľnú formulu (napríklad (p<sub>1</sub> ∧ ¬p<sub>1</sub>)) a označujeme ju ⊥ alebo □.

# Konjunktívny a disjunktívny normálny tvar

#### Definícia 2.53

- Výrokovú premennú alebo negáciou premennej nazývame literál.
- Disjunkciu literálov nazývame klauzula (tiež "klauza").
- Hovoríme, že formula X je v konjunktívnom normálnom tvare (CNF), ak X je konjunkciou klauzúl.
- Hovoríme, že formula X je v disjunktívnom normálnom tvare (DNF), ak X je disjunkciou formúl, z ktorých každá je konjunkciou literálov.

#### Príklad 2.54

Ktoré z nasledujúcich formúl sú literálmi, klauzulami, sú v CNF, v DNF:

$$\begin{array}{lll} A_1 = p & A_6 = ((p \land \neg q) \lor (\neg p \land r) \lor (\neg p \land q \land \neg r)) \\ A_2 = \neg q & A_7 = ((\neg p \lor q \lor \neg r) \land (q \to r)) \\ A_3 = \square & A_8 = ((\neg p \lor \neg q) \land (p \lor r) \land (p \lor q \lor \neg r)) \\ A_4 = (p \lor \neg q) & A_9 = ((\neg p \lor (p \land r)) \land (p \lor q \lor \neg r)) \\ A_5 = (p \land \neg q) & A_{10} = ((\neg p \lor p \lor r) \land (\neg (p \lor q) \lor \neg r)) \end{array}$$

### Literatúra

- Christos H. Papadimitriou. *Computational complexity*. Addison-Wesley, 1994. ISBN 978-0-201-53082-7.
- Raymond M. Smullyan. *Logika prvého rádu*. Alfa, 1979. Z angl. orig. *First-Order Logic*, Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 1968 preložil Svätoslav Mathé.
- Vítězslav Švejdar. *Logika*: *neúplnost*, *složitost*, *nutnost*. Academia, 2002. Prístupné aj na http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/LogikaSve2002.pdf.