



Arzneimitteldateien

Datum	Quelle	Datei	
2015-04-20 16:36:20	Interaktionen Klinik für Klinische Pharmakologie USZ	matrix.csv	6.4 MiB
		matrix.json	9.7 MiB
2015-04-20 16:32:48	Spezialitätenliste Bundesamt für Gesundheit BAG	bag.json	6.8 MiB
		bag.min.json	4.6 MiB
		it.json	30.1 KiB
		it.min.json	20.4 KiB
2015-04-23 11:45:48	Zugelassene Arzneimittel Schweizerische Zulassungsbehörde für Heilmittel	swissmedic.json	13 MiB
		swissmedic.min.json	10.5 MiB

Leistungsauftrag

Offene Universität, Wissenstransfer, Alumni

Ziel 5:

Die UZH pflegt einen aktiven Austausch mit der Öffentlichkeit und den Alumni. Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Wirtschaft.


Massnahme 5.1:

Die UZH erweitert ihr Angebot an Einrichtungen und Aktivitäten für die Öffentlichkeit. Dazu gehören Museen, Vortragsreihen, Ausstellungen und weitere Veranstaltungen.

Massnahme 5.2:

Die UZH unterstützt ihre Forschenden bei der Umsetzung von Forschungsergebnissen und von Kooperationen mit der Wirtschaft. Sie verstärkt das Angebot an zentralen Dienstleistungen für die Realisierung innovationsfördernder Projekte.

Identifikation Risikogruppen



Analyse des Risikos

- Interaktionen
- Indikationsstellung
- Kontraindikationen
- Genetische Varianten
- Ungeeignete Medikamente im Alter
- QT-Zeit verlängernde Medikamente
- Unerwünschte Wirkungen
- Dosierung
- Schwangerschaft
- Wirksamkeit

Fachinfo Fucidin

Kontraindikationen

...

Aufgrund von Berichten über teilweise lebensbedrohliche Interaktionen muss angenommen werden, dass Fucidin® hemmend auf den CYP 3A4 vermittelten Abbau anderer Arzneimittel wirken kann. Fucidin® darf daher nicht gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln, welche über das CYP 3A4 Enzym metabolisiert werden, verwendet werden, sofern bei einer Erhöhung der Plasmaspiegel dieser Arzneimittel mit schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen zu rechnen ist (siehe „Interaktionen“)...

Interaktionen

Zwar ist der genaue Metabolismus von Fucidin® in der Leber nicht bekannt, jedoch wird eine Interaktion von Fucidin® mit Medikamenten vermutet, die über das Cytochrom P450-3A4 (CYP-3A4) biotransformiert werden. Als Mechanismus dieser Interaktion wird eine gegenseitige Hemmung des Metabolismus angenommen.

Die Anwendung von systemischem Fucidin® sollte deshalb bei Patienten, die mit CYP-3A4 biotransformierten Medikamenten behandelt werden, vermieden werden.

Fachinfo Urispas

Eigenschaften/Wirkungen

ATC-Code: G04BD02

Flavoxat ist ein nicht anticholinergisches Spasmolytikum mit Wirkung auf die glatte Muskulatur der unteren Harnwege.

Interaktionen

Die gleichzeitige Einnahme von Antazida sollte wegen möglicher Resorptionsbeeinflussung und demzufolge verminderter Wirksamkeit von Urispas vermieden werden. Bei Gabe von Dopaminantagonisten (z.B. Metoclopramid) ist eine gegenseitige Wirkungsinderung möglich. Durch Amantadin, Chinidin, Neuroleptika und tri- und tetrazyklische Antidepressiva kann die anticholinerge Wirkung verstärkt werden.

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen

Eine gewisse Zurückhaltung ist bei der Anwendung an Patienten mit Verdacht auf Glaukom angezeigt. Flavoxat wirkt nicht anticholinergisch, aber spezifische Studien bei Glaukom-Patienten wurden nicht durchgeführt.

https://github.com/epha/matrix

 This repository Search

Explore Gist Blog Help

curki + -







 epha / matrix

Unwatch 3

Star 1

Fork 1

Issues Pull requests Labels Milestones

Filters is:issue is:open

New Issue

☐ 15 Open ✓ 57 Closed

Author Labels Milestones Assignee Sort

☐  **Tirosint, Phenhydan, Colestide**  0
#72 opened 5 days ago by zdavatz

☐  **wrong alternatives - please delete**  0
#71 opened 6 days ago by curki

☐  **Kalium interactions not shown**  1
#70 opened 6 days ago by curki

☐  **delete by orbit object**  0
#60 opened 28 days ago by ephaee

☐  **browser back breaks product menu in some situations**  0
#55 opened on 21 Mar by ephaee 1.5.0

☐  **PDF should include epha credits, license and contact info**  3
#52 opened on 10 Mar by ephaee 1.5.0

☐  **Client error tracking**   1
#46 opened on 22 Feb by Jonas74 1.5.0

☐  **Cancel and Save**   1
#45 opened on 17 Feb by Jonas74



Chance oder Risiko

 epha / matrix

 Unwatch ▾

3

★ Star 1

 Fork 1

Tirosint, Phenhydantoin, Colestid #72

Edit

New Issue



Open

zdavatz opened this issue 5 days ago · 0 comments



zdavatz commented 5 days ago

Ein Hausarzt meldet, dass in der FI von Tirosint die folgenden Interaktionen vorkommen:

Tirosint interagiert mit: Phenhydantoin, Colestid

<http://ch.oddb.org/de/gcc/fachinfo/reg/57455/chapter/interactions>

Gruss

Zeno

Labels



None yet

Milestone



No milestone

Assignee



 curki



Wertvolle Information

"Mec": "PK",

"Mechanismus": "Colestipol und Colestyramin sind Anionen austauschende Harze. Es kann daher zur Bindung gleichzeitig verabreichter (anionischer) Arzneistoffe kommen, wodurch deren Resorption vermindert oder verzögert werden kann.",

"Eff": "Resorptionsverringerung von Levothyroxin",

"Effekt": "Es kann unter erniedrigten Thyroxinkonzentrationen zu einer unzureichenden Wirkung der Schilddrüsenhormonersatztherapie kommen.",

"Kli": "Monitorisierung",

"Klinik": "Die Einnahme von L-Thyroxin sollte mindestens 4-5 Stunden vor der Gabe von Anionenaustauscherharzen erfolgen. Insbesondere zu Beginn und bei Beendigung der Therapie mit Colestipol/Colestyramin sollten diese Patienten gut überwacht und das TSH monitorisiert werden.",

"Grad": "C",

Wertvollste Information

Matrix | Kompendium | Download Anmeldung

Q Produkte suchen Mi, 29.04.2015 X

Doxycyclin, Tabletten
Doxycyclin >> 3

Amiodar, Tabletten
Amiodaron C C

Doxycyclin → Amiodaron X

C *Beurteilung: Monitorisieren* i

Erhöhtes Risiko für Hepatotoxizität

The diagram features a large, light-colored oval with concentric circles in shades of pink and blue. A thick orange arrow points from left to right, passing through the center of the oval. On the left side of the arrow, there is a blurred grey box containing the text 'Doxycyclin, Tabletten' and 'Doxycyclin'. On the right side, there is a blurred yellow box containing the text 'Amiodar, Tabletten' and 'Amiodaron'.

Pseudoephedrin und top. Sympathomimetika

Kontraindikationen

Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe.

Schwere Hypertonie.

Schwere koronare Herzkrankheit.

Schwere Leberfunktionsstörungen/akute Hepatitis.

Schwere Nierenfunktionsstörungen.

Epilepsie.

Gleichzeitige Behandlung mit einem MAO-Hemmer, mit Sympathomimetika oder mit einem serotoninergen Arzneimittel (z.B. gewisse Antidepressiva und Anorektika).

Vorsichtsmassnahmen

Xylometazolin beeinflusst Paracetamol, Kombinationen exkl. Psycholeptika

Beurteilung: Vorsichtsmassnahmen

Klassifikation: [EI:B]

Mechanismus

Sympathomimetika können die (toxischen/unerwünschten) Wirkungen anderer Sympathomimetika verstärken.

Effekt

Bei bestimmungsgemässer Anwendung sind systemische Effekte von Xylometazolin-Nasensprays laut Fachinformation vernachlässigbar. Eine additive sympathomimetische Wirkung bei Kombination mit Pseudoephedrin ist daher nicht zu erwarten. In höheren als in der Fachinformation empfohlenen Dosen topischer Applikationsformen kann jedoch eine ausreichende systemische Konzentration der Sympathomimetika erzielt werden [Figueiras-Graillet LM, 2013]. Das Risiko für unerwünschte, vor allem das kardiovaskuläre System (Blutdruckanstieg, Tachykardie) betreffende Arzneimittelwirkungen, kann sich dann erhöhen. Besonders bei Patienten mit Hypertonie oder koronarer Herzkrankheit kann sich ein verstärkter sympathomimetischer Effekt negativ auswirken.

Massnahmen

Vorsichtshalber auf verstärkte sympathomimetische Effekte wie Blutdruckerhöhung und Tachykardie achten.

Literatur

Reversible cardiomyopathy due to chronic use of xylometazoline topical nasal spray.
Figueiras-Graillet LM, Martínez-Sellés M, Perez-David E, Fernandez-Avilés F
PMID: 23079093, *International journal of cardiology*, 2013 Apr.

Issue: P.H. Jg 1953

Diagnosen

- Anpassungsstörung und Angst gemischt
- St. n. Mammakarzinom und Radiotherapie
- Arterielle Hypertonie
- Tinnitus beidseits

Medikation

Losartan Mepha 50 mg 1-0-0

Metoprolol Teva 50 mg 1-0-0

Tamoxifen (Nolvadex®) 20 mg 1-0-0

Trazodon (Trittico®) 50 mg 0-0-1, Stopp wegen Nausea und Schwindel

Neu alternativ: Paroxetin, **Probleme?**

Fallbeispiel - Interaktionen


Matrix | Kompendium

Anmeldung

Produkte suchen

Mi, 07.01.2015

Paroxetin-Mepha Paroxetin	Ø	>> 5
Metoprolol-Teva Re... Metoprolol	C	C
Nolvadex Tamoxifen	X	X
Losartan-Mepha Losartan	B	B



Produkte entfernen

Frei transformieren



UniversitätsSpital
Zürich

Fallbeispiel

Matrix | Kompendium

Anmeldung

Produkte suchen

Mi, 07.01.2015

Paroxetin-Mepha
Paroxetin



Metoprolol-Teva Re...
Metoprolol



Nolvadex
Tamoxifen



Losartan-Mepha
Losartan



Produkte entfernen

Paroxetin → Tamoxifen



Beurteilung: Kontraindiziert

Wirkungsverringering von Tamoxifen



Paroxetin-Mepha



UniversitätsSpital
Zürich

Paroxetin beeinflusst Tamoxifen

Beurteilung: Kontraindiziert

Klassifikation: [EI:X]

Mechanismus

Tamoxifen wird über CYP3A4 und CYP2D6 zu aktiven Metaboliten umgewandelt. Der Hauptmetabolit Endoxifen wird über CYP2D6 gebildet. Paroxetin hemmt CYP2D6 stark.

Effekt

Die reduzierte Bildung von Endoxifen und 4-Hydroxy-Tamoxifen durch Hemmung von CYP2D6 kann zu einer reduzierten Tamoxifen-Wirksamkeit führen. In Studien wurden signifikant niedrigere Plasmakonzentrationen von Endoxifen gemessen, wenn Tamoxifen zusammen mit Paroxetin verabreicht wurde [Stearns V, 2003][Borges S, 2006]. In einer retrospektiven Analyse erhöhte die Kombination von starken CYP2D6-Hemmern mit Tamoxifen das Brustkrebs-Rezidivrisiko um das 3-fache [Goetz MP, 2007]. In einer Kohortenstudie stieg die Brustkrebs-assoziierte Mortalität bei Einnahme von Paroxetin mit Tamoxifen an [Kelly CM, 2010].

Massnahmen

Tamoxifen sollte nicht mit Paroxetin kombiniert werden. Es sollte ein Antidepressivum eingesetzt werden, das weniger mit Tamoxifen wechselwirkt, wie beispielsweise Venlafaxin.

Literatur

[The impact of cytochrome P450 2D6 metabolism in women receiving adjuvant tamoxifen.](#)

Goetz MP, Knox SK, Suman VJ, Rae JM, Safgren SL, Ames MM, Visscher DW, Reynolds C, Couch FJ, Lingle WL, Weinshilboum RM, Fritcher EG, Nibbe AM, Desta Z, Nguyen A, Flockhart DA, Perez EA, Ingle JN

PMID: 17115111, *Breast cancer research and treatment*, 2007 Jan.

[Interactions between tamoxifen and antidepressants via cytochrome P450 2D6.](#)

Desmarais JE, Looper KJ

PMID: 20141708, *The Journal of clinical psychiatry*, 2009 Dec.

[Active tamoxifen metabolite plasma concentrations after coadministration of tamoxifen and the selective serotonin reuptake inhibitor paroxetine.](#)

Stearns V, Johnson MD, Rae JM, Morocho A, Novielli A, Bhargava P, Hayes DF, Desta Z, Flockhart DA

PMID: 14652237, *Journal of the National Cancer Institute*, 2003 Dec.

[Quantitative effect of CYP2D6 genotype and inhibitors on tamoxifen metabolism: implication for optimization of breast cancer treatment.](#)

Borges S, Desta Z, Li L, Skaar TC, Ward BA, Nguyen A, Jin Y, Storniolo AM, Nikoloff DM, Wu L, Hillman G, Hayes DF, Stearns V, Flockhart DA


PMID: 16815318, *Clinical pharmacology and therapeutics*, 2006 Jul.

[Selective serotonin reuptake inhibitors and breast cancer mortality in women receiving tamoxifen: a population based cohort study.](#)

Kelly CM, Juurlink DN, Gomes T, Duong-Hua M, Pritchard KI, Austin PC, Paszat LF

PMID: 20142325, *BMJ (Clinical research ed.)*, 2010 Feb.

Entscheidungsmodell zur Klassifikation



Lösungsansatz: Alternativen

Matrix | Kompendium

Q Produkte suchen

Paroxetin-Mepha Paroxetin	Ø	«	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Metoprolol-Teva Re... Metoprolol	C	C	A	C	B	B	B
Nolvadex Tamoxifen	X	X	D	X	B	D	B
Losartan-Mepha Losartan	B	B	B	B	A	B	A

Paroxetin

durch **Citalopram** ersetzen

Anzeige aller verfügbaren Präparate

Matrix Kompendium	
Q N06AB04	
Metoprolol-Teva Re... Metoprolol	B Seropram Citalopram
Nolvadex Tamoxifen	Ø Citalopram Sandoz Citalopram
Losartan-Mepha Losartan	B Citalopram Streuli Citalopram
	Citalopram-Mepha Citalopram
	Claropram Citalopram
	Citalopram Actavis Citalopram
	Citalopram Helvepharm Citalopram

Interaktionsmodell nach Therapiewechsel von Paroxetin → Citalopram

Matrix | Kompendium


Anmeldung

Produkte suchen

Mi, 07.01.2015

- Citalopram-Mepha
Citalopram ☐
- Metoprolol-Teva Re...
Metoprolol ☒
- Nolvadex
Tamoxifen ☒
- Losartan-Mepha
Losartan ☒

Produkte entfernen



Frei transformieren



Arzneimitteldateien

Datum	Quelle	Datei	
2015-04-20 16:36:20	Interaktionen Klinik für Klinische Pharmakologie USZ	matrix.csv	6.4 MiB
		matrix.json	9.7 MiB
2015-04-20 16:32:48	Spezialitätenliste Bundesamt für Gesundheit BAG	bag.json	6.8 MiB
		bag.min.json	4.6 MiB
		it.json	30.1 KiB
		it.min.json	20.4 KiB
2015-04-23 11:45:48	Zugelassene Arzneimittel Schweizerische Zulassungsbehörde für Heilmittel	swissmedic.json	13 MiB
		swissmedic.min.json	10.5 MiB