



Projekt SAI

Strukturierte Arzneimittel Information

vips Forum aktuell 8. September 2016 Olten

Agenda



- Ausgangslage
- Auftraggeber
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Informationsquellen
- Stand der Arbeiten
- Planung
- Fragen

Ausgangslage



«Arzneimittel - Kompendium»

Bis Mitte 2011


- de facto Monopol
- keine gesetzliche Grundlage

Urteil Bundesverwaltungsgericht


- Kein Monopol ohne formelle gesetzliche Grundlage

Auftraggeber

Organisation




Projektgruppe SAI




Problemstellung

Strukturierung von Arzneimittelinformationen Abstraktion und Kontextualität



Zielsetzung



(Beiliegend ist mit 0,2 ml Heparin versetzt; dabei entsprechen 0,2 ml Sirup 20'000 i.U. Phenoxymethylpenicillin Benzathionum. Die maximale Füllmenge beträgt 5 ml (= 200'000 i.U.).

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten
 Leichte Infektionen durch grampositive penicillinempfindliche Bakterien, insbesondere Angina, Bronchopneumonie, Stonsitis, Sinusitis, Sinusitis, Otitis media, Impetigo, Piodermie, Prostylie bei kleinen chirurgischen Eingriffen (Zahnheilkunde), Resektionsprophylaxe der muskuloskeletalen Infektionen.

Dosierung/Anwendung
 Sirup: Bei Kindern 250 mg 4-mal täglich.
 Die Dosierung des Sirups erfolgt mit Hilfe einer Dosierpipette, welche der Packung beiliegt.

Bei Streptokokkeninfektionen sollte die Therapie mindestens 10 Tage dauern.

Kontraindikationen
 Bekannte Allergie gegen Penicilline, andere β -Lactam-Antibiotika oder andere Bestandteile des Arzneimittels.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
 Bei Magen-Darmstörungen (Erbrechen, Durchfälle) sollte Penicillin Spig HC nicht eingesetzt werden.

Dosierung/Anwendung

Sirup: Bei Kindern 250 mg 4-mal täglich.

Die Dosierung des Sirups erfolgt mit Hilfe einer Dosierpipette, welche der Packung beiliegt.

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten

Leichte Infektionen durch grampositive penicillinempfindliche Bakterien, insbesondere Angina, Bronchopneumonie, Stonsitis, Sinusitis, Sinusitis, Otitis media, Impetigo, Piodermie, Prostylie bei kleinen chirurgischen Eingriffen (Zahnheilkunde), Resektionsprophylaxe der muskuloskeletalen Infektionen.

Dosierung/Anwendung

Sirup: Bei Kindern 250 mg 4-mal täglich.

Die Dosierung des Sirups erfolgt mit Hilfe einer Dosierpipette, welche der Packung beiliegt.

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten

Leichte Infektionen durch grampositive penicillinempfindliche Bakterien, insbesondere Angina, Bronchopneumonie, Stonsitis, Sinusitis, Sinusitis, Otitis media, Impetigo, Piodermie, Prostylie bei kleinen chirurgischen Eingriffen (Zahnheilkunde), Resektionsprophylaxe der muskuloskeletalen Infektionen.

Dosierung/Anwendung

Sirup: Bei Kindern 250 mg 4-mal täglich.

Die Dosierung des Sirups erfolgt mit Hilfe einer Dosierpipette, welche der Packung beiliegt.

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten

Leichte Infektionen durch grampositive penicillinempfindliche Bakterien, insbesondere Angina, Bronchopneumonie, Stonsitis, Sinusitis, Sinusitis, Otitis media, Impetigo, Piodermie, Prostylie bei kleinen chirurgischen Eingriffen (Zahnheilkunde), Resektionsprophylaxe der muskuloskeletalen Infektionen.

Dosierung/Anwendung

Sirup: Bei Kindern 250 mg 4-mal täglich.

Die Dosierung des Sirups erfolgt mit Hilfe einer Dosierpipette, welche der Packung beiliegt.

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten

Leichte Infektionen durch grampositive penicillinempfindliche Bakterien, insbesondere Angina, Bronchopneumonie, Stonsitis, Sinusitis, Sinusitis, Otitis media, Impetigo, Piodermie, Prostylie bei kleinen chirurgischen Eingriffen (Zahnheilkunde), Resektionsprophylaxe der muskuloskeletalen Infektionen.

Dosierung/Anwendung

Sirup: Bei Kindern 250 mg 4-mal täglich.

Die Dosierung des Sirups erfolgt mit Hilfe einer Dosierpipette, welche der Packung beiliegt.

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten

Leichte Infektionen durch grampositive penicillinempfindliche Bakterien, insbesondere Angina, Bronchopneumonie, Stonsitis, Sinusitis, Sinusitis, Otitis media, Impetigo, Piodermie, Prostylie bei kleinen chirurgischen Eingriffen (Zahnheilkunde), Resektionsprophylaxe der muskuloskeletalen Infektionen.

Dosierung/Anwendung

Sirup: Bei Kindern 250 mg 4-mal täglich.

Die Dosierung des Sirups erfolgt mit Hilfe einer Dosierpipette, welche der Packung beiliegt.

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten

Leichte Infektionen durch grampositive penicillinempfindliche Bakterien, insbesondere Angina, Bronchopneumonie, Stonsitis, Sinusitis, Sinusitis, Otitis media, Impetigo, Piodermie, Prostylie bei kleinen chirurgischen Eingriffen (Zahnheilkunde), Resektionsprophylaxe der muskuloskeletalen Infektionen.


Dosierung/Anwendung

Sirup: Bei Kindern 250 mg 4-mal täglich.

Die Dosierung des Sirups erfolgt mit Hilfe einer Dosierpipette, welche der Packung beiliegt.



Indikation	Dosierung	Wirkstoff	Wirkstoffklasse	Wirkstoffgruppe	Wirkstofftyp
Leichte Infektionen durch grampositive penicillinempfindliche Bakterien, insbesondere Angina, Bronchopneumonie, Stonsitis, Sinusitis, Sinusitis, Otitis media, Impetigo, Piodermie, Prostylie bei kleinen chirurgischen Eingriffen (Zahnheilkunde), Resektionsprophylaxe der muskuloskeletalen Infektionen.	Sirup: Bei Kindern 250 mg 4-mal täglich.	Phenoxymethylpenicillin	Penicilline	Antibiotika	Antibiotika
Bekannte Allergie gegen Penicilline, andere β -Lactam-Antibiotika oder andere Bestandteile des Arzneimittels.	Sirup: Bei Kindern 250 mg 4-mal täglich.	Phenoxymethylpenicillin	Penicilline	Antibiotika	Antibiotika
Bei Magen-Darmstörungen (Erbrechen, Durchfälle) sollte Penicillin Spig HC nicht eingesetzt werden.	Sirup: Bei Kindern 250 mg 4-mal täglich.	Phenoxymethylpenicillin	Penicilline	Antibiotika	Antibiotika




Visualisierung

Strukturierung

Bereitstellung

Speicherung

Anforderungen aus Sicht der Anwender
Prozesse und Werkzeuge



Rohdaten

Prozessierung

Informationsquellen



7680366310680 - Penicillin Spirig HC Filmtabl 1 Mio E 24 Stk

Artikeldaten → refdata / Hersteller

Zulassungsdaten → swissmedic

Versicherungsdaten → BAG (Hyperlink)

Pharmakologische Daten → swissmedic

Fach-/Patienteninformationen → swissmedic

Stand der Arbeiten



Abgeschlossene Aufgaben:

- Definierte Projektorganisation
- Gesicherte Finanzierung
- Abgestimmte Vorstellung (Ausgangslage / Problemstellung / Zielsetzung)
- Analyse der bestehenden Informationsquellen

Momentan in Bearbeitung:

- Definition der anzuwendenden Standards
- Definition der benötigten Datenstruktur
- Definition der notwendigen Systemarchitektur
- Abstimmung der Planung

Planung

Zeitplan

aus heutiger Sicht Stand HMG Revision



? & !

