
NLA: Golub for $k = 1 : m, n$: $u_k = (\text{sgn}(b_{k,k})\|b_{k:m,k}\|e_1 + b_{k:m,k})$; $u_k := \hat{u}_k$; $U_k := I - 2u_k u_k^T$;
 $B_{k:m,k;n} := U_k B_{k:m,k;n}$; $U = [I_{k-1,k-1}, 0; 0, U_k]$; **for** $j = 1 : m, n - 1$: $v_k^T := \text{sgn}(b_{k,k+1})\|b_{k,k+1:n}\|e_1 +$
 $b_{k:m,k}; V_k := I - 2v_k v_k^T$; $B_{1:m,k+1:n} = B_{1:m,k+1:n} V_k$; $V = [I_{k,k}, 0; 0, V_k]$ **endfor** **endfor**; $2 \cdot (2mn^2 - 2n^3/3)$
Householder for $k = [1, n]$: $x = A_{k:m,k}$; $v_k = \text{sgn}(x)\|x\|e_k + x$; $v_k = \frac{v_k}{\|v_k\|}$ **for** $j = [k, n]$ $A_{k:m,j} =$
 $A_{k:m,j} - 2v_k [v_k^* A_{k:m,j}]$ **endfor** **endfor**. $2mn^2 - \frac{2n^3}{3}$. **MG-S** $V = A$; **for** $i = [1, n]$: $r_{ii} = \|v_i\|$; $q_i = \frac{v_i}{r_{ii}}$; **for**
 $j = [i + 1, n]$ $v_j = v_j - (q_i^T v_j) q_i$; $r_{ij} = q_i^T v_j$ **endfor** **endfor**. $2mn^2$. **Arnoldi**: $q_1 := \hat{b}$; $q_{k+1} h_{k+1,k} =$
 $A q_k - \sum_{i=1}^k q_i h_{ik}$; $h_{ik} = q_i^T (A q_k)$; $h_{k+1,k} := \|v\| \rightarrow A Q_k := Q_k H_k + q_{k+1} [0 \dots h_{k+1,k}]$. **Givens**
 $3mn^2$ **SVD**: $= \sum_{i=\min m,n}^r u_i \sigma_i v_i^T$. **QR Algo**: $A_{k+1} = Q_k^T A_k Q_k \rightarrow A_{k+1} = (Q^{(k)})^T A Q^{(k)}$ & $A^k =$
 $(Q_1 \dots Q_k)(R_k \dots R_1) := Q^{(k)} R^{(k)}$, via induction **GMRES**: $\min \|A Q_k y - b\| \rightarrow \min \|H_k y - \|b\| e_1\|$ **CG**
Convergence: $\|e_k\| = \min_{p(0)=1} \|p_k(A) e_0\| = \min_{p_k(A)} \max |p_k(\lambda)| \|e_0\| \rightarrow \leq 2 ((\sqrt{k_2} - 1)/(\sqrt{k_2} + 1))^k$;
need $\alpha := 2(\lambda_1 + \lambda_2)$ **Cheb**: $T_k(x) = \frac{1}{2}(z^k + z^{-k})$; $2xT_k = T_{k+1} + T_{k-1}$ **MP**: $\sigma(G) \in [\sqrt{m} - \sqrt{n}, \sqrt{m} +$
 $\sqrt{n}] \rightarrow k_2 = O(1)$ **Sketch**: with $GA\hat{x} = Gb$, and via $C - F \|G[A, b][v, -1]^T\| \leq (s + \sqrt{n+1}) \|R[v, -1]^T\|$,
similar for lower bound via MP $\rightarrow \|A\hat{x} - b\| \leq (\sqrt{s} + \sqrt{n+1})/(\sqrt{s} - \sqrt{n+1}) \|Ax - b\|$ **Blend**: solve
 $\|(A\hat{R}^{-1})y - b\| = 0$ via CG; $k_2(A\hat{R}^{-1}) = O(1)$ with $GA = \hat{Q}\hat{R}$ **PROOF**: $A = QR$; $GA = GQR = \hat{G}\hat{R}$.
Let $\hat{G} = \hat{Q}\hat{R}$ so $GA = \hat{Q}\hat{R}R \rightarrow \hat{R}^{-1} = R^{-1}\hat{R}^{-1} \rightarrow k_2(A\hat{R}^{-1}) = k_2(\hat{R}^{-1}) = O(1)$ by MP. $O(mn)$ to
solve via normal **Bounds**: $\|ABB^{-1}\| \geq \|AB\| \|B^{-1}\| \rightarrow \|A\|/\|B^{-1}\| \geq \|AB\|$. **Weyls**: $\sigma_i(A + B) =$
 $\sigma_i(A) + [-\|B\|, \|B\|]$ **Rev Δ Ineq**: $\|A - B\| \geq |||A||| - |||B|||$ **Courant Application**: $\sigma_i([A_1; A_2]) \geq$
 $\max(\sigma_i(A_1), \sigma_i(A_2))$ **Schur**: Take $Av_1 = \lambda_1 v_1$; construct $U_1 = [v_1, V_\perp] \rightarrow AU_1 = U_1[e_1, X]$. Repeat.
Conditioning $\kappa_2(A) = \sigma_1/\sigma_n = \|A\| \|A^{-1}\|$ **Similarity**: $A \rightarrow P^{-1}AP$, same λ .
CO: SD: $\|x_{k+1} - x_*\| \leq (k_2(H) - 1)/(k_2(H) + 1) \|x_k - x_*\|$ with H hessian