

# 三重积分

## 概念

$\Omega$  — 有界闭区域,  $f(x, y, z)$  在  $\Omega$  上有界

- 1.  $\Omega \Rightarrow \Delta v_1, \dots, \Delta v_n$
- 2.  $\forall (\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \in \Delta v_i (1 \leq i \leq n)$ , 作
- 3.  $\lambda$  为  $\Delta v_1, \dots, \Delta v_n$  的直径最大者

若  $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i \exists$ , 称此极限为

$f(x, y, z)$  在  $\Omega$  上的三重积分,  $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$ , 即

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv \triangleq \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta v_i$$

## 性质

4.  $\iiint_{\Omega} 1 dv = V$

5. ① 设  $\Omega$  关于  $xoy$  面对称 (上下对称), 上  $\Omega_1$

若  $f(x, y, -z) = -f(x, y, z) \Rightarrow \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = 0$


若  $f(x, y, -z) = f(x, y, z) \Rightarrow \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = 2 \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dv$

## 积分法

### 直角坐标法

对  $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv$


### 铅直投影法



$$\Omega : \begin{cases} (x, y) \in D_{xy} \\ \phi_1(x, y) \leq z \leq \phi_2(x, y) \end{cases}$$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{\phi_1(x, y)}^{\phi_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

计算  $\iiint_{\Omega} (z^2 + 2xy) dV$ , 其中  $\Omega$  为锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与  $z = 2$  所围成的几何体.



$$\text{原式} = I = \iiint_{\Omega} z^2 dV$$


$$\Omega : \begin{cases} (x, y) \in D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 4 \\ \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 2 \end{cases}$$

$$I = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^2 z^2 dz$$

$$= \frac{1}{3} \iint_{D_{xy}} [8 - (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}] dx dy$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (8r - r^4) dr = \frac{2\pi}{3} (16 - \frac{32}{5}) = \frac{2\pi}{3} \times \frac{48}{5} = \frac{32}{5}\pi$$


## 切片法



$$\Omega : \begin{cases} (x, y) \in D_z \\ c \leq z \leq d \end{cases}$$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_c^d dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$$

计算  $\iiint_{\Omega} (z^2 + 2xy) dV$ , 其中  $\Omega$  为锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与  $z = 2$  所围成的几何体.




$$\text{原式} = I = \iiint_{\Omega} z^2 dV$$

$$\Omega : \begin{cases} (x, y) \in D_z : x^2 + y^2 \leq z^2 \\ 0 \leq z \leq 2 \end{cases}$$

$$\text{原式} = \int_0^2 z^2 dz \iint_{D_z} 1 dxdy = \pi \int_0^2 z^4 dz = \frac{32}{5} \pi$$

计算  $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 - xy + z) dV$ , 其中  $\Omega$  为由  $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$  及  $xOy$  平面围成的几何体.



$$\text{原式} = I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dV$$

$$\text{法一} : \Omega \begin{cases} (x, y) \in D_{xy} \\ 0 \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_{xy}} dxdy \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} (x^2 + y^2 + z) dz \\ &= \iint_{D_{xy}} [(x^2 + y^2) \cdot \sqrt{4 - x^2 - y^2} + \frac{1}{2}(4 - x^2 - y^2)] dxdy \\ &= 2\pi \int_0^2 [r^3 \sqrt{4 - r^2} + \frac{1}{2}(4r - r^3)] dr \\ &= 2\pi \left[ \int_0^{\frac{\pi}{2}} 8 \sin^3 t \cdot 4(1 - \sin^2 t) dt + \frac{1}{2}(8 - 4) \right] \\ &= 2\pi \left[ 32 \left( \frac{2}{3} \times 1 - \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} \times 1 \right) + 2 \right] \\ &= \frac{188\pi}{15} \end{aligned}$$

$$\text{法二} : I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dV$$

$$\Omega \begin{cases} (x, y) \in D_z : x^2 + y^2 \leq 4 - z^2 \\ 0 \leq z \leq 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 dz \iint_{D_z} (x^2 + y^2 + z) dxdy \\ &= 2\pi \int_0^2 dz \int_0^{\sqrt{4-z^2}} (r^3 + zr) dr \\ &= 2\pi \int_0^2 \left[ \frac{(4 - z^2)^2}{4} + z \cdot \frac{4 - z^2}{2} \right] dz \\ &= 2\pi \int_0^2 \left( 4 + \frac{1}{4}z^4 \right) - 2z^2 + 2z - \frac{z^3}{2} dz = \frac{188\pi}{15} \end{aligned}$$

## 柱面坐标变换法

1.特征：

① $\Omega$ 边界曲面含 $x^2 + y^2$

② $f(x, y, z)$ 中含 $x^2 + y^2$


2.步骤：

第一步： $\Omega: \begin{cases} (x, y) \in D_{xy} \\ \phi_1(x, y) \leq z \leq \phi_2(x, y) \end{cases}$

第二步：令 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}, \begin{cases} \alpha \leq \theta \leq \beta \\ r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta) \\ \phi_1(\dots) \leq z \leq \phi_2(\dots) \end{cases}$

第三步： $dV = r dr d\theta dz$

## 球面坐标变换法



1.特征：

① $\Omega$ 的边界曲面含 $x^2 + y^2 + z^2$


② $f(x, y, z)$ 中含 $x^2 + y^2 + z^2$

2.变换：

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \sin \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \phi \end{cases}$$

3. $dV = r^2 \sin \phi dr d\theta d\phi$

计算 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$ , 其中 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$ .



$$\text{令} \begin{cases} x = r \cos \theta \sin \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \phi \end{cases}$$

$$(0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1)$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^1 r^2 \sin^2 \phi \cdot r^2 \sin \phi dr \\ &= 2\pi \times \frac{2}{3} \times 1 \times \frac{1}{5} \\ &= \frac{4\pi}{15} \end{aligned}$$

$$f(u) \text{连续}, f(0) = 0, f'(0) = 2, \Omega : x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2 (t > 0, z \geq 0)$$

$$\text{求} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dV}{t^4}$$

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}) dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^t f(r) \cdot r^2 \sin \phi dr \\ &= 2\pi \int_0^t r^2 f(r) dr \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{\pi}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 f(t)}{t^3} \\ &= \frac{\pi}{2} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(0)}{t} = \pi \end{aligned}$$

$$I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2} dV$$

$$\text{法一: } \Omega \begin{cases} (x, y) \in D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 4 \\ 0 \leq z \leq \sqrt{4 - x^2 - y^2} \end{cases}$$


$$\begin{aligned} \text{原式} &= \iint_{D_{xy}} \sqrt{x^2 + y^2} dxdy \cdot \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} 1 dz = \iint_{D_{xy}} \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{4 - x^2 - y^2} dxdy \\ &= 2\pi \int_0^2 r^2 \sqrt{4 - r^2} dr \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \sin^2 t \cdot 4(1 - \sin^2 t) dt, r = 2 \sin t \\ &= 32\pi(I_2 - I_4) \\ &= 32\pi\left(\frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} - \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2}\right) \\ &= 2\pi^2 \end{aligned}$$

$$\text{法二: } \Omega \begin{cases} (x, y) \in D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 4 - z^2 \\ 0 \leq z \leq 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^2 dz \iint_{D_z} \sqrt{x^2 + y^2} dxdy \\ &= 2\pi \int_0^2 dz \int_0^{\sqrt{4-z^2}} r^2 dr = \frac{2\pi}{3} \int_0^2 (\sqrt{4 - z^2})^3 dz \\ &= \frac{2\pi}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 8 \cos^3 t \cdot 2 \cos t dt, z = 2 \sin t \\ &= \frac{32\pi}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = 2\pi^2 \end{aligned}$$

$$\text{法三: 令 } \begin{cases} x = r \cos \theta \sin \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \phi \end{cases}, \begin{cases} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^2 r \sin \phi \cdot r^2 \sin \phi dr \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \phi d\phi \int_0^2 r^3 dr \\ &= 2\pi \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \times 4 = 2\pi^2 \end{aligned}$$



$$1. m = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV$$

$$2. \bar{x} = \iiint_{\Omega} x \rho dV / \iiint_{\Omega} \rho dV$$

$$\bar{y} = \iiint_{\Omega} y \rho dV / \iiint_{\Omega} \rho dV$$

$$\bar{z} = \iiint_{\Omega} z \rho dV / \iiint_{\Omega} \rho dV$$

$$\text{若 } \rho \equiv C_0, x = \iiint_{\Omega} x dV / \iiint_{\Omega} dV$$