

求导类型

显函数求导

$$y = f(x)$$

$$y = x \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}), \text{求 } y'.$$

$$\begin{aligned} y' &= \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + x \cdot \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \cdot (1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 1}}) \\ &= \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \end{aligned}$$

$$y = (1 + x)^{\sin x}, \text{求 } y'$$

$$\begin{aligned} y' &= e^{\sin x \cdot \ln(1+x)} [\cos x \cdot \ln(1+x) + \frac{\sin x}{1+x}] \\ &= (1+x)^{\sin x} [\cos x \cdot \ln(1+x) + \frac{\sin x}{1+x}] \end{aligned}$$

隐函数求导

$$F(x, y) = F(x, \Phi(x)) = 0 : y = y(x), \frac{dy}{dx}?$$

$$\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}, \text{确定 } y \text{ 为 } x \text{ 的函数, 求 } \frac{dy}{dx}$$

$$\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x} \text{ 两边对 } x \text{ 求导}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{2x + 2y \cdot y'}{2\sqrt{x^2 + y^2}} &= \frac{1}{1 + (\frac{y}{x})^2} \cdot \frac{xy' - y}{x^2} \\ \frac{x + yy'}{x^2 + y^2} &= \frac{xy' - y}{x^2 + y^2} \Rightarrow x + yy' = xy' - y \\ \Rightarrow y' &= \frac{x + y}{x - y} \end{aligned}$$

$$e^{xy} = x^2 + y, y'(0), y''(0)$$

$$1. x = 0 \text{ 代入, } y = 1$$

$$2. e^{xy}(y + xy') = 2x + y', \text{代入, } y'(0) = 1$$

$$\begin{aligned} 3. e^{xy}(y + xy')^2 + e^{xy}(2y' + xy'') &= 2 + y'', \text{代入} \\ 1 + 2 &= 2 + y''(0) \Rightarrow y''(0) = 1 \end{aligned}$$

参数方程求导

$$\begin{cases} x = \Phi(t) \\ y = \phi(t) \end{cases}, \Phi(t), \phi(t) \text{ 可导且, } \Phi(t) \neq 0$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \Phi'(t) \neq 0 \Rightarrow \Delta x = O(\Delta t)$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = \phi'(t)$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta y}{\Delta t}}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta y}{\Delta t}}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{\phi'(t)}{\Phi'(t)} = \frac{dy}{dt} / \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\phi'(t)}{\Phi'(t)}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx} = \frac{d[\frac{\phi'(t)}{\Phi'(t)}] / dt}{dx/dt}$$

设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \arctan t \\ y = \ln(1+t^2) \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1}{1+t^2}} = 2t$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d \frac{dy}{dx}}{dx} = \frac{d(2t)/dt}{dx/dt} = \frac{2}{\frac{1}{1+t^2}} = 2(1+t^2)$$

设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d(\frac{\sin t}{1 - \cos t})/dt}{dx/dt} = \frac{(\frac{\sin t}{1 - \cos t})'}{1 - \cos t}$$

$$\begin{cases} x = 2t^2 + t + 1 \\ e^{yt} = y + 3t \end{cases} \text{求 } \frac{dy}{dx} \Big|_{x=1}.$$

$$1. x = 1 \text{ 时, } t = 0, y = 1$$

$$2. \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$$

$$3. \frac{dx}{dt} = 4t + 1, \frac{dx}{dt} \Big|_{t=0} = 1$$

$$e^{yt}(y + t \cdot \frac{dy}{dt}) = \frac{dy}{dt} + 3$$

$$t = 0, y = 1 \text{ 代入 } \frac{dy}{dt} \Big|_{t=0} = -2$$

$$4. \frac{dy}{dx} \Big|_{x=1} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \Big|_{t=0} = -2$$

分段函数求导

$$f(x) = \begin{cases} e^{ax}, & x < 0 \\ \ln(1+2x) + b, & x \geq 0 \end{cases}, f'(0) \exists, \text{求 } a, b.$$

$$\begin{aligned}
1. & f(0-0) = 1, f(0) = f(0+0) = b \\
& \therefore f(0-0) = f(0+0) = f(0), \therefore b = 1 \\
2. & f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = a \\
& f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+2x)}{x} = 2 \\
& \therefore f'_-(0) = f'_+(0), \therefore a = 2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(x) &= \begin{cases} 1, & x = 0 \\ \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \end{cases}, \text{求 } f'(x) \\
x \neq 0 \text{ 时}, & f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} \\
x = 0 \text{ 时}, & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2} = 0 \Rightarrow f'(0) = 0 \\
\therefore & f'(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}, & x \neq 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(x) &= \begin{cases} \ln(1+2x), & x < 0 \\ ax^2 + bx + c, & x \geq 0 \end{cases}, f''(0) \exists, \text{求 } a, b, c \\
1. & f(0-0) = 0, f(0) = f(0+0) = c \\
& \therefore f(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处连续}, \therefore c = 0 \\
2. & f'(x) = \begin{cases} \frac{2}{1+2x}, & x < 0 \\ 2ax + b, & x \geq 0 \end{cases} \\
& \therefore f'(x) \text{ 在 } x = 0 \text{ 处连续}, \therefore b = 2 \\
& f'(x) = \begin{cases} \frac{2}{1+2x}, & x < 0 \\ 2ax + q, & x \geq 0 \end{cases} \\
3. & f''_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{2}{1+x} - 2}{x} = -4 \\
& f''_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = 2a \\
& \therefore f''_-(0) = f''_+(0), \therefore a = -2
\end{aligned}$$

高阶导数求导

$$\begin{aligned}
& = \\
& = \\
y &= f(x) = e^x \sin x, f^{(n)}(x) \\
f'(x) &= e^x \sin x + e^x \cos x = \sqrt{2} e^x \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \\
f''(x) &= \sqrt{2} [e^x \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + e^x \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)] \\
&= (\sqrt{2})^2 e^x \cdot \sin\left(x + \frac{2\pi}{4}\right) \\
\therefore f^{(n)}(x) &= (\sqrt{2})^n e^x \cdot \sin\left(x + \frac{n\pi}{4}\right)
\end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{1}{2x+1}, f^{(n)}(0)$$

$$f(x) = (2x + 1)^{-1}$$

$$f'(x) = (-1)(2x + 1)^{-2} \cdot 2$$

$$f''(x) = (-1)(-2)(2x + 1)^{-3} \cdot 2^2$$

$$\dots$$

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= (-1)(-2)\dots(-n)(2x + 1)^{-(n+1)} \cdot 2^n \\ &= \frac{(-1)^n n! 2^n}{(2x + 1)^{n+1}} \end{aligned}$$

$$\text{记} : \left(\frac{1}{ax + b}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n! a^n}{(ax + b)^{n+1}}$$

$$f(x) = \ln(2x^2 + x - 1), \text{求} f^{(n)}(x)$$

$$f(x) = \ln(x + 1)(2x - 1) = \ln(x + 1) + \ln(2x - 1)$$

$$f'(x) = \frac{1}{x + 1} + 2 \cdot \frac{1}{2x - 1}$$

$$f^{(n)}(x) = \left(\frac{1}{x + 1}\right)^{n-1} + 2 \cdot \left(\frac{1}{2x - 1}\right)^{n-1}$$

$$= \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(x + 1)^n} + 2 \cdot \frac{(-1)^{n-1} \cdot (n-1)! \cdot 2^{n-1}}{(2x - 1)^n}$$