

# 不定积分的基本概念与性质

## 原函数

$f(x), F(x) (x \in D)$ , 若  $\forall x \in D$  有

$$F'(x) = f(x)$$

称  $F(x)$  为  $f(x)$  在  $D$  上的原函数

① 若  $f(x)$  有原函数, 则一定有无数个原函数, 且任两个原函数之间相差常数

$$\because F'(x) = f(x) \Rightarrow [F(x) + C]' = f(x) (C \in \mathbb{R})$$

② 连续函数一定存在原函数, 反之不对

③ 若  $F(x)$  为  $f(x)$  的一个原函数, 则  $F(x) + C$  ( $C$  为任意数) 为  $f(x)$  的所有原函数

④ 若  $f(x)$  有原函数, 则任两个原函数相差常数

$$\text{如: } F'(x) = f(x), G'(x) = g(x)$$

$$\because [F(x) - G(x)]' = 0, \therefore F(x) - G(x) \equiv C_0$$

⑤ 连续函数一定存在原函数, 反之不对

举例说明存在第二类间断点, 但存在原函数的函数.

$$f(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}, F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

$$x \neq 0: F'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} = f(x)$$

$$x = 0: F'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0)$$

即  $F'(x) = f(x)$ ,  $\therefore F(x)$  为  $f(x)$  的原函数

$\because \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  不存在,  $\therefore x = 0$  为  $f(x)$  第二类间断点

## 不定积分

设  $F(x)$  为  $f(x)$  的一个原函数,  $F(x) + C$  即  $f(x)$  的所有原函数, 称为  $f(x)$  的不定积分, 记

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

$$\textcircled{1} \frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$$

$$\textcircled{2} \int f'(x) dx = f(x) + C$$

## 基本公式

$$1. \int k dx = kx + C$$

$$2. \begin{cases} \textcircled{1} a \neq -1 : \int x^a dx = \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C \\ \textcircled{2} a = -1 : \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C \\ \because x < 0 \text{ 时}, [\ln(-x)]' = \frac{1}{-x} x(-1), \therefore \int \frac{1}{x} dx = \ln(-x) + C \\ x > 0 \text{ 时}, (\ln x)' = \frac{1}{x}, \int \frac{1}{x} dx = \ln x + C \\ \therefore \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} \textcircled{1} a \neq e : \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \\ \textcircled{2} a = e : \int e^x dx = e^x + C \end{cases}$$

$$4. \textcircled{1} \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$\textcircled{2} \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$\textcircled{3} \int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$\textcircled{4} \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\textcircled{5} \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$\textcircled{6} \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

$$\textcircled{7} \int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\textcircled{8} \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\textcircled{9} \int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$\textcircled{10} \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

5. 平方和, 平方差:

$$\begin{cases} \textcircled{1} \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C \\ \textcircled{2} \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \int \frac{d(\frac{x}{a})}{\sqrt{1-(\frac{x}{a})^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$$

$$\textcircled{4} \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \int \frac{d(\frac{x}{a})}{1+(\frac{x}{a})^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$\textcircled{5} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2+a^2}) + C$$

$$\textcircled{6} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2-a^2}| + C$$

$$\textcircled{7} \int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \left[ \int \frac{d(x-a)}{x-a} - \int \frac{d(x+a)}{x+a} \right] = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$

$$\textcircled{8} \int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + C$$