

TỔNG HỢP ĐỀ THI CUỐI KỲ VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1

ĐỀ 1. HK2 2024-2025

Câu 1 (2 điểm):

Một người đứng trên một mặt bàn đang quay (Hình 1) với tốc độ góc là $\omega_i = 1,2 \text{ rad/s}$; hai tay của anh ta dang rộng. Mô-men quán tính của hệ gồm người và bàn quanh trục thẳng đứng đi qua tâm của bàn là $I_i = 6,0 \text{ kg.m}^2$. Nếu khép tay lại, mô-men quán tính của hệ giảm còn $I_f = 2,0 \text{ kg.m}^2$. Bỏ qua ma sát khi mặt bàn quay.

- Tính tốc độ góc của hệ người và bàn (ω_f) sau khi người này khép tay lại.
- Tỷ số giữa động năng lúc sau của hệ với động năng ban đầu là bao nhiêu? Nguồn nào cung cấp động năng bổ sung lúc sau?



Hình 1

Câu 2 (2 điểm):

Một ấm nhôm khối lượng 700 g chứa 2,0 kg nước ở nhiệt độ 27°C được đun nóng bằng một bếp điện có công suất không đổi. Biết 80% nhiệt lượng do bếp cung cấp được dùng vào việc đun nóng ấm nước. Sau 30 phút, 400 g nước đã hóa hơi ở 100°C . Biết nhiệt dung riêng của nước và của nhôm lần lượt là 4200 J/(kg.K) và 880 J/(kg.K) . Nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.


- Tính tổng nhiệt lượng cần thiết để đun nước và ấm nhôm, và nhiệt lượng hóa hơi 400 g nước ở 100°C .
- Tính công suất của bếp điện.

Câu 3 (3 điểm):

Trên hình 2, cho hai vật có khối lượng $m_1 = 2,0 \text{ kg}$ và $m_2 = 3,0 \text{ kg}$ được mắc với nhau bằng một sợi dây nhẹ và không co giãn. Sợi dây được vắt qua một ròng rọc có dạng hình trụ đặc với bán kính $R = 10 \text{ cm}$ và khối lượng $M = 1,0 \text{ kg}$. Vật m_1 được đặt trên mặt phẳng nghiêng có góc hợp với phương ngang $\theta = 45^\circ$. Hệ số ma sát giữa m_1 và mặt phẳng nghiêng là $k = 0,1$. Biết độ lớn gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Bỏ qua hệ chuyển động không vận tốc đầu.

a) Tính gia tốc của hai vật m_1 và m_2 .

b) Tính độ lớn của các lực căng dây.



Hình 2

Câu 4 (3 điểm):

Một máy lạnh có tác nhân là một khối khí lý tưởng lưỡng nguyên tử. Khối khí thực hiện một chu trình gồm các quá trình (1-2) đoạn nhiệt, (2-3) đẳng áp, (3-4) đẳng nhiệt và (4-1) đẳng áp. Biết: $V_1 = 18 \text{ lít}$, $V_2 = 8 \text{ lít}$, $V_3 = 4 \text{ lít}$, $P_1 = 9 \text{ atm}$, $T_1 = 450 \text{ K}$, và $1 \text{ atm} = 105 \text{ N/m}^2$.

a) Vẽ chu trình biến đổi của chất khí trên hệ trục tọa độ (P-V).

b) Tính nhiệt độ tại trạng thái 4 (T_4) và thể tích tại trạng thái 4 (V_4).

c) Tìm công thực hiện của từng quá trình và từ đó tính tổng công của toàn bộ chu trình.

d) Tính hệ số làm lạnh ε .


.....

ĐỀ 2. HK1 2024-2025 (Ca 2)

Câu 1 (5 điểm):

Hai vật $m_1 = 15,0 \text{ kg}$ và $m_2 = 20,0 \text{ kg}$ được nối nhau bởi một sợi dây nhẹ và không giãn (bỏ qua khối lượng của sợi dây) vắt qua một ròng rọc có bán kính $R = 25,0 \text{ cm}$ và có mô men


quán tính I như mô tả trong hình. Vật m_1 chuyển động đi lên với gia tốc không đổi là $2,0 \text{ m/s}^2$, ma sát với mặt phẳng nghiêng với hệ số ma sát $k = 0,1$. Mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một góc $\theta = 30^\circ$ và $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- Vẽ hình phân tích và viết phương trình chuyển động đối với hai vật và ròng rọc?
- Xác định các lực căng dây T_1 và T_2 ở hai bên ròng rọc?
- Tìm mô men quán tính của ròng rọc?
- Tính động năng của hệ tại thời điểm $t = 3,0 \text{ s}$.

Câu 2 (5 điểm):

Khối khí lý tưởng lưỡng nguyên tử thực hiện chu trình thuận nghịch như mô tả chi tiết trong hình. Quá trình (1-2) là quá trình giãn nở đẳng nhiệt. Quá trình (2-3) là quá trình đẳng áp. Quá trình (3-1) là quá trình đẳng tích. Cho $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ N/m}^2$, $R = 8,31 \cdot 10^3 \text{ J/(kmol.K)}$.



- Tính công thực hiện của chất khí trong một chu trình?
- Tính nhiệt lượng chất khí nhận vào và thải ra trong một chu trình?
- Tính hiệu suất của chu trình?


.....

ĐỀ 3. HK1 2024-2025 (Ca 1)

Câu 1 (5 điểm):

Một khối gỗ có khối lượng $m_1 = 4,0 \text{ kg}$ được nối với khối gỗ thứ hai có khối lượng $m_2 = 3,0 \text{ kg}$, thông qua một ròng rọc cố định dạng đĩa tròn, có khối lượng và bán kính lần lượt là m


= 2,0 kg và $R = 10 \text{ cm}$. Biết hệ số ma sát giữa m_1 và mặt bàn là $k = 0,1$. Thả cho hệ bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- Tính mô men quán tính của ròng rọc.
- Tính gia tốc của hệ và các lực căng dây.
- Tính động năng của hệ tại thời điểm $t = 4,0$ giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động.
- Tại thời điểm 4,0 giây, dây nối các vật bị đứt. Tính quãng đường vật m_1 đi được cho đến khi dừng lại. Cho rằng mặt bàn đủ dài để vật m_1 chuyển động đến lúc dừng mà vẫn chưa chạm ròng rọc.

Câu 2 (5 điểm):

Hình bên biểu diễn chu trình thuận nghịch của 0,6 mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử. Biết quá trình (1-2) đẳng tích, quá trình (2-3) đoạn nhiệt, quá trình (3-1) đẳng áp. Số liệu được cho trên hình, ở trạng thái “1” có áp suất $P_1 = 1,8 \text{ atm}$, thể tích $V_1 = 8 \text{ lít}$, ở trạng thái “3” thể tích $V_3 = 24 \text{ lít}$.



- Tính áp suất của khối khí ở trạng thái “2” và nhiệt độ ở trạng thái “1” và trạng thái “3”.
- Tính độ biến thiên nội năng của khối khí trong toàn bộ chu trình.
- Tính công khối khí thực hiện trong toàn bộ chu trình.
- Tính hiệu suất của động cơ nếu hoạt động theo chu trình thuận nghịch trên.

Cho biết: $1 \text{ atm} = 105 \text{ N/m}^2$; $R = 8,31.103 \text{ J/(kmol.K)}$.

.....

ĐỀ 4. HK1 2024-2025 (CNTN)


Câu 1 (2 điểm):

Từ đỉnh một mặt phẳng dài 1,0 m, nghiêng góc 30° so với mặt phẳng ngang, người ta thả cho một quả cầu đặc lăn không trượt trên mặt phẳng nghiêng đó. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Tìm vận tốc của quả cầu ở cuối mặt phẳng nghiêng đó. Biết momen quán tính của quả cầu đặc đối với trục quay qua khối tâm là $I = \frac{2}{5}mR^2$, với m và R tương ứng là khối lượng và bán kính của quả cầu.

Câu 2 (4 điểm):

Một vật có khối lượng $m_1 = 3,0 \text{ kg}$ được đặt trên một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng $\alpha = 30^\circ$ so với mặt phẳng ngang, hệ số ma sát trượt $k = 0,25$. Vật m_1 được nối với vật có khối lượng $m_2 = 6,0 \text{ kg}$ bằng một sợi dây nhẹ và không dẫn vắt qua ròng rọc. Biết ròng rọc dạng vành tròn có khối lượng $M = 2,0 \text{ kg}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$. Thả cho hệ bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ.



- Xác định gia tốc và các lực căng dây của hệ?
- Giả sử lúc đầu vật m_2 cách mặt đất $h = 5,0 \text{ m}$. Tính thời gian từ lúc m_2 bắt đầu chuyển động đến khi chạm đất và vận tốc m_2 lúc chạm đất.
- Tính động năng của hệ ngay trước khi vật m_2 chạm đất.
- Sau khi m_2 chạm đất, vật m_1 đi lên theo mặt phẳng nghiêng một đoạn đường s thì dừng lại và bắt đầu đi xuống. Xác định đoạn đường s .

Câu 3 (4 điểm):

Cho 2,0 kmol khí lý tưởng đơn nguyên tử thực hiện chu trình thuận nghịch khép kín. Trong đó, quá trình (1-2) là nén đẳng nhiệt, đưa khối khí đến trạng thái “2” có áp suất P_2 , thể tích V_2 , sau đó bằng quá trình giãn nở đẳng áp (2-3) đưa khối khí về trạng thái “3” có nhiệt độ T_3 , thể tích V_3 , cuối cùng thực hiện quá trình đẳng tích (3-1). Biết trạng thái “1” có nhiệt độ

$T_1 = 600 \text{ K}$, áp suất $P_1 = 10^5 \text{ N/m}^2$, tỷ lệ giữa thể tích cực đại và cực tiểu của chu trình là $V_{\max}/V_{\min} = 4$.

- a) Vẽ chu trình trên mặt phẳng (P, V).
- b) Tính các thông số trạng thái V_1, P_2, V_2, T_3 .
- c) Tính nhiệt lượng thu hoặc tỏa trong mỗi quá trình.
- d) Tính hiệu suất chu trình.

Cho biết: Hằng số khí lý tưởng $R = 8,31.10^3 \text{ J/(kmol.K)}$

.....

ĐỀ 5. HK1 2024-2025 (CTK)

Câu 1 (2 điểm):


Một viên đạn khối lượng $m = 20,0 \text{ g}$ chuyển động theo phương ngang đến va chạm mềm vào một bao cát $M = 10,0 \text{ kg}$ được treo bởi sợi dây có chiều dài $L = 1,0 \text{ m}$. Trước khi va chạm, bao cát M đứng yên. Sau va chạm, dây treo bao cát bị lệch khỏi phương thẳng đứng góc 20° . Tính:

- a) Vận tốc của viên đạn trước khi va chạm vào bao cát.
- b) Phần động năng bị mất do va chạm giữa viên đạn và bao cát.

Câu 2 (4 điểm):

Hai vật có khối lượng $m_1 = 2,0 \text{ kg}$ và $m_2 = 6,0 \text{ kg}$ được nối với nhau bằng sợi dây không khối lượng, vắt qua ròng rọc có dạng đĩa tròn, bán kính $R = 0,25 \text{ m}$, khối lượng $M = 8,0 \text{ kg}$. Góc hợp bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang là $\theta = 30^\circ$, hệ số ma sát trượt của cả hai vật và mặt sàn là $k = 0,3$. Thả cho hệ bắt đầu chuyển động.

- a) Xác định gia tốc của hệ và lực căng dây tác dụng vào mỗi vật.
- b) Tính quãng đường vật m_1 đi được sau khoảng thời gian $5,0$ giây kể từ lúc bắt đầu chuyển động.



Câu 3 (4 điểm):

Một động cơ nhiệt thực hiện chu trình thuận nghịch gồm 3 quá trình, với tác nhân được xem là một chất khí lý tưởng có bậc tự do $i = 6$. Đầu tiên, tác nhân được biến đổi đẳng tích từ trạng thái ban đầu “1” có $P_1 = 1,0 \text{ atm}$ và $V_1 = 2,0 \text{ lít}$ đến trạng thái “2” có áp suất tăng gấp ba. Sau đó, cho chất khí biến đổi đoạn nhiệt đến trạng thái “3”. Cuối cùng, biến đổi đẳng áp để trở về trạng thái ban đầu “1”.

- Tính thể tích V_3 ở trạng thái thứ 3.
- Tính công và nhiệt lượng của khối khí nhận trong từng quá trình.
- Tính hiệu suất của động cơ nhiệt trên.


Cho biết: $g = 10 \text{ m/s}^2$, $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ N/m}^2$, $R = 8,31.10^3 \text{ J/(mol.K)}$.

.....

ĐỀ 6. HK2 2023-2024

Câu 1 (2 điểm):


Cho quả cầu m có khối lượng 2 kg được treo vào một sợi dây có chiều dài $d = 1 \text{ m}$, đầu còn lại của sợi dây được cố định vào một mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu quả cầu được nâng lên để phương sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc $\theta = 60^\circ$, sau đó quả cầu được thả ra và va chạm hoàn toàn đàn hồi với vật M có khối lượng 5 kg (Hình vẽ). Biết gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Xem quả cầu m và vật M là các chất điểm.



- Xác định vận tốc của quả cầu m ngay trước lúc va chạm và ngay sau khi va chạm.
- Tính vận tốc vật M sau va chạm
- Sau va chạm, vật M trượt không ma sát trên đoạn đường cong AB . Hãy xác định độ cao cực đại của vật M , biết rằng vị trí ở độ cao cực đại vẫn nằm trong đường cong.

Câu 2 (4 điểm)


Cho hệ cơ gồm hai vật $m_1 = 15 \text{ kg}$ và $m_2 = 20 \text{ kg}$ được nối với nhau bởi một sợi dây nhẹ (bỏ qua khối lượng của sợi dây), không co giãn và vắt qua một ròng rọc như mô tả trong hình bên. Vật m_1 làm bằng thép 304 có dạng hình hộp chữ nhật, vật m_2 làm bằng thạch cao bao gồm 2 khối trụ m_a và m_b ghép lại bằng keo ($m_a = 5 \text{ kg}$, $m_b = 15 \text{ kg}$). Ròng rọc là đĩa tròn đặc, có bán kính $R = 0,25 \text{ m}$ và có mô men quán tính I . Vật m_1 chuyển động (chưa biết chuyển động lên hay xuống) không ma sát với mặt phẳng nghiêng với gia tốc không đổi là 3 m/s^2 . Mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một góc $\theta = 30^\circ$, cho gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



- Vẽ hình phân tích các lực tác dụng trên hai vật và ròng rọc. Viết các phương trình liên quan đến chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay của hệ?
- Xác định các lực căng dây T_1 và T_2 ở hai bên ròng rọc?
- Tìm mô men quán tính của ròng rọc?
- Khi m_2 chuyển động xuống được 2 giây thì khối trụ m_b rơi ra khỏi m_2 . Hãy mô tả chiều hướng chuyển động của hệ lúc này

Câu 3 (4 điểm):

Cho 2 mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử thực hiện chu trình như mô tả chi tiết trong hình bên. Quá trình $A \rightarrow B$ là quá trình giãn nở đẳng nhiệt. Cho hằng số khí $R = 8,31 \text{ J/(mol.K)}$.




- Tính nhiệt lượng của từng đẳng quá trình và nhận xét từng đẳng quá trình đó chất khí thu hay tỏa nhiệt lượng. Tính nhiệt lượng chất khí nhận vào trong một chu trình?. Tính nhiệt lượng chất khí tỏa ra trong một chu trình?
- Tính công thực hiện của chất khí trong một chu trình?
- Tính hiệu suất của chu trình?
- Nếu quá trình $A \rightarrow B$ là đoạn nhiệt thì hiệu suất của chu trình lúc này bằng bao nhiêu?

.....

ĐỀ 7. HK2 2023-2024 (DKD)

Câu 1 (4 điểm): Một vật có khối lượng $m_1 = 2 \text{ kg}$ và một vật khác có khối lượng $m_2 = 10 \text{ kg}$ được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh có khối lượng không đáng kể vắt qua một ròng rọc (như hình 1). Ròng rọc có dạng đĩa tròn đặc đồng chất bán kính R và khối lượng $M = 2 \text{ kg}$. Vật có khối lượng m_2 được đặt trên một mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng $\theta = 45^\circ$ so với phương nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa hai vật với các mặt phẳng là 0,1. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.



Hình 1

- Xác định gia tốc chuyển động của hai vật và các lực căng dây.

- b) Tính động năng của hệ sau 3 s kể từ trạng thái nghỉ?
- c) Giả sử 1: Thay ròng rọc đã cho bởi một ròng rọc khác dạng khối trụ có bán kính 5 cm thì gia tốc chuyển động của hệ là 1 m/s^2 . Hãy xác định mômen quán tính của vật rắn hình trụ.
- d) Giả sử 2: Giữ nguyên ròng rọc M, R và vật m_2 , đồng thời thay vật m_1 bằng một bánh xe có cùng khối lượng. Bánh xe lăn không trượt từ trạng thái nghỉ. Coi bánh xe là trụ tròn đồng chất. Tính gia tốc của hai vật lúc này?


Câu 2 (2 điểm): Một viên đạn khối lượng $m = 30 \text{ g}$, chuyển động theo phương ngang, đến va chạm mềm vào một bao cát đang đứng yên có khối lượng $M = 8 \text{ kg}$ được treo bởi sợi dây có chiều dài $L = 1,2 \text{ m}$. Sau va chạm, dây treo bao cát bị lệch khỏi phương thẳng đứng góc 20° . Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tính:

- a) Vận tốc của viên đạn trước khi va chạm vào bao cát.
- b) Phần năng lượng bị mất do va chạm giữa viên đạn và bao cát.

Câu 3 (4 điểm):

Chu trình Otto là chu trình nhiệt động lý tưởng cho các động cơ đốt trong. Chu trình Otto gồm 4 quá trình nhiệt động theo thứ tự: đoạn nhiệt, đẳng tích, đoạn nhiệt và đẳng tích.

Động cơ của một xe ô tô hoạt động theo chu trình Otto lý tưởng có tỉ số nén $k = V_1/V_2 = 8$, sử dụng khí lý tưởng lưỡng nguyên tử (như hình 2). Biết $T_1 = 20^\circ \text{ C}$, $T_3 = 750^\circ \text{ C}$, $P_1 = 10^5 \text{ Pa}$, $V_1 = 0,5 \text{ lít}$. Cho $R = 8,31 \cdot 10^3 \text{ (J/kmol.K)}$.



Hình 2


- a) Tính áp suất và nhiệt độ khí ở trạng thái 2 và 4.
- b) Tính công và nhiệt lượng của từng quá trình.
- c) Tính hiệu suất của động cơ xe trên.
- d) Tìm công thức tính hiệu suất của chu trình Otto theo k (tỉ số nén) và γ (hệ số Poisson).

.....

ĐỀ 8. HK1 2023-2024 (Ca 2)

Câu 1 (5 điểm):


Cho hai vật có khối lượng $m_1 = 3 \text{ kg}$ và $m_2 = 2 \text{ kg}$ được nối bằng dây nhẹ không dẫn, vắt qua ròng rọc dạng đĩa có khối lượng $m = 1 \text{ kg}$. Vật m_2 được đặt trên mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang một góc $\alpha = 30^\circ$, ma sát với hệ số ma sát $k = 0,2$ (Hình 1). Cho $g = 9,78 \text{ m/s}^2$.



- Hãy xác định gia tốc chuyển động của m_1 và m_2 .
- Tính các lực căng dây.
- Giả sử ban đầu hệ vật đứng yên và m_1 nằm cách mặt đất một khoảng $h_1 = 2 \text{ m}$. Hãy tính vận tốc của m_1 khi m_1 chuẩn bị tiếp đất.

Câu 2 (5 điểm):

Cho khí lý tưởng (có bậc tự do $i=5$) thực hiện chu trình khép kín (Hình 2), (1-2) là quá trình đẳng nhiệt, (2-3) là quá trình đoạn nhiệt, (3-4) là quá trình đẳng áp, (4-1) là quá trình đẳng tích. Biết rằng ở trạng thái (1) khối khí có áp suất $P_1 = P_0 = 10^5 \text{ N/m}^2$ và thể tích $V_1 = V_0 = 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, ở trạng thái (2) thể tích khối khí $V_2 = 3V_0$, ở trạng thái (3) áp suất khối khí $P_3 = P_0/5$.



Hãy xác định:


- a) Công khí nhận hoặc sinh trong các quá trình
- b) Nhiệt khí nhận hoặc sinh trong các quá trình
- c) Hiệu suất của chu trình

.....

ĐỀ 9. HK1 2023-2024 (Ca 1)

Câu 1 (5 điểm):

Một hệ gồm hai vật A ($m_1 = 2 \text{ kg}$) và B ($m_2 = 5 \text{ kg}$) được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh có khối lượng không đáng kể. Dây nối được vắt qua một ròng rọc cố định. Vật B trượt có ma sát trên mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng $\alpha = 60^\circ$. Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.




Biết hệ số ma sát $k = 0,1$.

- a) Ròng rọc có khối lượng $M = 1 \text{ kg}$ và có dạng đĩa đặc đồng chất bán kính R . Xác định gia tốc của hệ hai vật (A, B).
- b) Tính các lực căng dây.
- c) Bằng cách sử dụng các định luật bảo toàn trong cơ học, hãy xác định gia tốc của hệ hai vật (A, B). Biết lực ma sát có công thức $F_{ms} = k \cdot m_B \cdot g \cdot \cos(\alpha)$.

Câu 2 (5 điểm):

Cho ba mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử thực hiện một chu trình thuận nghịch như hình vẽ (Hình 2). Ở quá trình A-B, chất khí được giãn nở đoạn nhiệt từ áp suất $5 \times 10^5 \text{ Pa}$ đến áp suất $1 \times 10^5 \text{ Pa}$ và thể tích V_B . Sau đó, ở quá trình B-C, khí được nén đẳng áp đến thể tích $V = 30$

lít. Cuối cùng, chất khí trở về trạng thái ban đầu với áp suất $5 \times 10^5 \text{ Pa}$.



- Tìm nhiệt độ ứng với từng trạng thái và V_B .
- Tính công và nhiệt mà chất khí trao đổi với môi trường.
- Tính hiệu suất của chu trình.


.....

ĐỀ 10. HK2 2022-2023

Câu 1 (3 điểm).

Trong hình 1, một vật có khối lượng $m_A = 1 \text{ kg}$ đang chuyển động đều đến vị trí A với vận tốc 10 m/s . Đường đi của vật từ A đến C không có ma sát. Cho chiều cao $h_1 = 6 \text{ m}$, $h_2 = 2 \text{ m}$. Cho $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.


- Tìm vận tốc của vật tại vị trí B và C.
- Vật tại A khi đến C thì va chạm đàn hồi với một vật đang đứng yên tại C có khối lượng $m_C = 0,2 \text{ kg}$. Hỏi vận tốc của các vật sau va chạm? Cho biết rằng sau va chạm các vật có phương không thay đổi.
- Giả sử đoạn CD = 15 m có ma sát với hệ số ma sát là $k = 0,7$. Hỏi vật nào sau va chạm có thể chuyển động tiếp tục và có đến được vị trí D không? Nếu có thì vận tốc của vật đó tại D là bao nhiêu? Nếu không thì vật đó dừng ở vị trí nào?



Hình 1

Câu 2 (3 điểm).

Cho hai vật có khối lượng $m_1 = 1,2 \text{ kg}$, $m_2 = 0,7 \text{ kg}$ được nối với nhau bởi một sợi dây nhẹ không dãn, được vắt qua ròng rọc trụ đặc có khối lượng $m = 0,5 \text{ kg}$, bán kính R . Tác dụng một lực $F = 20 \text{ N}$ theo một góc $\alpha = 30^\circ$ so với phương nằm ngang, để hệ di chuyển theo hướng m_2 đi lên (xem Hình 2). Cho $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, hệ số ma sát của vật m_1 so với mặt phẳng nằm ngang là $k = 0,1$.



Hình 2

- Tìm gia tốc của các vật.
- Tìm độ lớn của các lực căng dây.
- Thay vật m_1 bằng một trụ đặc có khối lượng là $1,2 \text{ kg}$, bán kính $r \neq R$. Hệ chuyển động lúc này theo hướng m_2 đi xuống.
 - Gia tốc của hệ lúc này thay đổi như thế nào?
 - Tính động năng của hệ sau 2 giây.

Câu 3 (4 điểm).

Một động cơ nhiệt với tác nhân là khí H_2 thực hiện một chu trình Carnot như sau: chuyển từ trạng thái (1) với các thông số trạng thái $p_1 = 3 \text{ atm}$, $T_1 = 400 \text{ K}$ và $V_1 = 1 \text{ lít}$ sang (2) bằng quá trình giãn nở đẳng nhiệt, (2)→(3) là quá trình giãn nở đoạn nhiệt, (3)→(4) là quá trình nén đẳng nhiệt, (4)→(1) là quá trình nén đoạn nhiệt. Biết $V_2 = 3 \text{ lít}$, $V_3 = 4 \text{ lít}$.


- Biểu diễn các quá trình trên đồ thị (p, V) và tính các giá trị p_2 , p_3 , p_4 , V_4 và T_3
- Nhiệt lượng mà khối khí nhận vào hoặc nhả ra trong từng quá trình đẳng nhiệt.
- Tổng công mà khối khí thực hiện trong cả chu trình.
- Hiệu suất của chu trình?

.....

ĐỀ 11. HK1 2022-2023

Câu 1: Một viên đạn khối lượng $m = 20 \text{ g}$, chuyển động theo phương ngang, đến va chạm mềm vào một bao cát $M = 10 \text{ kg}$ được treo bởi sợi dây có chiều dài $L = 1 \text{ m}$. Sau va chạm, dây treo bao cát bị lệch khỏi phương thẳng đứng góc 20° . Tính vận tốc ban đầu của viên đạn

Câu 2: Hai vật có khối lượng $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 6 \text{ kg}$ được nối với nhau bằng sợi dây không khối lượng, vắt qua ròng rọc có dạng đĩa tròn, bán kính $R = 0,25 \text{ m}$, khối lượng $M = 8 \text{ kg}$. Góc hợp bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang là $\theta = 30^\circ$. Hệ số ma sát trượt của mặt sàn là $k = 0,3$. Thả cho hệ bắt đầu chuyển động



- Xác định gia tốc của hệ và lực căng dây tác dụng vào mỗi vật.
- Tính quãng đường vật m_1 đi được, vận tốc của m_1 và động năng của hệ tại thời điểm $t = 5 \text{ s}$.

Câu 3: Một động cơ nhiệt thực hiện chu trình thuận nghịch gồm 3 quá trình với tác nhân được xem là một chất khí lý tưởng có bậc tự do $i = 6$. Đầu tiên, tác nhân được biến đổi đẳng tích từ trạng thái ban đầu (1) có áp suất $p_1 = 1 \text{ atm}$ và thể tích $V_1 = 1 \text{ lít}$ đến trạng thái thứ (2) có áp suất tăng gấp 3 lần áp suất ở trạng thái (1). Sau đó, cho chất khí biến đổi đoạn nhiệt đến trạng thái (3). Cuối cùng bằng quá trình biến đổi đẳng áp đưa khí về trạng thái (1).


- Vẽ chu trình trên mặt phẳng (OpV)
- Tính áp suất p_3 và thể tích V_3 ở trạng thái thứ 3
- Tính công và nhiệt lượng khí nhận trong các quá trình
- Tính hiệu suất của động cơ nhiệt

Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$, $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ N/m}^2$

.....

ĐỀ 12. HK2 2021-2022

Câu 1: Vật P có khối lượng $m_1 = 0,3 \text{ kg}$, chuyển động trên mặt phẳng nghiêng không ma sát với vận tốc ban đầu bằng 0. Sau đó, vật di chuyển trên một đoạn nằm ngang có hệ số ma sát là $k = 0,1$ đến va chạm đàn hồi với vật Q có khối lượng $m_2 = 0,2 \text{ kg}$ như hình 1. Cho $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ Tính:




- Vận tốc của vật P ở chân mặt phẳng nghiêng?
- Vận tốc của vật P ngay trước khi va chạm với vật Q?
- Vận tốc của vật P và vật Q ngay sau khi va chạm?
- Quãng đường mà vật Q đi được sau va chạm?

Câu 2: Cho cơ hệ như hình vẽ, ở đó vật thứ 1 có khối lượng $m_1 = 1 \text{ kg}$, vật thứ 2 có khối lượng $m_2 = 2 \text{ kg}$, ròng rọc trụ đặc đồng nhất bán kính $r = 0,05 \text{ m}$ và có khối lượng $M = 2 \text{ kg}$. Sợi dây có khối lượng không đáng kể, không co giãn và không trượt trên ròng rọc. Góc giữa mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng ngang là 30° . Giả sử lúc đầu hệ đứng yên, thả cho vật m_2 rơi xuống.


- Vẽ hình và phân tích lực?
- Hãy tính gia tốc của hệ?
- Hãy tính vận tốc góc của ròng rọc tại thời điểm vật m_1 đã đi được đoạn đường $h = 0,1 \text{ m}$?

Cho biết hệ số ma sát giữa vật m_1 và mặt phẳng nghiêng là $k = 0,2$, gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



Câu 3: Cho n mol khí lý tưởng (có bậc tự do $i = 5$) thực hiện chu trình khép kín như hình 3. Chu trình gồm (1-2) là quá trình đoạn nhiệt, (2-3) là quá trình đẳng tích, (3-4) là quá trình đoạn nhiệt, (4-5) là quá trình đẳng tích, (5-1) là quá trình đẳng áp. Biết ở trạng thái (1) khối khí có áp suất khối khí $P_3 = P_1/13$, ở trạng thái (4) thể tích khối khí $V_4 = V_1/3$. Hãy xác định:

- Công và nhiệt của từng quá trình trong chu trình trên.
- Hiệu suất của chu trình




.....

ĐỀ 13.

Câu 1: Một quả cầu rắn khối lượng $m = 10 \text{ kg}$, bán kính R , ban đầu có độ cao $H = 1,5 \text{ m}$ của một mặt phẳng nghiêng $\alpha = 30^\circ$. Quả cầu lăn (không trượt) không vận tốc đầu xuống. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Mômen quán tính của quả cầu $I = \frac{2}{5}mR^2$.

- Tính vận tốc của quả cầu tại đáy mặt phẳng nghiêng.
- Xác định độ lớn của lực ma sát khi nó lăn xuống mặt phẳng.

Câu 2: Cho một vật có khối lượng M đặt trên một giá đỡ có chiều dài d và độ cao h so với mặt đất. Một viên đạn, có khối lượng m chuyển động với vận tốc v_0 không đổi theo phương ngang, va chạm mềm với M . Ngay sau va chạm, hệ vật chuyển động có ma sát trên mặt phẳng ngang của giá đỡ với hệ số ma sát μ . Giả sử trước va chạm M đứng yên ở vị trí A. Cho $m = 0,02 \text{ kg}$, $M = 1,0 \text{ kg}$, $v_0 = 700 \text{ m/s}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\mu = 0,2$, $d = 1,0 \text{ m}$, $h = 0,5 \text{ m}$.



- Tính vận tốc của hệ vật khi chuyển động đến vị trí B.
- Khi hệ vật chuyển động đến hết giá đỡ (tại B), giả sử hệ vật là một chất điểm, hãy tìm vận tốc tiếp đất của hệ vật tại C.

Câu 3: Một khối khí lý tưởng ($i = 3$) dùng làm tác nhân của động cơ nhiệt thực hiện chu trình gồm các quá trình: (1-2), (3-4) là các quá trình đoạn nhiệt, (2-3) là quá trình đẳng áp, (4-1) là quá trình đẳng tích. Khối khí ở trạng thái (1) có nhiệt độ $T_1 = 27^\circ\text{C}$, thể tích V_1 ; ở trạng thái (2) có thể tích V_2 ; ở trạng thái (3) có thể tích V_3 . Biết $V_1 = 4V_2$ và $V_3 = 1,5V_2$.


- Vẽ chu trình trên mặt phẳng (V,P).
- Tìm các nhiệt độ T_2, T_3, T_4 của tác nhân ở các trạng thái (2), (3), (4) tương ứng.
- Tính hiệu suất nhiệt của động cơ này.

.....

ĐỀ 14.

Câu 1:

Mômen quán tính của hệ ròng rọc $I = 1,7 \text{ kg.m}^2$, Bán kính vành lớn $r_1 = 50 \text{ cm}$, và vành nhỏ $r_2 = 20 \text{ cm}$, vật $m_1 = 2 \text{ kg}$, vật $m_2 = 1,8 \text{ kg}$. Bỏ qua mômen cản của ròng rọc, dây lăn không trượt, không giãn, lấy $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.



- Tìm gia tốc góc của hệ ròng rọc
- Tính lực căng của dây treo (T_1, T_2)

Câu 2:

Quả cầu khối lượng $m_1 = 300 \text{ g}$ chuyển động với vận tốc $v_1 = 2 \text{ m/s}$ đến va chạm xuyên tâm với quả cầu thứ hai $m_2 = 200 \text{ g}$ đang chuyển động ngược chiều với vận tốc $v_2 = -1 \text{ m/s}$. Tìm vận tốc các quả cầu sau va chạm, nếu va chạm là:

- Hoàn toàn đàn hồi.
- Va chạm mềm. Tính nhiệt lượng tỏa ra trong va chạm, cho rằng toàn bộ độ tăng nội năng của hệ đều biến thành nhiệt năng.

Câu 3:


Một chu trình Cárnot thực hiện giữa hai máy điều nhiệt nhiệt độ $t_1 = 400^\circ\text{C}$, $t_2 = 20^\circ\text{C}$. Thời gian để thực hiện chu trình đó là 1s. Biết tác nhân là 2kg không khí (lấy bậc tự do $I = 5$), áp suất cuối quá trình giãn đẳng nhiệt bằng áp suất ở đầu quá trình nén đoạn nhiệt. Cho không khí có $\mu = 29 \text{ kg/kmol}$.

- Vẽ giản đồ lý thuyết của chu trình trong hệ (V,P).
- Tính công suất (sinh công) làm việc của động cơ theo chu trình trên

.....


ĐỀ 15.

Câu 1: Hai vật có khối lượng $m_1 = 4 \text{ kg}$ và $m_2 = 5 \text{ kg}$ nối với nhau bằng một sợi dây không giãn được mắc qua một ròng rọc cố định đặt trên mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng $\alpha = 30^\circ$. Cho gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Biết m_1 đi xuống m_2 đi lên như hình vẽ



- Giả sử bỏ qua ma sát giữa vật m_2 và mặt phẳng nghiêng, và bỏ qua khối lượng của ròng rọc, tính gia tốc của hệ từ định luật bảo toàn cơ năng.
- Ròng rọc có khối lượng $M = 2 \text{ kg}$ và có dạng đĩa đặc đồng chất. Hệ số ma sát giữa vật m_2 và mặt phẳng nghiêng là 0,25.
 - Tính gia tốc của hệ (m_1, m_2).
 - Tính các lực căng dây.

Câu 2: Khí lý tưởng có $\gamma = 7/5$ dùng làm chất tải nhiệt (tác nhân cho chu trình nhiệt), thực hiện chu trình như hình vẽ. Trong đó, quá trình (1, 2) và (3, 4) là quá trình đoạn nhiệt, quá trình (2, 3) là đẳng áp, và (4, 1) là quá trình đẳng tích. Cho biết ở trạng thái (1) khí có nhiệt độ $t_1 = 27^\circ\text{C}$, thể tích $V_1 = 4\sqrt{2}V_2$. Với V_2 là thể tích khí ở trạng thái (2), trạng thái (3) thể tích khí $V_3 = 1,5V_2$. Cho biết $P_1 = 5 \text{ atm}$, $V_2 = 2 \text{ lít}$.




- Tìm các nhiệt độ T_2, T_3, T_4 của tác nhân ở các trạng thái (2), (3), (4) tương ứng.
- Tính công sinh ra trong một chu trình
- Tính hiệu suất của chu trình

.....

ĐỀ 16.


Câu 1:

- Một con lắc đơn gồm một vật $m_1 = 0,2 \text{ kg}$ treo trên một sợi dây dài $l = 1 \text{ m}$. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc $\theta = 30^\circ$ rồi thả ra không vận tốc đầu. Khi đi qua vị trí cân bằng vật m_1 va chạm đàn hồi vật $m_2 = 0,1 \text{ kg}$ đang đứng yên tại mép mặt bàn như Hình 1, mặt bàn cao $0,8 \text{ m}$ so với sàn nhà, lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.




Xác định:

- Vận tốc của hai vật ngay sau va chạm.
 - Thời gian vật m_2 rơi đến sàn nhà và điểm rơi cách chân bàn O bao nhiêu.
- Một vật khối lượng m trượt trên mặt phẳng nghiêng và làm quay một bánh xe bán kính R , khối lượng M như Hình 2, hệ số ma sát của vật trên mặt phẳng nghiêng k . Tìm gia tốc của vật và lực căng dây. Cho $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



Câu 2:

Một khối khí lý tưởng lưỡng nguyên tử thực hiện chu trình như hình bên, trong đó, quá trình (1-2), (3-4) là các quá trình đẳng nhiệt, quá trình (2-3), (4-1) là các quá trình đoạn nhiệt. Cho $V_1 = 2$ lít, $V_2 = 5$ lít, $V_3 = 8$ lít, $p_1 = 7$ atm, $T_1 = 400$ K, $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ N/m}^2$.




- Tìm áp suất p_2 , p_3 , p_4 , thể tích V_4 và nhiệt độ T_3 ở các trạng thái (2), (3), (4) tương ứng.
- Công khí thực hiện trong từng quá trình.
- Tính hiệu suất của chu trình.

.....

ĐỀ 17.**Câu 1:**

Cho $m = 0,1$ kg và $M = 0,12$ kg được treo vào sợi dây không giãn có chiều dài $l_0 = 1$ m như hình 1. Lúc đầu kéo m ra khỏi vị trí cân bằng một góc $\alpha_m = 60^\circ$ rồi thả. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.




- Vận tốc của m khi dây treo lệch góc 30° ?
- m đến va chạm mềm với M đang đứng yên. Hỏi độ cao của các vật sau va chạm? ứng với góc lệch so với thẳng đứng là bao nhiêu?

Câu 2:

Một hệ vật được bố trí như hình 2. Biết khối lượng các vật $m_1 = 5$ kg, $m_2 = 3$ kg, $\alpha = 60^\circ$, β

$= 30^\circ$, dây nối có khối lượng không đáng kể, hệ số ma sát giữa vật m_1 và m_2 với mặt phẳng ngang là $k = 0,2$. Với ròng rọc trụ đặc có khối lượng $M = 0,4 \text{ kg}$, bán kính $R = 0,15 \text{ m}$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- Vật chuyển động theo chiều nào và xác định gia tốc của hệ
- Lực căng T của dây treo
- Vận tốc của hệ sau 2 s kể từ lúc bắt đầu chuyển động

Câu 3:


Một khối khí lý tưởng (phân tử khí có bậc tự do i) thực hiện chu trình biến đổi gồm: quá trình (1)-(2) là quá trình đẳng áp, quá trình (2)-(3) là quá trình đẳng tích và quá trình (3)-(1) là quá trình đẳng nhiệt. Nhiệt độ của khối khí ở các trạng thái (1) và (2) lần lượt là $t_1 = 17^\circ\text{C}$, $t_2 = 227^\circ\text{C}$, và $V_3 = 0,2 \text{ m}^3$.

- Vẽ chu trình trên mặt phẳng (V, P) và (T, V)
- Tìm p_1 , V_1 và p_3
- Quá trình nào sinh công và quá trình nào tỏa nhiệt.
- Tìm độ biến thiên nội năng của quá trình đẳng áp và đẳng nhiệt.

.....

ĐỀ 18.

Câu 1: Cho quả cầu có khối lượng m được treo vào một sợi dây có chiều dài d , đầu còn lại của sợi dây được cố định vào một mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu quả cầu được nâng lên để phương sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc θ , sau đó quả cầu được thả ra và va chạm đàn hồi với vật có khối lượng M (Hình 1). Cho gia tốc trọng trường là $g = \text{const}$, hãy xác định:




a) Vận tốc của quả cầu ngay trước lúc va chạm và ngay sau khi va chạm.

b) Giả sử sau va chạm, vật M trượt có ma sát với mặt phẳng ngang với hệ số ma sát μ .

Hãy xác định vận tốc của M ngay sau va chạm và quãng đường s mà M đi được.

(Cho: $d = 1 \text{ m}$, $\theta = \pi/3$, $m = 2 \text{ kg}$, $M = 5 \text{ kg}$, $g = 9,78 \text{ m/s}^2$, $\mu = 0,1$.)

Câu 2: Một khối gỗ có khối lượng $m_1 = 3 \text{ kg}$ và một khối gỗ khác có khối lượng $m_2 = 8 \text{ kg}$ được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh có khối lượng không đáng kể vắt qua một ròng rọc (như hình 2). Ròng rọc có dạng đĩa tròn đặc, đồng chất bán kính R và khối lượng $M = 8 \text{ kg}$. Vật có khối lượng m_2 đang đặt trên một mặt phẳng nghiêng với góc nghiêng $\theta = 35^\circ$ so với phương nằm ngang. Hệ số ma sát giữa hai vật với các mặt phẳng là $\mu = 0,3$.



a. Xác định gia tốc chuyển động của hai vật.

b. Tính độ lớn các lực căng dây?

c. Động năng của hệ ở thời điểm $t = 2 \text{ s}$ bằng bao nhiêu tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động?


Câu 3: Cho một mol khí lý tưởng đơn nguyên tử thực hiện chu trình gồm hai quá trình đẳng tích, một quá trình đẳng áp và một quá trình đẳng nhiệt (quá trình $2 \rightarrow 3$) như hình 3. Biết rằng ở trạng thái 1 khối khí có thể tích $V_1 = 5 \text{ lít}$ và áp suất $P_1 = 5 \times 10^5 \text{ Pa}$, thể tích khối khí ở trạng thái 4 là $V_4 = 2V_1$, áp suất khối khí ở trạng thái 2 là $P_2 = 3P_1$. Hãy tìm:

a. Nhiệt độ (tính theo thang đo Kelvin) của khối khí ở trạng thái 1 và 2.

b. Công mà khối khí sinh ra trong một chu trình.

c. Hiệu suất của chu trình.

d. Nếu quá trình 2→3 là đoạn nhiệt trong khi các quá trình khác vẫn giữ nguyên như đề bài, thì hiệu suất bằng bao nhiêu? So sánh với hiệu suất của câu c.



.....

ĐỀ 19. 2019-2020


Câu 1:

Cho quả cầu có khối lượng m được treo vào một sợi dây có chiều dài d , đầu còn lại của sợi dây được cố định vào một mặt phẳng nằm ngang. Ban đầu quả cầu được nâng lên để phương sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc θ , sau đó quả cầu được thả ra và va chạm đàn hồi với vật có khối lượng M (Hình 1). Cho gia tốc trọng lực là $g = \text{const}$, hãy xác định:

- Vận tốc của quả cầu ngay trước lúc va chạm và ngay sau khi va chạm.
- Giả sử sau va chạm, vật M trượt có ma sát với mặt phẳng ngang với hệ số ma sát μ .

Hãy xác định vận tốc của M ngay sau va chạm và quãng đường s mà M đi được.

$d = 1 \text{ m}$, $\theta = \pi/3$, $m = 2 \text{ kg}$, $M = 5 \text{ kg}$, $g = 9,78 \text{ m/s}^2$, $\mu = 0,1$.




Câu 2:

Cho hai vật có khối lượng m_1 và m_2 được nối bằng dây nhẹ không dẫn, vắt qua ròng rọc kép

có bán kính lần lượt là R và r , có momen quán tính là I . Vật m_1 đặt trên mặt phẳng nghiêng góc α , bỏ qua ma sát giữa m_1 và mặt phẳng nghiêng (Hình 2). Cho $g = \text{const}$, hãy xác định:

- Gia tốc chuyển động của m_1 và m_2 .
- Tính các lực căng dây.

$R = 0,1 \text{ m}$, $r = 0,05 \text{ m}$, $m_1 = 3 \text{ kg}$, $m_2 = 2 \text{ kg}$, $g = 9,78 \text{ m/s}^2$, $\alpha = \pi/6$, $I = 2 \cdot 10^{-3} \text{ kgm}^2$.



Hình 2

Câu 3:

Một khối khí lý tưởng ($i = 3$) dùng làm tác nhân của động cơ nhiệt thực hiện chu trình gồm các quá trình: (1-2), (3-4) là các quá trình đoạn nhiệt, (2-3) là quá trình đẳng áp, (4-1) là quá trình đẳng tích. Khối khí ở trạng thái (1) có nhiệt độ $T_1 = 27^\circ\text{C}$, thể tích V_1 ; ở trạng thái (2) có thể tích V_2 ; ở trạng thái (3) có thể tích V_3 . Biết $V_1 = 4V_2$ và $V_3 = 1,5V_2$.

- Vẽ chu trình trên mặt phẳng (V , P).
- Tìm các nhiệt độ T_2 , T_3 , T_4 của tác nhân ở các trạng thái (2), (3), (4) tương ứng.
- Tính hiệu suất nhiệt của động cơ này.


.....

ĐỀ 20.

Câu 1: Một vật có khối lượng $M_1 = 1 \text{ kg}$ có độ lớn vận tốc V_1 , đến va chạm đàn hồi vào vật có khối lượng $M_2 = 2 \text{ kg}$ đang đứng yên. Sau va chạm vật M_1 và M_2 có độ lớn vận tốc thay đổi lần lượt là V'_1 và V'_2 .

- Nếu vận tốc của M_1 sau va chạm có phương không thay đổi so với lúc đầu thì phương vận tốc của M_1 và M_2 sau va chạm như thế nào?
- Tìm vận tốc của các hạt sau va chạm nếu $V_1 = 4 \text{ m/s}$.

Câu 2: Cho hệ (hình 1) gồm hai vật $m_1 = 5 \text{ kg}$ và $m_2 = 3 \text{ kg}$ nối với nhau qua dây treo. Bỏ qua sự trượt của dây treo và sự ma sát ở trục ròng rọc, dây không giãn.




Hình 1

a) Giả sử ròng rọc có dạng đĩa đặc khối lượng $m = 0,5 \text{ kg}$, bán kính $R = 3 \text{ cm}$. Tìm gia tốc của hệ (m_1, m_2) và các lực căng dây bằng phương trình động lực học.

b) Giả sử ròng rọc không khối lượng. Tìm gia tốc của hệ (m_1, m_2) bằng phương pháp biến đổi cơ năng. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Câu 3: Một khối khí O_2 thực hiện một chu trình như hình 2, trong đó (1-2) và (3-4) là hai quá trình đẳng nhiệt với các nhiệt độ T_1, T_2 , quá trình (2-3) và (4-1) là các quá trình đoạn nhiệt. Cho nhiệt độ, thể tích và áp suất ở trạng thái (1) $T_1 = 400\text{K}$, $V_1 = 2 \text{ lít}$, $p_1 = 7 \text{ atm}$, thể tích trạng thái (2) và (3) tương ứng là $V_2 = 5 \text{ lít}$, $V_3 = 8 \text{ lít}$.



a) Tìm p_2, T_2, p_3, p_4, V_4

b) Tính công do khí thực hiện trong từng quá trình và trong toàn chu trình

c) Nhiệt mà khối khí nhận được hay tỏa ra trong từng quá trình đẳng nhiệt.

.....

ĐỀ 21.


Câu 1: Vật m_1 và m_2 chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang có vận tốc ban đầu lần lượt v_1 và v_2 , sau va chạm đàn hồi chúng có vận tốc lần lượt là v'_1 và v'_2 .

a) Rút ra công thức tính v'_1 và v'_2 theo m_1, m_2 và v_1, v_2 .

b) Nếu $m_1 = 1 \text{ kg}$ có độ lớn vận tốc $v_1 = 4 \text{ m/s}$, đến va chạm đàn hồi với vật có khối lượng $m_2 = 2 \text{ kg}$ đang đứng yên. Tìm độ lớn vận tốc v'_1 và v'_2 .

c) Nếu sau va chạm, vận tốc của m_1 có phương trùng với phương vận tốc của nó lúc đầu, và lúc đầu m_2 đứng yên, thì vận tốc sau va chạm của m_1 , m_2 có phương như thế nào với nhau.

Câu 2: Cho một hệ gồm hai vật nối với nhau qua ròng rọc như hình vẽ. Ròng rọc là một đĩa đặc tròn có khối lượng M , bán kính R , hai vật còn lại có khối lượng m_2 và m_1 , biết m_2 trượt không ma sát, gia tốc trọng trường g .



- Tìm gia tốc của hệ hai vật (m_1 , m_2)?
- Tìm các lực căng dây?


Câu 3: Một chu trình thuận nghịch (1,2,3,1) được thực hiện bởi 6,42 kg khí lí tưởng O_2 gồm các quá trình: quá trình dẫn đẳng áp (1-2), quá trình đẳng tích (2-3) và nén đẳng nhiệt (3-1). Cho áp suất và thể tích ở trạng thái (1) lần lượt là $P_1 = 10^6 \text{ N/m}^2$, $V_1 = 500 \text{ lít}$ và tỷ số giữa thể tích cực đại và cực tiểu của chu trình là $V_2/V_1 = 4$. Nhiệt độ khối khí ở trạng thái (1), (2) lần lượt là T_1 và T_2 . Cho $R = 8,31 \cdot 10^3 \text{ J/kmol}^\circ\text{K}$.

- Vẽ chu trình trên mặt phẳng (P, V)
- Tính nhiệt độ T_1 , T_2
- Tính nhiệt lượng nhận vào và nhiệt lượng tỏa ra trong chu trình
- Tính hiệu suất của chu trình.

.....


ĐỀ 22.

Câu 1: Dùng búa có khối lượng $m_1 = 2 \text{ kg}$ đóng vào một chiếc đinh $m_2 = 0,05 \text{ kg}$ vào gỗ. Vận tốc của búa lúc chạm đinh là 10 m/s . Sau khi nện búa, đinh ghim sâu vào gỗ 1 cm thì dừng lại. Coi như lực cản của gỗ lên đinh là không đổi.



- Tính gia tốc của đinh khi di chuyển trong gỗ.
- Tính khoảng thời gian đinh di chuyển trong gỗ.
- Tính lực cản của gỗ tác dụng lên đinh


Câu 2: Một hệ gồm một ròng rọc dạng đĩa tròn đồng chất, bán kính $R = 2 \text{ cm}$, khối lượng $M = 2 \text{ kg}$, quay quanh trục O nằm ngang và hai vật khối $m_1 = 5 \text{ kg}$, $m_2 = 4 \text{ kg}$ treo hai đầu sợi dây vắt qua ròng rọc. Giả sử dây không trượt trên ròng rọc. Cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$.



Tìm:

- Gia tốc của vật
- Sức căng T_1 và T_2 của dây treo

Câu 3: Một khối khí lý tưởng ($i = 3$) dùng làm tác nhân của động cơ nhiệt thực hiện chu trình như hình bên, trong đó, quá trình (1-2), (3-4) là các quá trình đoạn nhiệt, quá trình (2-3) là quá trình đẳng áp, quá trình (4-1) là quá trình đẳng tích. Khối khí ở trạng thái (1) có nhiệt độ $t_1 = 27^\circ\text{C}$, thể tích V_1 ; ở trạng thái (2) có thể tích V_2 ; ở trạng thái (3) có thể tích V_3 . Biết $V_1 = 4V_2$ và $V_3 = 1,5V_2$.




- Tìm các nhiệt độ T_2, T_3, T_4 của tác nhân ở các trạng thái (2), (3), (4) tương ứng.
- Tính hiệu suất nhiệt của động cơ này.

.....

ĐỀ 23.

Bài 1: Hai vật có khối lượng là $m_1 = 200 \text{ g}$ và $m_2 = 400 \text{ g}$ nối với nhau bằng 1 sợi dây không dẫn vắt qua ròng rọc có dạng là 1 đĩa tròn. Khối lượng của ròng rọc là $m_0 = 100 \text{ g}$. Ma sát không đáng kể và $g = 10 \text{ m/s}^2$. Giữ m_1 chạm đất thì m_2 cách mặt đất 2 m .



Tìm

- Gia tốc của các vật.
- Sức căng T_1 và T_2 của dây treo.
- Tính độ cao cực đại mà m_1 đạt được khi m_2 chạm đất.

Bài 2: Hai quả cầu kim loại được treo bằng hai sợi dây thẳng đứng, ban đầu tiếp xúc nhau. Quả cầu 1 có khối lượng $m_1 = 30 \text{ g}$ được kéo sang trái đến độ cao $h_1 = 8 \text{ cm}$ rồi được thả ra. Sau khi đung đưa đi xuống nó va chạm đàn hồi với quả cầu 2 có khối lượng $m_2 = 75 \text{ g}$.

Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$

- Vận tốc của quả cầu 1 ngay sau va chạm là bao nhiêu?
- Sau va chạm quả cầu 1 đung đưa sang trái lên đến độ cao h_1' là bao nhiêu?

c/ Vận tốc quả cầu 2 sau va chạm là bao nhiêu?

d/ Sau va chạm quả cầu m_2 đứng đưa lên đến độ cao là bao nhiêu?

Bài 3: Cho 2 kmol khí lý tưởng đơn nguyên tử thực hiện chu trình biến đổi gồm: quá trình 1-2 là quá trình nén đẳng nhiệt, quá trình 2-3 là quá trình giãn nở đẳng áp và quá trình 3-1 là quá trình đẳng tích. Quá trình đẳng nhiệt xảy ra ở nhiệt độ $T_1 = 600\text{ K}$. Cho biết thể tích cực đại và cực tiểu của chu trình là $V_1/V_2 = 4$.

a/ Tính nhiệt độ của khối khí ở cuối quá trình. b/ Vẽ chu trình trong hệ tọa độ (V,P)

c/ Tính công do khối khí nhận vào trong quá trình đẳng nhiệt d/ Hiệu suất của chu trình.

.....

ĐỀ 24.


Câu 1: Có một bộ súng khối lượng 10 tấn có thể chuyển động không ma sát trên đường ray. Trên bộ súng có gắn một khẩu đại bác khối lượng 5 tấn. Giả sử khẩu đại bác nhả đạn theo phương đường ray. Viên đạn có khối lượng 100 kg và có vận tốc đầu nòng là 500 m/s. Xác định vận tốc của bộ súng ngay sau khi bắn, biết rằng:

a) Lúc đầu bộ súng đứng yên.

b) Trước khi bắn, bộ súng chuyển động với vận tốc 18 km/h theo chiều bắn.

c) Trước khi bắn, bộ súng chuyển động với vận tốc 18 km/h ngược chiều bắn.

Câu 2: Hai vật cùng khối lượng $m = 1,4\text{ kg}$ nối với nhau bằng một sợi dây qua một ròng rọc khối lượng $M = 2\text{ kg}$, bán kính R như hình 1. Lúc đầu hai vật đứng yên và cách nhau 0,5 m theo phương thẳng đứng. Đặt thêm vào một trong hai vật một gia trọng Δm thì sau 1 s chúng cùng độ cao.



a) Tính Δm .

b) Khi hai vật cùng độ cao, lấy gia trọng Δm ra thì bao lâu sau kể từ lúc lấy gia trọng hai vật lại cách nhau 0,5 m. Cho $g = 10\text{ m/s}^2$.


Câu 3: Một khối khí đựng trong xy lanh. Cho khối khí biến đổi đẳng tích từ nhiệt độ $T_1 = 133 \text{ K}$ đến nhiệt độ $T_2 = 187 \text{ K}$, sau đó biến đổi đẳng áp tới nhiệt độ $T_3 = 312 \text{ K}$ và cuối cùng giãn đẳng nhiệt tới thể tích $V_4 = 7 \text{ lít}$. Thể tích và áp suất ban đầu của khối khí là $V_1 = 3 \text{ lít}$ và $P_1 = 1,01 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$.

- Xác định áp suất của 3 trạng thái P_2, P_3, P_4 .
- Vẽ đồ thị các quá trình biến đổi trên mặt phẳng (P, V) .
- Trong quá trình đẳng nhiệt khí nhận được nhiệt lượng $Q = 238 \text{ J}$. Tính công trong mỗi quá trình biến đổi và so sánh các công này.
- Tính số mol khối khí đựng trong xy lanh.

.....

ĐỀ 25. HK3 2016-2017

Câu 1: Cho một hệ gồm 2 vật có khối lượng $m_1 = 1 \text{ kg}$ và $m_2 = 3 \text{ kg}$ nối với nhau qua ròng rọc (Hình 1). Sợi dây không co giãn. Ròng rọc là một đĩa đặc tròn có khối lượng $M = 0,5 \text{ kg}$, bán kính R . m_1 đặt trên mặt phẳng ngang có hệ số ma sát $k = 0,1$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- Tìm gia tốc của hệ, biết m_2 đi xuống.
- Tìm lực căng dây T_1, T_2
- Ban đầu m_2 cách đất 1 m , khi m_2 đi được một khoảng $0,5 \text{ m}$ thì sợi dây bị đứt, tìm vận tốc của vật lúc vừa chạm đất.

Câu 2: Hai quả cầu kim loại được treo bằng hai sợi dây thẳng đứng, ban đầu tiếp xúc nhau. Quả cầu 1 có khối lượng $m_1 = 30 \text{ g}$ được kéo sang trái đến độ cao $h_1 = 8 \text{ cm}$ rồi thả ra. Sau khi chuyển động xuống vị trí cân bằng, nó va chạm đàn hồi với quả cầu 2 có khối lượng $m_2 = 75 \text{ g}$ đang đứng yên. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Tìm vận tốc của quả cầu 1 ngay trước va chạm?
- Tìm vận tốc của quả cầu 2 sau va chạm?

c/ Sau va chạm, quả cầu 2 đạt đến độ cao cực đại h_2 là bao nhiêu?

Câu 3: Cho 2 kmol khí lý tưởng đơn nguyên tử thực hiện chu trình biến đổi gồm: quá trình $1 \rightarrow 2$ là quá trình nén đẳng nhiệt, quá trình $2 \rightarrow 3$ là quá trình giãn nở đẳng áp và quá trình $3 \rightarrow 1$ là quá trình đẳng tích. Quá trình đẳng nhiệt xảy ra ở nhiệt độ $T_1 = 600 \text{ K}$. Cho biết thể tích cực đại và cực tiểu của chu trình là $V_1/V_2 = 4$.

a/ Vẽ chu trình trong hệ tọa độ (V, P)

b/ Tính nhiệt độ của khối khí ở cuối quá trình.


c/ Cho biết quá trình nào là nhận nhiệt, quá trình nào là tỏa nhiệt?

d/ Tính công do khối khí nhận vào trong quá trình đẳng nhiệt.

.....

ĐỀ 26.


Câu 1: Cho $m = 0,1 \text{ kg}$ và $M = 0,12 \text{ kg}$ được treo vào sợi dây không giãn có chiều dài $l_0 = 1 \text{ m}$ như hình 1. Lúc đầu kéo m ra khỏi vị trí cân bằng một góc $\alpha = 60^\circ$ rồi thả. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.



c) Vận tốc của m khi dây treo lệch góc 30° ?

d) m đến va chạm mềm với M đang đứng yên. Hỏi độ cao của các vật sau va chạm? ứng với góc lệch so với thẳng đứng là bao nhiêu?

Câu 2: Một hệ vật được bố trí như hình 2. Biết khối lượng các vật $m_1 = 5 \text{ kg}$, $m_2 = 3 \text{ kg}$, $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 30^\circ$, dây nối có khối lượng không đáng kể, hệ số ma sát giữa vật m_1 và m_2 với mặt phẳng ngang là $k = 0,2$. Với ròng rọc trụ đặc có khối lượng $M = 0,4 \text{ kg}$, bán kính $R = 0,15 \text{ m}$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- Vật chuyển động theo chiều nào và xác định gia tốc của hệ
- Lực căng T của dây treo
- Vận tốc của hệ sau $2s$ kể từ lúc bắt đầu chuyển động.

Câu 3: Một khối khí lý tưởng (phân tử khí có bậc tự do i) thực hiện chu trình biến đổi gồm: quá trình (1)-(2) là quá trình đẳng áp, quá trình (2)-(3) là quá trình đẳng tích và quá trình (3)-(1) là quá trình đẳng nhiệt. Nhiệt độ của khối khí ở các trạng thái (1) và (2) lần lượt là $t_1 = 17^\circ\text{C}$, $t_2 = 227^\circ\text{C}$, và $V_3 = 0,2 \text{ m}^3$.

- Vẽ chu trình trên mặt phẳng (V,P) và (T,V)
- Tìm p_1 , V_1 và p_3
- Quá trình nào sinh công và quá trình nào tỏa nhiệt.
- Tìm độ biến thiên nội năng của quá trình đẳng áp và đẳng nhiệt.

.....

ĐỀ 27.


Câu 1:

Một vật được thả rơi từ độ cao $H + h$ theo phương thẳng đứng DD' (D' là chân độ cao $H + h$). Cùng lúc đó một vật thứ hai được ném lên từ D' theo phương thẳng đứng với vận tốc v_0 .

- Viết phương trình chuyển động của hai vật với cùng một gốc tọa độ?
- Hỏi vận tốc v_0 phải bằng bao nhiêu để hai vật gặp nhau ở độ cao h ?
- Vật thứ hai đạt độ cao lớn nhất bằng bao nhiêu?

Câu 2:

Một vật $m_2 = 10 \text{ kg}$ được đặt trên một mặt phẳng nằm ngang, với hệ số ma sát $k = 0,1$. Dùng một sợi dây không dẫn vắt qua một ròng rọc trụ đặc có khối lượng $M = 0,5 \text{ kg}$, bán kính $R = 0,2 \text{ m}$, một đầu dây buộc vào m_2 và đầu kia buộc vào một vật thứ ba có khối lượng $m_3 = 3 \text{ kg}$ (Hình 1).




Hình 1

a) Tính:

Gia tốc của hệ.

Lực căng của hai sợi dây.

b) Nối thêm vật có khối lượng $m_1 = 1 \text{ kg}$ vào bên trái vật m_2 bằng một sợi dây không dẫn (Hình 2). Bỏ qua khối lượng ròng rọc. Bỏ qua ma sát trên mặt phẳng ngang. Tính:



Hình 2

Gia tốc của hệ vật

Lực căng của hai sợi dây

Câu 3:

Một mol khí lý tưởng đơn nguyên tử dùng làm chất tải nhiệt cho động cơ nhiệt, thực hiện một chu trình, trong đó các quá trình (1) - (2) và (3) - (4) là các quá trình đẳng áp, các quá trình (2) - (3) và (4) - (1) là các quá trình đoạn nhiệt. Cho biết: Trạng thái (1) có áp suất khí $P_1 = P_0$, thể tích $V_1 = V_0$. Trạng thái (2) có thể tích khối khí $V_2 = 2V_0$. Trạng thái (3) thể tích khối khí $V_3 = 16V_0$. Trạng thái (4) thể tích $V_4 = 8V_0$ và áp suất $P_4 = P_0/32$.

b) Vẽ chu trình theo đồ thị $OXY = OVP$.


c) Tính độ biến thiên nội năng cho từng quá trình theo P_0 và V_0 .

d) Tính công sinh ra trong cả chu trình theo P_0 và V_0 .

e) Tính hiệu suất của chu trình.

ĐỀ 28.

Câu 1: Một vật m_1 chuyển động có ma sát trên mặt bàn ngang qua A với vận tốc 2 m/s đến va chạm đàn hồi với vật m_2 đứng yên tại mép bàn B, như Hình 1. Cho khối lượng m_1 là $0,1 \text{ kg}$, khối lượng m_2 là $0,2 \text{ kg}$, hệ số ma sát của vật trên đoạn AB là $0,1$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Mặt bàn AB cách sàn nhà một



Hình 1


đoạn $h = 1 \text{ m}$. $AB = 0,8 \text{ m}$.

a/ Tính vận tốc của vật 1 ngay trước khi va chạm? b/ Tính vận tốc của hai vật ngay sau khi va chạm?

c/ Viết phương trình chuyển động của vật 2 sau va chạm?

Câu 2: Cho hệ gồm hai vật m_1, m_2 mắc qua ròng rọc như Hình 2. Với khối lượng của m_1 là $0,5 \text{ kg}$, của m_2 là $1,2 \text{ kg}$, góc α là 30° . Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

a/ Giả sử mặt phẳng nghiêng không có ma sát. Ròng rọc không khối lượng. Tìm gia tốc của hệ và lực căng của dây treo?



b/ Cho ròng rọc trụ đặc có khối lượng M , bán kính $0,3 \text{ m}$, hệ số ma sát của vật m_1 trên mặt phẳng nghiêng là $0,1$. Hệ không thay đổi chiều chuyển động, gia tốc của hệ là 3 m/s^2 . Tính: α / khối lượng của ròng rọc β / lực căng dây

Câu 3: Một khối khí Oxy có khối lượng 32 g , ở trạng thái (1) có áp suất $5 \cdot 10^4 \text{ Pa}$, thể tích $0,02 \text{ m}^3$, thực hiện quá trình đẳng áp về trạng thái (2) có $V_2/V_1 = 1,5$. Sau đó bằng quá trình đẳng tích đưa khối khí về trạng thái (3), và tiếp tục thực hiện đẳng nhiệt để khối khí trở về trạng thái (1).

a/ Tính nhiệt độ của khối khí ở các trạng thái (1) và (2).


b/ Biểu diễn chu trình bằng đồ thị (OXY) = (OVP).

c/ Cho biết quá trình nào là nhận nhiệt? d/ Tính công của quá trình 2-3.

ĐỀ 29.

Câu 1: Một vật nhỏ được treo vào đầu tự do của một sợi dây mảnh, không dẫn có chiều dài $P = 1(\text{m})$. Ban đầu kéo cho dây treo hợp với phương thẳng đứng (vị trí cân bằng) góc $\alpha_1 = 30^\circ$ rồi truyền cho vật vận tốc $v_0 = 0,5(\text{m/s})$ hướng về vị trí cân bằng. Bỏ qua ma sát, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Tại vị trí vật có vận tốc bằng một nửa vận tốc cực đại thì góc hợp giữa dây treo với phương thẳng đứng (vị trí cân bằng) bằng bao nhiêu?

Câu 2: Cho một cơ hệ như hình vẽ. Hai vật có khối lượng lần lượt là $m_1 = 1 \text{ kg}$ và $m_2 = 0,8 \text{ kg}$ được nối với nhau bằng một sợi dây không khối lượng, không co giãn và được vắt qua ròng rọc. Hệ số



ma sát trượt của các vật m_1 và m_2 trên mặt phẳng chuyển động là $k = 0,1$. Góc hợp mặt phẳng nghiêng và phương ngang là $\alpha = 30^\circ$. Ròng rọc là một đĩa tròn đặc đồng chất có khối lượng là $M = 0,4 \text{ kg}$. Lấy gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$.

a/ Tính gia tốc chuyển động của các vật m_1 và m_2 .

b/ Lực căng dây T_1 và T_2 trên các đoạn dây.

c/ Từ lúc thả đến lúc cơ hệ chuyển động được 2s thì tốc độ góc của ròng rọc bằng bao nhiêu? Khi đó ròng rọc quay được góc bằng bao nhiêu? Biết ròng rọc có bán kính 10 cm .

Câu 3: Một khối khí nitơ (xem như khí lí tưởng) có khối lượng $m = 1 \text{ kg}$ và bậc tự do $i = 5$ thực hiện một chu trình thuận nghịch. Trong đó quá trình (1-2) là đoạn nhiệt, quá trình (2-3) là đẳng áp và quá trình (3-1) là đẳng tích. Nhiệt độ của chất khí ở các trạng thái (1), (2), (3) lần lượt là $T_1 = 300 \text{ K}$, $T_2 = 400 \text{ K}$, $T_3 = 1200 \text{ K}$.

a) Vẽ sơ đồ chu trình trong mặt phẳng (P, V) .

b) Tính nhiệt lượng mà chất khí nhận hoặc sinh trong từng quá trình và tổng nhiệt lượng mà chất khí trao đổi trong cả chu trình.

c) Hãy tính hiệu suất của chu trình này.

Cho biết hằng số khí lí tưởng $R = 8,31 \cdot 10^3 \text{ J/(kmol K)}$.


ĐỀ 30.

Câu 1: Một bao cát khối lượng $M = 10 \text{ (kg)}$ được treo ở đầu sợi dây dài L . Một viên đạn khối lượng $m = 20 \text{ (g)}$ chuyển động theo phương ngang với vận tốc 700 (m/s) tới cắm vào bao cát. Cả hệ sau đó chuyển động lên khỏi vị trí ban đầu và dừng lại khi đạt độ cao h .

a) Tính vận tốc của hệ ngay khi lệch khỏi vị trí ban đầu?

b) Xác định độ cao h mà hệ đạt được so với vị trí ban đầu của bao cát. Cho $g = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}$

Câu 2: Hai vật khối lượng $m_1 = 1 \text{ (kg)}$ và $m_2 = 3 \text{ (kg)}$ được nối với nhau bằng sợi dây không khối lượng, vắt qua ròng rọc có dạng đĩa tròn, khối lượng $m = 4 \text{ (kg)}$. Vật m_2 được kéo dịch chuyển qua trái bởi một lực F , có độ lớn 30 (N) , hợp với phương nằm ngang góc $\theta = 45^\circ$, hệ số ma sát trượt của vật m_2 và mặt sàn là $k = 0,15$. Giả sử, lúc đầu m_1 sát mặt đất.



- Xác định gia tốc của hệ (m_1, m_2) và lực căng dây tác dụng vào mỗi vật.
- Tính quãng đường vật m_2 đi được sau 4(s), và vận tốc của m_2 tại thời điểm $t = 4(s)$.
- Tại thời điểm $t=4(s)$, dây nối với vật m_1 bị đứt. Tính vận tốc của m_1 lúc vừa chạm mặt đất và thời gian từ lúc đứt dây cho đến khi chạm đất.


Câu 3: Một khối khí nitơ có khối lượng $m = 56(g)$, bậc tự do $i=5$, thực hiện chu trình thuận nghịch như sau: Từ trạng thái (1) có áp suất $p_1 = 2(at)$, nhiệt độ $T_1 = 300(K)$, khối khí được nén đẳng nhiệt đến trạng thái (2) có áp suất tăng 5 lần. Sau đó, bằng quá trình đẳng áp đưa khối khí về trạng thái (3) có thể tích bằng thể tích ban đầu. Cuối cùng khối khí được chuyển về trạng thái (1) bằng quá trình đẳng tích. Cho $R = 8,31.10^3 \text{ J/kmol}^\circ K$.

- Vẽ các quá trình trên mặt phẳng (p, V)
- Xác định thể tích V_1, V_2 ; áp suất p_2 và nhiệt độ T_3 .
- Xác định độ biến thiên nội năng của hệ qua từng quá trình biến đổi trạng thái.
- Tính hiệu suất nhiệt của chu trình.

ĐỀ 31.


Câu 1:

Một quả cầu bằng đồng khối lượng $m_1=0,5kg$ được treo bằng sợi dây dài 70cm, một đầu cố định. Kéo quả cầu lên sao cho dây nằm ngang rồi thả rơi. Ở cuối đường đi quả cầu va chạm đàn hồi với khối thép $m_2=2,5kg$ đang đứng yên trên mặt phẳng không ma sát. Tính vận tốc của quả cầu và khối thép sau va chạm. Cho $g = 10m/s^2$.



Câu 2:

Trên một trụ rỗng khối lượng $m = 1kg$, người ta cuộn một sợi dây không giãn có khối lượng và đường kính nhỏ không đáng kể. Đầu tự do của dây được gắn trên một giá cố định. Để trụ rơi dưới tác dụng của trọng lượng. Tìm gia tốc của trụ và sức căng của dây treo. Cho $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



Câu 3:

Một khối khí lý tưởng lưỡng nguyên tử ($i = 5$) có thể tích $V_1 = 0,5$ lít ở áp suất $P_1 = 0,5 \text{at}$. Khối khí bị nén đoạn nhiệt tới thể tích V_2 và áp suất P_2 . Sau đó, người ta giữ nguyên thể tích V_2 và làm lạnh nó đến nhiệt độ ban đầu. Khi đó áp suất của khí là $P_3 = 1 \text{at}$.

- Vẽ đồ thị quá trình biến đổi trên trong mặt phẳng (P, V) , (V, T)
- Tìm thể tích V_2 và áp suất P_2
- Tính công và nhiệt mà khối khí nhận được trong mỗi quá trình

ĐỀ 32.

Câu 1: Một vật khối lượng $m_1 = 10 \text{ kg}$ trượt theo một mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng $\alpha = 30^\circ$ so với mặt nằm ngang. Vật được nối với vật khối lượng $m_2 = 10 \text{ kg}$ bằng một sợi dây vắt qua ròng rọc, Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$

a/ Bỏ qua khối lượng ròng rọc, cho biết vật m_2 đi xuống với vận tốc không đổi. Tính hệ số ma sát giữa mặt phẳng nghiêng với vật m_1 .

b/ Thay m_1 bằng một vật khác nhẹ hơn có khối lượng $m_3 = 2 \text{ kg}$ và hệ số ma sát $k' = 0,2$. Khối lượng của ròng rọc bây giờ không được bỏ qua, cho biết ròng rọc có khối lượng $m = 2 \text{ kg}$ và có dạng đĩa tròn. Vật m_2 sẽ đi xuống với gia tốc bằng bao nhiêu?

c/ Trong câu b, giả sử lúc đầu vật m_2 cách mặt đất $h = 6 \text{ m}$. Tính thời gian từ lúc m_2 bắt đầu chuyển động cho đến khi chạm đất và vận tốc m_2 lúc chạm đất. Sau khi m_2 chạm đất, vật m_3 đi lên theo mặt phẳng nghiêng một đoạn bao nhiêu rồi dừng lại? (và đi xuống)

Câu 2: Một quả cầu thép khối lượng $0,5 \text{ kg}$ được treo bằng một sợi dây dài 70 cm mà đầu kia cố định, và được thả rơi lúc dây nằm ngang. Ở cuối đường đi quả cầu va chạm đàn hồi với một khối thép $2,5 \text{ kg}$, ban đầu đứng yên trên một mặt phẳng không ma sát.

a/ Tính vận tốc của quả cầu lúc va chạm

b/ Tính vận tốc của khối thép ngay sau va chạm.


c/ Nếu mặt phẳng nằm ngang có ma sát $0,2$, hỏi khối thép sẽ di chuyển xa bao nhiêu thì ngừng.

Câu 3: Có 56 g khí nito ở áp suất 1 atm và nhiệt độ 27°C , được đựng trong bình kín. Biết rằng sau khi hơi nóng thì áp suất trong bình đạt 5 atm . Hỏi:

- a/ Nhiệt độ của khối khí trong bình lên đến bao nhiêu? b/ Thể tích của bình
c/ Độ tăng nội năng của khí trong bình

ĐỀ 33.

Câu 1: Cho hệ như hình vẽ. Cho $m_1 = 1 \text{ kg}$, $m_2 = 2 \text{ kg}$. Ròng rọc là một đĩa tròn đặc có khối lượng $M = 2 \text{ kg}$. Hệ số ma sát giữa m_1 và mặt phẳng nằm ngang $k = 0,1$



a/ Gia tốc chuyển động của hệ b/ Lực căng trên các đoạn dây

b/ Lúc hệ bắt đầu chuyển động thì m_1 còn cách ròng rọc một đoạn $s = 1 \text{ m}$. Tính vận tốc của m_1 khi chạm ròng rọc và thời gian thực hiện chuyển động ấy

Câu 2: Hai quả cầu được treo ở đầu hai sợi dây song song dài bằng nhau. Hai đầu kia của các sợi dây được buộc vào một cái giá sao cho các quả cầu tiếp xúc với nhau và tâm của chúng cùng nằm trên một đường nằm ngang. Khối lượng của các quả cầu lần lượt bằng 200 g và 100 g . Quả cầu thứ nhất được nâng lên $h = 4,5 \text{ cm}$ rồi thả xuống. Hỏi sau va chạm, vận tốc của các vật và các quả cầu được nâng lên độ cao bao nhiêu nếu:

a/ Va chạm là hoàn toàn đàn hồi b/ Va chạm mềm


Câu 3: Một chất khí 2 nguyên tử có thể tích $V_1 = 0,5 \text{ lít}$ và áp suất $p_1 = 0,5 \text{ atm}$. Nó được nén đoạn nhiệt tới thể tích V_2 và áp suất p_2 . Sau đó người ta giữ nguyên thể tích V_2 và làm lạnh nó đến nhiệt độ ban đầu. Khi đó áp suất của khí là $p_3 = 1 \text{ atm}$.

a/ Vẽ đồ thị của quá trình đó trong mặt phẳng (p, V) và (V, T) b/ Quá trình nào thu và quá trình nào tỏa nhiệt lượng

c/ Tính V_2 và p_2 .


ĐỀ 34.

Câu 1: Một lính cứu hỏa đứng cách tòa nhà đang cháy một khoảng $L = 30$ m, hướng vòi phun nước vào tòa nhà với góc $\alpha = 45^\circ$ so với mặt đất. Lính cứu hỏa mở van và nước phóng ra với tốc độ ban đầu $v_0 = 20\sqrt{2}$ (m/s). Cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$. Chọn gốc tọa độ và gốc thời gian tại vòi phun nước (Hình.1).




- Tính chiều cao cực đại của dòng nước có thể đạt được.
- Tính thời gian từ lúc nước phóng ra khỏi vòi đến khi chạm vào tòa nhà.
- Vị trí nước chạm vào tòa nhà cách mặt đất khoảng h bằng bao nhiêu?

Câu 2: Một vật có khối lượng $m_2 = 2 \text{ kg}$ nối với vật $m_1 = 1 \text{ kg}$ qua dây. Cho biết dây không khối lượng không dẫn, ròng rọc không khối lượng. Biết hệ số ma sát giữa m_2 và mặt bàn là $k = 0,25$, tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$.



b) Tác dụng lên m_2 lực có độ lớn $F = 30 \text{ N}$ tạo một góc $\theta = 30^\circ$ với phương ngang. Xác định gia tốc của hai vật và lực căng dây. Các vật chuyển động theo chiều như hình.2.

c) Cho mặt bàn nghiêng một góc hợp với phương ngang là $\alpha = 30^\circ$. (Hình.3)



α) Tính gia tốc của m_1 và m_2 .

β) Tính khoảng đường của m_2 trượt được sau 2 giây, kể từ lúc hệ bắt đầu chuyển động

Câu 3: Một kmol khí ở nhiệt độ $T_1 = 300\text{K}$ được làm lạnh đẳng tích tới khi áp suất giảm xuống một nửa. Sau đó khí được dẫn đẳng áp sao cho nhiệt độ của nó ở trạng thái cuối cùng bằng nhiệt độ ban đầu.

a/ Vẽ các quá trình trên giản đồ p, V b/ Quá trình nào thu và quá trình nào tỏa nhiệt lượng


c/ Nhiệt lượng Q mà khí đã hấp thụ d/ Công A mà khí đã thực hiện e/ Độ tăng nội năng ΔU của khí

ĐỀ 35.

Câu 1: Một người đi xe đạp vận tốc không đổi $v_1 = 16,2 \text{ km/h}$ khi ngang qua một ô tô thì ô tô bắt đầu chuyển bánh cùng chiều với người đi xe đạp với gia tốc $a = 0,4 \text{ m/s}^2$. Chọn gốc tọa độ là vị trí ô tô bắt đầu chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động của hai xe, gốc thời gian là lúc ô tô bắt đầu chuyển động. Hỏi:

- a/ Sau bao lâu ô tô đuổi kịp người đi xe đạp
- b/ Vận tốc của ô tô và tọa độ lúc hai xe gặp nhau

Câu 2: Hai vật $m_1 = 1 \text{ kg}$ và $m_2 = 2 \text{ kg}$ nối với nhau bằng một sợi dây không giãn vắt qua ròng rọc như hình bên. Biết $\alpha = 30^\circ$, $g = 10 \text{ m/s}^2$, ban đầu m_1 và m_2 ở cùng một độ cao và m_1 ở cách chân mặt phẳng nghiêng 4 m . Chọn gốc tính thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng.




- a/ Tính thế năng của từng vật ở vị trí ban đầu
- b/ Tính thế năng của từng vật ở vị trí m_2 đi xuống được 1 m .
- c/ Cho biết thế năng của mỗi vật tăng hay giảm?

Câu 3: 14g nito được giãn nở đoạn nhiệt, sao cho áp suất giảm đi 5 lần và sau đó được nén đẳng nhiệt tới áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của nito là $T_1 = 420 \text{ K}$.

- a/ Biểu diễn quá trình trên giản đồ P, V
- b/ Nhiệt độ T_2 của khí ở cuối quá trình
- c/ Nhiệt lượng Q' mà khí đã nhả ra
- d/ Độ tăng nội năng ΔU của khí
- e/ Công A mà khí đã thực hiện

ĐỀ 36.

Câu 1: Một viên bi 5 gam được thả không vận tốc đầu tại A xuống mặt AC rồi tiếp tục di chuyển trên mặt BC. Độ cao của A so với gốc thế năng (đi qua B) là $h = 1 \text{ mét}$. $\alpha = 60^\circ$, $g = 10 \text{ m/s}^2$ (xem Hình 1). Mặt AB không ma sát.



- a/ Tìm vận tốc của vật tại B? và độ cao cực đại mà vật đạt được trên đoạn BC nếu bỏ qua ma sát trên đoạn BC.

b/ Nếu mặt BC có hệ số ma sát là 0,1, tìm độ cao cực đại mà vật lên được và công của lực ma sát trên đoạn BC?


Câu 2: Hai vật có khối lượng là $m_1 = 100\text{g}$ và $m_2 = 200\text{g}$ nối với nhau bằng 1 sợi dây không giãn vắt qua ròng rọc có dạng là 1 đĩa tròn. Khối lượng của ròng rọc là $M = 50\text{g}$. Ma sát không đáng kể và $g = 10\text{m/s}^2$. Giữ m_1 chạm đất thì m_2 cách mặt đất 2m. Tìm :

a/ Gia tốc của các vật.

b/ Sức căng T_1 và T_2 của dây treo.

c/ Tính độ cao cực đại mà m_1 đạt được khi m_2 chạm đất


Câu 3: Một động cơ nhiệt có tác nhân là khí lý tưởng thực hiện một chu trình gồm ba quá trình: đẳng áp từ 1 $\rightarrow$ 2, đoạn nhiệt từ 2 $\rightarrow$ 3 và đẳng nhiệt từ 3 $\rightarrow$ 1. Tính hiệu suất của động cơ theo các nhiệt độ T_1 và T_2 (Hình 3)



ĐỀ 37.

Câu 1:

Một viên đạn khối lượng $m = 50\text{g}$, được bắn thẳng vào một khối gỗ nặng $M = 5\text{kg}$ được treo trên sợi dây mảnh. Sau khi bắn, viên đạn dính chặt vào khối gỗ và người ta thấy khối gỗ được nâng lên độ cao $h = 50\text{cm}$ so với vị trí ban đầu. Cho gia tốc trọng trường $g = 10\text{m/s}^2$




a/ Tính tốc độ của viên đạn trước khi chạm vào khối gỗ.

b/ Nếu khối gỗ được giữ chặt không chuyển động và viên đạn đi sâu vào khối gỗ được một đoạn $s = 10\text{cm}$. Tính lực cản trung bình của khối gỗ lên viên đạn.

Câu 2:

Hai vật có khối lượng $m_1 = 4\text{kg}$ và $m_2 = 6\text{kg}$ nối với nhau bằng sợi dây không khối lượng không giãn vắt qua ròng rọc ở đỉnh mặt phẳng nghiêng. Biết mặt phẳng nghiêng một góc $\alpha = 30^\circ$ so với phương ngang. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Vật m_2 ma sát với mặt nghiêng với hệ số ma sát trượt là 0,10. Biết



hệ chuyển động theo chiều như hình vẽ. Tìm gia tốc chuyển động của hệ m_1 và m_2 và lực căng dây trong các trường hợp:

a/ Ròng rọc không có khối lượng.

b/ Ròng rọc có khối lượng $m=1$ kg dạng đĩa đồng chất và quay quanh trục qua tâm của nó.

Câu 3:

Một khối khí lý tưởng (phân tử khí có bậc tự do i) thực hiện chu trình biến đổi gồm: quá trình (1)-(2) là quá trình giãn nở đẳng áp, quá trình (2)-(3) là quá trình dẫn nở đoạn nhiệt và quá trình (3)-(1) là quá trình nén đẳng nhiệt. Nhiệt độ của khối khí ở các trạng thái (1) và (2) lần lượt là $t_1 = 27^\circ\text{C}$, $t_2 = 327^\circ\text{C}$, và tỉ số $V_3/V_1 = 16$.

a/ Vẽ chu trình trên mặt phẳng (V,P)


b/ Tìm bậc tự do i của phân tử khí.

c/ Tính hiệu suất của chu trình.

ĐỀ 38.

Câu 1:

Cho hệ gồm hai vật A và B được mắc qua ròng rọc như Hình 1, có khối lượng lần lượt là 2 kg và 4 kg, hệ số ma sát của vật A với mặt phẳng ngang là $k = 0,1$. Một lực $F_k = 60$ N tác dụng lên vật A, lực này hợp với phương vuông góc với mặt phẳng đặt vật A một góc $\alpha = 60^\circ$. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc. Các sợi dây là không co giãn. Chiều chuyển động như ở Hình 1. Lấy $g = 10$ m/s².




a/ Tính gia tốc của hệ vật?

b/ Tính lực căng dây?

c/ Với trường hợp không có lực F_k , ròng rọc trụ đặc có khối lượng 1 kg, bán kính 0,2 m. Tính gia tốc của hệ?

Câu 2:

Một con lắc đơn có chiều dài $l_0 = 1 \text{ m}$, treo một vật có khối lượng $m = 0,5 \text{ kg}$. Kéo con lắc đến vị trí có góc lệch $\alpha_{\max} = 60^\circ$ so với phương thẳng đứng rồi thả (Hình 2). Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Chọn gốc thế năng đi qua vị trí cân bằng.



a/ Tìm độ cao khi con lắc ở vị trí góc lệch cực đại?


b/ Tìm vận tốc khi con lắc qua vị trí cân bằng?

c/ Khi con lắc đến vị trí cân bằng thì va chạm mềm với một vật có khối lượng $M = 0,05 \text{ kg}$ đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Hỏi độ cao cực đại mà hệ vật đạt được?

Câu 3:

Cho 28 g khí Nitơ thực hiện 3 quá trình được biểu diễn trên giản đồ OTV như Hình

3. Trạng thái ban đầu có các thông số $V_1 = 1 \text{ lít}$, $p_1 = 10^6 \text{ Pa}$. Trạng thái thứ hai có $T_2 = 450 \text{ K}$.



a/ Biểu diễn lại chu trình này trên giản đồ OVp?

b/ Gọi tên các quá trình và chỉ ra quá trình nào hệ nhận nhiệt, quá trình nào hệ tỏa nhiệt? Giải thích?

c/ Tính nhiệt lượng hệ nhận vào?

d/ Tính nhiệt lượng hệ tỏa ra?

ĐỀ 39.

Câu 1: Một phi công lái máy bay phản lực cho máy bay lượn theo một vòng tròn nằm trong mặt phẳng thẳng đứng với tốc độ không đổi 1200 km/h .

- Ở điểm thấp nhất của vòng tròn, muốn gia tốc hướng tâm (tức gia tốc bán kính) có độ lớn không quá 6 lần gia tốc trọng trường g ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$) thì bán kính nhỏ nhất của vòng tròn quỹ đạo bằng bao nhiêu?
- Với bán kính ở trên thì lực mà phi công nặng 78 kg đè lên ghế ngồi ở vị trí thấp nhất đó là bao nhiêu?

Câu 2: Một thùng gỗ nặng 96 kg được kéo từ trạng thái nghỉ trên một mặt sàn bởi một lực nằm ngang không đổi F có độ lớn 350 N . Trong 15 m đầu tiên không có ma sát; ở 15 m tiếp

theo hệ số ma sát trượt bằng 0,25.

- Tính công thực hiện bởi lực kéo và công thực hiện bởi lực ma sát trên suốt đoạn đường nói trên.
- Tốc độ của vật khi đi được 30 m là bao nhiêu?

Câu 3: Một quả bóng nặng 0,60 kg đang bay với tốc độ 4,5 m/s thì va chạm trực diện một chiều với quả bóng thứ hai nặng 0,90 kg lúc đầu đang bay cùng chiều với tốc độ 3,0 m/s. Coi va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Xác định tốc độ và chiều của từng quả bóng sau va chạm.

Câu 4: Một bình chứa khí Ôxi có dung tích 20 lít. Ôxy trong bình có nhiệt độ 17°C và áp suất $1,03 \cdot 10^7 \text{ N/m}^2$.


- Tính khối lượng khí của Ôxi trong bình.
- Áp suất của khí ôxi trong bình bằng bao nhiêu nếu một nửa lượng khí đã được dùng và nhiệt độ khí còn lại là 13°C.

ĐỀ 40.

Câu 1: Một vật tại thời điểm $t_0 = 0$ đang ở gốc tọa độ, có vận tốc $\vec{v}_0 = -14\vec{i} - 7\vec{j} \text{ (m/s)}$ và có gia tốc không đổi $\vec{a} = 6\vec{i} + 3\vec{j} \text{ (m/s}^2\text{)}$. Tính độ lớn gia tốc.

- Tìm vị trí của vật ngay lúc nó ở trạng thái đứng yên.
- Lúc vật đứng yên thì nó cách gốc tọa độ bao xa?

Câu 2: Cho hệ cơ học như hình vẽ. Hai vật có khối lượng lần lượt là $m_1 = 0,5 \text{ kg}$ và $m_2 = 1 \text{ kg}$ được nối với nhau bằng một sợi dây không khối lượng, không co giãn và được vắt qua ròng rọc. Hệ số ma sát trượt của m_2 so với mặt phẳng nghiêng là $k=0,2$ góc hợp bởi phương nghiêng và phương ngang $\alpha = 30^\circ$. Ròng rọc là một đĩa tròn đặc đồng chất có khối lượng $M = 1 \text{ kg}$.



- Tính gia tốc chuyển động của các vật m_1 và m_2 và lực căng trên các đoạn dây.
- Tính công trọng lực của vật m_2 sau 2 s kể từ lúc hệ bắt đầu chuyển động.


Câu 3: Một xe ô tô khối lượng $m = 600 \text{ kg}$, chuyển động tới một dốc có độ dốc 4% (nghĩa là $\sin \alpha = 0,04$, α là góc nghiêng của dốc so với mặt phẳng ngang) với tốc độ 72 km/h . Biết hệ số ma sát giữa xe và dốc là $0,07$. Tìm:

- Nếu muốn xe chuyển động thẳng đều lên dốc với tốc độ vẫn là 72 km/h , thì lực kéo của động cơ phải bằng bao nhiêu?
- Tính công suất của động cơ ô tô khi nó lên dốc đó.

Câu 4: Một kmol khí lý tưởng đơn nguyên tử thực hiện chu trình như hình vẽ. P


Cho $T_1 = 600 \text{ K}$. Cho $V_1/V_2 = 4$.

- Nêu tên các quá trình đó.
- Tính công do khối khí nhận vào trong quá trình 12
- Hiệu suất của chu trình.



ĐỀ 41.


Câu 1: Một hệ vật gồm một ròng rọc bán kính $0,2 \text{ m}$ nối với vật m có khối lượng 2 kg bằng một dây nhẹ, không co giãn. Hệ vật được đặt trên một mặt phẳng nghiêng có góc $\Theta = 20^\circ$. Hệ số ma sát giữa vật m và mặt nghiêng là $0,12$. Thả cho hệ chuyển động từ trạng thái đứng yên. Biết rằng vật m trượt xuống mặt phẳng nghiêng với gia tốc 2 m/s^2 . Cho $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.



Bỏ qua ma sát giữa dây và ròng rọc. Dây không trượt trên mặt ròng rọc. Hãy tìm:

- Mô-men quán tính của ròng rọc.
- Công do trọng lực thực hiện đối với vật m khi nó đi được quãng đường $0,2 \text{ m}$.

Câu 2: Thả một hình trụ đặc (A) và một hình trụ rỗng (B) có cùng khối lượng và bán kính tiết diện để chúng lăn không trượt xuống một dốc nghiêng. Lúc bắt đầu lăn thì tốc độ của chúng bằng 0 và chúng ở cùng một độ cao. Hình trụ nào sẽ đến chân dốc trước? Tại sao?



Câu 3: Cho một mol khí lý tưởng đơn nguyên tử thực hiện chu trình gồm hai quá trình đẳng tích, một quá trình đẳng áp và một quá trình đẳng nhiệt như hình 3. Biết rằng ở trạng thái 1 khối khí có thể tích $V_1 = 5$ lít và áp suất $p_1 = 5 \cdot 10^5$ Pa, thể tích khối khí ở trạng thái 4 là $V_4 = 2V_1$, áp suất khối khí ở trạng thái 2 là $p_2 = 3p_1$. Hãy tìm:

- Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái 2.
- Công mà khối khí sinh ra trong một chu trình.
- Hiệu suất của chu trình

