

# PPI untuk Maag Lambung

## Obat asam lambung yang sering dipakai, tapi jangan asal minum

Keluhan maag itu bukan hal kecil. Secara global, penyakit asam lambung naik atau GERD diperkirakan mengenai sekitar **13,98% penduduk dunia**, atau kira-kira **1 miliar orang**. Keluhan dispepsia fungsional seperti nyeri ulu hati, begah, cepat kenyang, dan mual juga cukup sering, sekitar **6,8 sampai 11,9%** orang dewasa di dunia. Di Indonesia, data besar masih terbatas, tapi studi lokal menunjukkan keluhan GERD bisa ditemukan cukup tinggi pada kelompok masyarakat yang diteliti. Jadi kalau sering merasa lambung panas, dada perih, mulut pahit, atau perut begah, itu bukan cuma perasaan saja. Masalahnya memang banyak.

Maag sebenarnya bukan satu penyakit saja. Orang sering menyebut semua nyeri ulu hati sebagai maag. Padahal penyebabnya bisa beda-beda. Bisa karena asam lambung naik ke kerongkongan, luka lambung, iritasi lambung akibat obat nyeri, infeksi bakteri **Helicobacter pylori**, atau gangguan fungsi lambung yang membuat perut gampang begah walau tidak ada luka besar.

Di sinilah PPI sering dipakai. PPI adalah singkatan dari **proton pump inhibitor**. Mudah-mudahan, PPI adalah obat yang menurunkan produksi asam lambung. Lambung tetap bisa bekerja, tapi asamnya dibuat lebih rendah, sehingga bagian yang sedang iritasi punya waktu untuk tenang dan sembuh.

Contoh obat PPI yang sering ditemui adalah **omeprazole, lansoprazole, pantoprazole, esomeprazole, rabeprazole**, dan **dexlansoprazole**. Nama dagangnya bisa berbeda-beda, tapi golongannya sama.

PPI biasanya dipakai pada keluhan seperti GERD, luka lambung, luka usus dua belas jari, dispepsia tertentu, dan perlindungan lambung pada orang yang berisiko luka karena obat anti nyeri tertentu. Dalam konsensus Indonesia, pasien dispepsia tanpa tanda bahaya dapat diberikan terapi awal dengan PPI, dengan atau tanpa obat tambahan sesuai penilaian dokter.

Cara minumannya juga penting. PPI paling baik diminum **30 sampai 60 menit sebelum makan**, biasanya sebelum sarapan. Jangan diminum setelah makan besar lalu berharap langsung hilang seperti obat maag cair. PPI bukan obat yang bekerja seketika. Ia bekerja dengan menekan pabrik asam lambung, jadi hasilnya sering lebih terasa setelah beberapa hari. Pada GERD, guideline ACG juga merekomendasikan PPI diminum 30 sampai 60 menit sebelum makan untuk kontrol gejala yang lebih baik.

Tapi ini yang sering dilupakan. Tidak semua maag harus minum PPI terus menerus. Kalau penyebabnya bakteri **H. pylori**, maka perlu terapi antibiotik khusus. Kalau penyebabnya obat nyeri seperti ibuprofen, asam mefenamat, atau diclofenac, maka obat pemicunya perlu dievaluasi. Kalau penyebabnya pola makan, berat badan, rokok, alkohol, atau sering langsung tiduran setelah makan, obat saja tidak cukup.

PPI juga bukan vitamin lambung. Obat ini umumnya aman bila dipakai sesuai indikasi. Namun pemakaian lama tanpa alasan jelas sebaiknya dievaluasi. AGA menyarankan penggunaan PPI ditinjau ulang secara berkala, karena sebagian pasien memakainya terus padahal indikasinya sudah tidak jelas. Kalau memang masih perlu, lanjut bisa benar. Kalau tidak perlu, dokter bisa menurunkan dosis atau menghentikan dengan cara yang aman.

Segera periksa bila ada tanda bahaya seperti muntah darah, BAB hitam, berat badan turun tanpa sebab, sulit menelan, muntah terus, nyeri dada berat, pucat karena anemia, atau keluhan baru muncul pada usia lebih tua. Pada kondisi seperti ini, jangan hanya menutup gejala dengan obat maag.

## Mitos vs Fakta

- **Mitos:** Semua maag sembuh dengan PPI.  
**Fakta:** Tidak selalu. Penyebab maag bisa beda beda.
- **Mitos:** PPI makin lama diminum makin bagus.  
**Fakta:** PPI perlu durasi yang sesuai. Pemakaian lama harus punya alasan.
- **Mitos:** PPI diminum setelah makan.  
**Fakta:** Umumnya lebih baik sebelum makan.

## FAQ Singkat

### Apakah PPI boleh dibeli sendiri?

Bisa saja untuk keluhan ringan jangka pendek, tapi bila sering kambuh sebaiknya periksa.

### Berapa lama biasanya diminum?

Tergantung penyakitnya. Ada yang cukup beberapa hari, ada yang perlu beberapa minggu. GERD tertentu bisa butuh terapi lebih lama.

### Kalau sudah enak boleh berhenti?

Jangan asal berhenti bila dokter memberi durasi tertentu. Namun jangan juga minum berbulan bulan tanpa kontrol.

## Kesimpulan

PPI adalah obat penting untuk banyak masalah asam lambung. Obat ini bisa sangat membantu, terutama bila keluhannya memang berhubungan dengan asam. Tapi PPI bukan obat sapu bersih untuk semua maag. Kuncinya adalah pakai dengan cara benar, durasi benar, dan tetap cari penyebabnya.

## Daftar Pustaka AMA

1. Nirwan JS, Hasan SS, Babar ZUD, Conway BR, Ghori MU. Global prevalence and risk factors of gastro-oesophageal reflux disease. *Sci Rep*. 2020;10:5814. doi:10.1038/s41598-020-62795-1
2. Lee K, Kwon CI, Yeniova AÖ, et al. Global prevalence of functional dyspepsia according to Rome criteria, 1990–2020. *Sci Rep*. 2024;14:4172. doi:10.1038/s41598-024-54716-3
3. Syam AF, et al. Management of dyspepsia and Helicobacter pylori infection: the 2022 Indonesian Consensus Report. *Gut Pathog*. 2023;15:25. doi:10.1186/s13099-023-00551-2
4. Katz PO, Dunbar KB, Schnoll-Sussman FH, et al. ACG Clinical Guideline for the diagnosis and management of GERD. *Am J Gastroenterol*. 2022;117:27-56. doi:10.14309/ajg.0000000000001538
5. Targownik LE, Fisher DA, Saini SD. AGA Clinical Practice Update on de-prescribing of proton pump inhibitors. *Gastroenterology*. 2022;162:1334-1342. doi:10.1053/j.gastro.2021.12.247