



PROTAB

ZOLEDRONIC ACID

INDIKASI & SKRINING PRA-TERAPI



PROTOKOL PEMBERUAN INFUS

- Berikan sebagai infus intravena selama minimal 15 menit
- Gunakan jalur infus terpisah
- Biarkan mencapai suhu ruangan sebelum digunakan
- Ikuti dengan flush 10 mL NaCl 0,9% setelah infus selesai
- Asetaminofen pasca-infus dapat mengurangi reaksi fase akut

DOSIS

- Dosis Umum:**
Osteoporosis: 5 mg IV sekali setahun
Pencegahan Osteoporosis: 5 mg IV sekali 2 tahun
Multiple Myeloma/metantasis: 4 mg IV Single Dose
- Suplemen:**
Pasien Onkologi: Kalsium 500 mg + Vit D 400 IU/hari

PENYESUAIAN DOSIS GINJAL

Baseline Creatinine Clearance (mL/min)	Dosis (mg)
> 60	4
50 - 60	3,5
40 - 49	3,3
30 - 39	3

PEMANTAUAN PASCA-INFUS

- REAKSI FASE AKUT**

Sering muncul 3 hari pertama:
Demam dan Menggigil (Chills)
Myalgia dan Arthralgia
Nyeri Kepala (Headache)
Kelelahan (Fatigue)
- MONITORING PARMAETER**

Fungsi Ginjal: Kreatinin/CrCl sesuai jadwal formulasi
Status Elektrolit: Hipokalsemia
Asupan cairan adekuat pasca-infus
Nyeri Spesifik: Nyeri rahang/paha/selangkangan (risiko ONJ/AFF)
Kalsium & Vitamin D