
Dossier produits : Nutrition, biostimulation et protection

Panorama des solutions de nutrition, de biostimulation et de protection des cultures — prix marchands moyens estimés au Canada en CAD.

Comment lire le portefeuille

01

Fonction

Nutrition de base, biostimulation, floraison, structure ou protection. Chaque produit est positionné par rôle agronomique.

02

Repères

Format, prix marchand estimé au Canada, gamme N-P-K et dosage indiqué dans le dossier source.

03

Vigilance

Les règles de mélange et de manipulation sont signalées en ambre. Les prix sont des estimations, non des devis.

Lecture séquentielle : base nutritive → biostimulation → floraison → renforcement → protection ciblée.

Vital Humic — Hydro Bio

Suppléments de plantes biofermenté · format 850 g

Composition

7 souches de probiotiques, acides humiques et fulviques, Sea Kelp et mélasse.

Bénéfices

- Améliore l'absorption et la mobilité des nutriments aux micro-racines.
- Favorise la production de BRIX, les sucres associés à la santé et au goût.
- Nourrit la biologie du sol et du substrat.

DOSAGE MOYEN

0,5–1 g/L

100% soluble en hydroponie et en terre.

Mode d'emploi

S'utilise en complément dans le réservoir d'eau.

Black Flower Research — Liquid Seaweed

Fertilisant liquide d'algues marines 100% organique · format 1 L · 30–35 \$ CAD

Ce que contient la formule

Extrait concentré d'algues marines riche en oligo-éléments et en hormones de croissance naturelles, notamment cytokinines et auxines.

0.6 · 2 · 7 N-P-K

Effet recherché

- Améliore la tolérance à la chaleur et à la sécheresse.
- Stimule le développement des racines et la floraison.

DOSAGE ANNOTÉ SUR BOUTEILLE

2 mL/L

Arrosage ou pulvérisation foliaire tout au long du cycle.

Nutri+ — Acide phosphorique 34% (pH-)

Format 1 L · 18-24 \$ CAD · gamme N-P-K : 0-34-0

5,8–6,2

Plage de pH cible

Un pH stabilisé favorise l'assimilation des engrais par les racines et limite les blocages nutritifs.

Utilisation

- Solution d'acide phosphorique concentrée à 34%.
- Ajouter au goutte-à-goutte dans le réservoir en tout dernier lieu.

Attention — produit corrosif.

Manipuler avec gants et lunettes.

Nature’s Nectar — Potassium

Certifié biologique OMRI · 3,78 L / 1 gallon · 68-75 \$ CAD · N-P-K : 0-0-5

K = densité · fermeté · transport des sucres

Composition

Extrait de varech et sulfate de potassium pur et soluble. Fournit une source rapide de potassium sans accumulation de sels indésirables.

Positionnement dans le cycle

01

Croissance

02

Transition

03

Floraison — essentiel

Dosage moyen : 2 à 3 mL/L d’eau.

Black Flower Research — ViciousBloom

Concentré pour promouvoir la floraison · 4 L · 75–90 \$ CAD

0–30–20 N-P-K

Booster PK ultra-concentré

Déclencheur et amplificateur de masse florale; vise le gonflement des têtes et la production de résine/huiles.

Fenêtre d'emploi

- Pic de floraison : semaines 4 à 7.
- Commencer bas et respecter le maximum indiqué.

0,5–1,5 mL/L

Dosage recommandé maximum — produit très concentré.

Black Flower Research — Engrais Base A & B

Partie A 4 L : 45–55 \$ CAD · Partie B 20 L : 160–190 \$ CAD

Partie A

5,5–0–4

Apporte principalement l'azote et le calcium.

Partie B

1–2–4,5

Apporte le phosphore, le potassium et le magnésium.

Règle d'or : ne jamais mélanger A et B sous forme pure concentrée. Verser A dans l'eau, mélanger, puis ajouter B afin d'éviter la précipitation.

Black Flower Research — NitroCarb

Amplificateur de masse / Weight Booster · 1,5 kg · 55–70 \$ CAD

Sucres complexes + simples

Rôle dans le système

- Nourrit la microbiologie : bactéries et champignons bénéfiques du sol.
- Fournit une réserve d'énergie directe en fin de floraison.
- Vise la masse et les arômes des têtes.

Dosage indiqué sur l'étiquette

3 g

pour 20 L
croissance / floraison

6 g

pour 20 L
période de rinçage

Emerald Harvest — Sturdy Stalk

Potassium Silicate Supplement · 3,79 L / 1 US Gal · 110–125 \$ CAD · N-P-K : 0–0–1

11,2%

Silice (SiO₂)

Silicate de potassium liquide pour renforcer les tissus.

Effets recherchés

- Épaissit les parois cellulaires des tiges et branches.
- Aide à supporter des fleurs lourdes sans casser.
- Renforce la résistance naturelle à la chaleur, à la sécheresse et aux ravageurs.

À verser en premier

Ajouter le silicate dans l'eau claire avant tout autre engrais. Dosage moyen : 0,5 à 1 mL/L.

Deux traitements de contact

Intervenir sur les ravageurs sans confondre spectre d'action, moment et zone d'application.

Ortho — Bug B Gon ECO

17–22 \$ CAD · 500 mL

FORMULATION

Huile de canola et pyrèthrine botanique.

CIBLE

- Pucerons, araignées rouges, mouches blanches, thrips et cochenilles.
- Œufs, larves et adultes.

Précaution : traitement foliaire de contact; ne pas appliquer directement sur les têtes/fleurs développées en floraison.

Safer's — Savon insecticide

15–20 \$ CAD · 500 mL

FORMULATION

Sels de potassium d'acides gras à 50,5%.

CIBLE

- Insectes à corps mou : pucerons, mouches blanches et tétranyques.
- Dissout la cuticule protectrice des insectes.

Mode d'emploi : diluer dans l'eau et pulvériser directement sur les insectes ciblés.

Synthèse opérationnelle

Un portefeuille lisible quand chaque produit reste à sa place dans la séquence.

01

Base

Base A & B pour couvrir les besoins nutritionnels fondamentaux.

02

Biostimulation

Humics, algues et NitroCarb pour soutenir biologie, racines et énergie.

03

Bloom

Potassium et ViciousBloom ciblent densité, masse et floraison.

04

Protection

Traitements de contact adaptés au ravageur et au stade de culture.

Trois règles critiques

Silicate en premier dans l'eau claire; A puis B jamais sous forme concentrée; acide phosphorique en dernier avec gants et lunettes.

Repère de décision

Choisir selon le rôle recherché, le dosage indiqué et le moment du cycle — sans cumuler les fonctions par défaut.