上海交通大学 2005 至 2006 第一学期线代数 bA 卷期末考试试题

线 性 代 数(B)试 卷----A

卷　　2006-1-4

姓名_____班级_____学号_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单项选择题（每题 3 分，共 15 分）

1. 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s(s\geq 2)$线性无关，且可由向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$线性表示，则以下结论中不能成立的是_____

(A) 向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$线性无关；

(B) 对任一个$\alpha_j(0\leq j\leq s)$，向量组$\alpha_j,\beta_2,\cdots,\beta_s$线性相关；

(C) 存在一个$\alpha_j(0\leq j\leq s)$，向量组$\alpha_j,\beta_2,\cdots,\beta_s$线性无关；

(D) 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$与向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$等价。

2. 设三阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$，已知伴随矩阵$A^*$的秩为 1，则必有

(A) $a\neq b$且$a+2b\neq 0$；　　(B) $a\neq b$且$a+2b=0$；

(C) $a=b$或$a+2b\neq 0$；　　(D) $a=b$或$a+2b=0$。

3. 设α是n维非零实列向量，矩阵$A=E+\alpha\alpha^T$，$n\geq 3$，则_____

(A) A至少有$n-1$个特征值为1； (B) A只有1个特征值为1；

(C) A恰有$n-1$个特征值为1； (D) A没有1个特征值为1。

4. 设A,B为n阶方阵，且$r(A)=r(B)$，则_____

(A) $r(A-B)=0$； (B) $r(A+B)=2r(A)$；

(C) $r(A,B)=2r(A)$； (D) $r(A,B)\le r(A)+r(B)$。

5. 设A为$m\times n$实矩阵，$r(A)=n$，则_____

(A) A^TA必合同于n阶单位矩阵； (B) AA^T必等价于m阶单位矩阵；

(C) A^TA必相似于n阶单位矩阵； (D) AA^T是m阶单位矩阵。

二、**填空题**（每题3分，共15分）

1. 已知A,B为n阶方阵，$\lambda=\pm1$不是B的特征值，且$AB-A-B=E$，

则$A^{-1}=$_____。

2. 若三阶方阵A有特征值$1,1,2$，则行列式

$|A^{-1}+2A^*|=$_____。

3. 已知实二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2ax_1x_2+2x_2x_3$正定，则常数$a$的取值范围为_____。

4. 已知A为n阶方阵，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$是$A$的列向量组，行列式$|A|=0$，其伴随矩阵$A^*\neq0$，则齐次线性方程组$A^*x=0$的通解为_____。

5. 设A为n阶实矩阵，且$A^T=A^{-1}$，$|A|<0$，则行列式$|A+E|=$_____。

三、**计算题**(每题 9 分, 共 54 分)

1. 线性方程组为 $\begin{cases} x_1+x_2+2x_3=0 \\ 2x_1+x_2+ax_3=1 \\ 3x_1+2x_2+4x_3=b \end{cases}$，问 a, b 各取何值时，线性方程组无解，有唯一解，有无穷多解？在有无穷多解时求出其通解。

2. 设 3 阶方阵 A, B, C 满足方程 $C(2A-B)=A$，试求矩阵 A，其中

$$B=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad C=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}。$$

3. 计算行列式 $|A|, |B|, \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix}$，其中

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-1 & n+x \\ 1 & 2 & \cdots & (n-1)+x & n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 2+x & \cdots & n-1 & n \\ 1+x & 2 & \cdots & n-1 & n \end{pmatrix}, \qquad B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & n-1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$$

4. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1x_2-2x_2x_3+2x_3x_1$，求正交变换 $x=Qy$，

化 $f(x_1,x_2,x_3)$ 为标准形，并写出正交变换 $x=Qy$

5. 已知 A 为三阶实对称矩阵，秩 $r(A)=2$，$\alpha_1=(0,1,0)^T$，$\alpha_2=(-1,0,1)^T$，是 A 对应特征值 $\lambda_1=\lambda_2=3$ 的特征向量，试求：

（1）A 的另一个特征值 λ_3 及其特征向量 α_3；　　（2） 矩阵 A，矩阵 A^n。

6. 设 R^3 的两个基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\2\\2\end{pmatrix}$；$\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，

$\beta_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

（1） 求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵 P；

（2） 已知向量 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，求向量 α 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标；

(3) 求在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 和 β_1,β_2,β_3 下有相同坐标的所有向量。

四、证明题(每题 8 分, 共 16 分)

1．设 A 为 $m\times n$ 矩阵，证明：存在 $n\times s$ 非零矩阵 B，使 $AB=O$ 的充分必要条件为秩 $r(A)<n$。

2. 设 A,B 是 n 阶实矩阵, A 的特征值互异。证明:矩阵 $AB=BA$ 的充分必要条件为 A 的特征向量都是 B 的特征向量。

线性代数（B）（05—06—1）期末试卷（A）参考答案

一、选择题

1. (B)　　2. (B)　　3. (C)　　4. (D)　　5. (A)

二、填空题

1. $(B-E)(B+E)^{-1}$；　　2. $\frac{125}{2}$；　　3. $|a|<\sqrt{7/2}$；

4. $\sum_{i=1}^{n-1}k_i\alpha_{j_i},\alpha_{j_i},i=1,2,\cdots,n-1$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 的极大线性无关组；

5. $|A+E|=0$

三、计算题

1. $$\overline{A}=\begin{pmatrix}1&1&2&0\\2&1&a&1\\3&2&4&b\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&0\\0&1&4-a&-1\\0&0&2-a&b-1\end{pmatrix}$$

当 $a\neq 2$ 时，方程组有唯一解

当 $a=2$，$b\neq 1$ 时，方程组无解

当 $a=2$，$b=1$ 时，$r(A)=r(\overline{A})=2<3$，方程组有无穷多组解, 其通解为

$$\alpha=(1,-1,0)^T+k(0,-2,1)^T$$，k 为任意常数。

2. $(2C-E)A=CB$，$A=(2C-E)^{-1}(CB)$

$$A=\begin{pmatrix}1&-4&8\\0&1&-4\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&4&11\\0&1&4\\0&0&1\end{pmatrix}$$

3. $|A|=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}(\frac{n(n+1)}{2}+x)x^{n-1}$，$|B|=n!$，

$$\begin{vmatrix}O&A\\B&O\end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}+n^2}(\frac{n(n+1)}{2}+x)n!x^{n-1}$$。

4. f 的矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&-1\\1&-1&0\end{pmatrix}$，有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-2$

A 对应的线性无关的特征向量与单位正交特征向量

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix};\ \eta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},$$

$$\eta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix},\quad \eta_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}-1\\1\\1\end{pmatrix},$$

于是正交变换 $x=Qy$ 即

$$\begin{cases}x_1=\frac{1}{\sqrt{2}}y_1+\frac{1}{\sqrt{6}}y_2-\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\\x_2=\frac{1}{\sqrt{2}}y_1-\frac{1}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\\x_3=\quad\frac{2}{\sqrt{6}}y_2+\frac{1}{\sqrt{3}}y_3\end{cases}$$

化二次型为标准形 $f=y_1^2+y_2^2-2y_3^2$。

5. （1）因为 $r(A)=2,|A|=0$，所以 $\lambda_3=0$；设 $A\alpha=0\alpha$，由 α 与 α_1,α_2 正交，

得 $\alpha=k(1,0,1)^T$

（2） 设 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，则

$$A=P\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&0\end{pmatrix}P^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}3&0&-3\\0&6&0\\-3&0&3\end{pmatrix}$$

$$A^n = P\begin{pmatrix} 3^n & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3^n & 0 & -3^n \\ 0 & 2\cdot 3^n & 0 \\ -3^n & 0 & 3^n \end{pmatrix}$$。

6. (1) 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，$(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)P$

$$P=A^{-1}B=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

(2) $\alpha=\beta_1+\beta_2+3\beta_3$，坐标 $x=(1,1,3)^T$

(3) 设 $\beta=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)x=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)x$

$$((\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)-(\beta_1,\beta_2,\beta_3))x=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}x=0$$

则

解得 $x=(1,1,-1)^T$，故 $\beta=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3=k(1,0,-1)^T$。

四、证明题

1．设 $B=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s)$，则 $\beta_j, j=1,2,\cdots s$ 都是线性方程组 $Ax=0$ 的解。故

$AB=O \Leftrightarrow$ 方程组 $Ax=0$ 有非零解 $\Leftrightarrow r(A)<n$。

2．必要性： 设 $A\alpha=\lambda\alpha$，则当 $B\alpha\neq 0$ 时，由 $A(B\alpha)=B(A\alpha)=\lambda(B\alpha)$，知

$\alpha, B\alpha$ 都是 A 对应特征值 λ 的特征向量，λ 是 A 的一重特征值，

$\alpha, B\alpha$ 线性相关。因此，存在常数 μ，使 $B\alpha=\mu\alpha$，α 是 B 的对应特征值 μ 的特征向量。

当 $B\alpha=0$ 时，α 是对应 B 的特征值 $\mu=0$ 的特征向量。

故 A 的特征向量都是 B 的特征向量。

充分性： A 的特征值互异，相似于对角阵，即存在可逆阵 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)$，

$$A=P\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}P^{-1}$$

使 。

A 的特征向量都是 B 的特征向量，故 $B = P\begin{pmatrix}\mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n\end{pmatrix}P^{-1}$。

因为

$$AB = P\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}P^{-1}P\begin{pmatrix}\mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n\end{pmatrix}P^{-1} = P\begin{pmatrix}\lambda_1\mu_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\mu_n\end{pmatrix}P^{-1},$$

$$BA = P\begin{pmatrix}\mu_1\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \mu_n\lambda_n\end{pmatrix}P^{-1},$$

所以 $AB = BA$。