五、（12 分）设 V 为 n 维线性空间，$\{\eta_1,\eta_2,...,\eta_n\}$ 为 V 的一个基，且

$$\begin{aligned}\alpha_1&=\eta_1+\eta_2+...+\eta_n\\ \alpha_2&=\eta_2+\eta_3+...+\eta_n\\ &...\\ \alpha_n&=\eta_n\end{aligned}$$

(1) 证明 $\{\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n\}$ 为 V 的一个基；

(2) 求由基 $\{\eta_1,\eta_2,...,\eta_n\}$ 到基 $\{\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n\}$ 的过渡矩阵；

(3) 设 a 在基 $\{\eta_1,\eta_2,...,\eta_n\}$ 下的坐标为 $(a_1,a_2,...,a_n)$，求 a 在基 $\{\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n\}$ 下的坐标。

六、（12 分）设 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m\in\mathbb{R}^n$，证明 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 线性无关的充要条件是行列式

$$\begin{vmatrix}<\alpha_1,\alpha_1> & <\alpha_1,\alpha_2> & \cdots & <\alpha_1,\alpha_m>\\ <\alpha_2,\alpha_1> & <\alpha_2,\alpha_2> & \cdots & <\alpha_2,\alpha_m>\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ <\alpha_m,\alpha_1> & <\alpha_m,\alpha_2> & \cdots & <\alpha_m,\alpha_m>\end{vmatrix}\neq 0$$

七、（14 分）设 A 为 n 阶方阵，B 为 m 阶方阵。证明：$\begin{bmatrix}A & \\ & B\end{bmatrix}$ 相似于一个对角矩阵当且仅当 A、B 分别相似于一个对角阵。

八、（14 分）设二次型

$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2+2bx_1x_3+2x_2x_3$的矩阵 A 有特征值

$\lambda_1=\lambda_2=1$和$\lambda_3=4$。

(1) 求参数a,b的值;

(2) 用正交变换将二次型化为标准型，并写出所用的正交变换

（装订线内不要答题）