中国农业大学

2018 ~2019 学年秋季学期

线性代数(A)课程考试试题（解答） (2019.1.17)

一、 选择题（本题满分 15 分，共有 5 道小题，每道小题 3 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，把所选项前的字母填在题后的括号内）

1．以下结论错误的是【 C 】.

(A) 如果 A,B 为 n 阶可逆方阵，那么可用行初等变换把 A 变为 B；

(B) 如果 A^*， B^* 分别是 n 阶矩阵 A,B 的伴随矩阵，那么 $(AB)^*=B^*A^*$；

(C) 如果 A 为 $m\times n$ 矩阵，且 $m>n$ 和 $R(A)=n$，那么 AA^T 正定；

(D) 相似的矩阵有相同的秩.

2. 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 是 4 阶方阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，若 $(1,0,1,0)^T$ 是方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，则 $A^*x=0$ 的一个基础解系为【 D 】.

(A) α_1,α_3； (B) α_1,α_2； (C) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$； (D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

3. 设 A 是 4 阶实对称矩阵，且满足 $A^2+A=0$，若 A 秩为 3，则 A 相似于（ C ）

(A) $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&0\end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix}1&&&\\&-1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$

4．设矩阵 A 满足 $A^2+A-3E=0$，其中 E 为单位矩阵，则 $(A-E)^{-1}=$（ A ）

(A) $A+2E$ (B) A (C) $A-2E$ (D) $A+E$

5．设向量组 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关，则下列向量组线性相关的是（ B ）

(A) $\xi_1+2\xi_2,\xi_2+2\xi_3,\xi_3+2\xi_1$ (B) $\xi_1-\xi_2,\xi_2-\xi_3,\xi_3-\xi_1$

微信公众号：农大球知道

更多考试真题
请扫码获取



(C) $\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_3+\xi_1$　　(D) $\xi_1-2\xi_2,\xi_2-2\xi_3,\xi_3-2\xi_1$

二、填空题（本题满分 15 分，共有 5 道小题，每道小题 3 分，请将合适的答案填在每题的空中）

1. 设 4 阶矩阵 $A=[\alpha,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3]$, $B=[\beta,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3]$，其中 $\alpha,\beta,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$ 是 4 维列向量，且 $|A|=3$, $|B|=-1$，则 $|A+2B|=$ 27

2．设 A 为 n 阶矩阵且至少有个 n^2-n+1 元素为 0，则 A 的秩至多= n−1 .

3. 设 $A=\begin{pmatrix}3&k&0\\k&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 为正定矩阵，则 k 应满足 $-3<k<3$

4. 设四元非齐次线性方程组 $Ax=b$ 中，A 的秩为 3，且 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为它的三个解向量，已知 $\alpha_1+3\alpha_3=(2,0,1,9)^T$, $\alpha_2=(1,0,0,2)^T$, 则对应的齐次方程组 $Ax=0$ 的通解可以写成 $k(-2,0,1,1)^T, k\in R$

5. 设 A 为 3 阶矩阵，P 为 3 阶可逆矩阵，且 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, $P^TAP=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，

若 $Q=(\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2)$，则 $Q^TAQ=$ $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&1&1\end{pmatrix}$.

三、（本题满分 14 分） 设 3 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$, n 阶矩阵 $B=\begin{pmatrix}x&-1&0&\cdots&0&0\\0&x&-1&\cdots&0&0\\0&0&x&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&x&-1\\a_0&a_1&a_2&\cdots&a_{n-2}&x\end{pmatrix}$，计算行列式 $|A|$, $|B|$, $\begin{vmatrix}O&A\\B&O\end{vmatrix}$.

$|A|=4$,

微信公众号：农大环知道

$|\boldsymbol{B}|=\mathrm{a}_0+\boldsymbol{a}_1\boldsymbol{x}+\mathrm{L}\ \boldsymbol{a}_{n-2}\boldsymbol{x}^{n-2}+\boldsymbol{x}^n,$

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{vmatrix}=(-1)^{3n}4\ (\mathrm{a}_0+\boldsymbol{a}_1\boldsymbol{x}+\mathrm{L}\ \boldsymbol{a}_{n-2}\boldsymbol{x}^{n-2}+\boldsymbol{x}^n)$$

14 分

四、（本题满分 12 分）

1. 设三阶方阵 A,B 满足 $A^*BA=3BA-9E$, 且 $A=\begin{pmatrix}4 & & \\ & \frac{3}{8} & \\ & & 2\end{pmatrix}$，求 B.

解：等式的两边同时左乘 A 得

$$AA^*BA=3ABA-9A,\ \text{则}\ |A|BA=3ABA-9A,\ \text{即}\ 3BA=3ABA-9A$$

等式两边同时右乘A^{-1}，得：$3B=3AB-9E$，即 $(A-E)B=3E$,

于是 $B=3(A-E)^{-1}=\begin{pmatrix}1 & & \\ & -\frac{24}{5} & \\ & & 3\end{pmatrix}$.

五、（本题满分 16 分）

1. 设有向量组 $a_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\3\end{pmatrix},a_2=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\1\end{pmatrix},a_3=\begin{pmatrix}1\\3\\3\\5\end{pmatrix},a_4=\begin{pmatrix}4\\5\\-2\\6\end{pmatrix},a_5=\begin{pmatrix}-3\\-5\\-1\\-7\end{pmatrix},$

(1) 求该向量组的秩；

(2) 求该向量组的一组极大向量无关组，并将其余的向量用该极大向量无关组线性表出.

解：作初等变换

$$\begin{pmatrix}1&1&1&4&-3\\2&1&3&5&-5\\1&-1&3&-2&-1\\3&1&5&6&-7\end{pmatrix}:\begin{pmatrix}1&1&1&4&-3\\0&-1&1&-3&1\\0&-2&2&-6&2\\0&-2&2&-6&2\end{pmatrix}:\begin{pmatrix}1&1&1&4&-3\\0&-1&1&-3&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}:\begin{pmatrix}1&0&2&1&-2\\0&1&-1&3&-1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

由此可知该向量组的秩为 2， 其中

a_1,a_2 是该向量组的一组极大无关组，

$a_3=2a_1-a_2,\ a_4=a_1+3a_2,\ a_5=-2a_1-a_2.$

微信公众号：农大球知道

2. 已知方程组$\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3=0 \\ 2x_1+3x_2+5x_3=0 \\ x_1+4x_2+ax_3=0 \end{cases}$与$\begin{cases} x_1+bx_2+cx_3=0 \\ 2x_1+b^2x_2+(c+1)x_3=0 \end{cases}$同解，求$a,b,c$的值.

解：做初等变换$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & a \end{pmatrix}:\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & a-3 \end{pmatrix}:\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a-5 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & b & c \\ 2 & b^2 & c+1 \end{pmatrix}:\begin{pmatrix} 1 & b & c \\ 0 & b^2-2b & 1-c \end{pmatrix}$

因为两个方程组同解可以得到两系数矩阵的秩都为 2

于是a=5，

根据第一个方程组可以取公共解为$\alpha=\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$,

代入第二个方程组得$\begin{cases} -1-b+c=0 \\ -b^2+2b=1-c=0 \end{cases}$

解得$\begin{cases} b=0 \\ c=1 \end{cases}$（舍去）或者$\begin{cases} b=1 \\ c=2 \end{cases}$

于是 a=5，b=1,c=2

（本题满分 8 分）设A是n阶矩阵，若存在正整数k，使得线性方程组$A^kx=O$有解向量α，且$A^{k-1}\alpha\neq O$

证明：向量组α，$A\alpha$,L $A^{k-1}\alpha$线性无关.

证明：设$k_1\alpha+k_2A\alpha+\mathrm{L}\ k_kA^{k-1}\alpha=0$

等式两边左乘A^{k-1}得$k_1A^{k-1}\alpha=0$

因为$A^{k-1}\alpha\neq O$所以k_1=0

等式两边左乘A^{k-2}得$k_2=0$

同理每个$k_i=0$

于是α，$A\alpha$,L $A^{k-1}\alpha$线性无关.

微信公众号：农大球知道

七、（本题满分 12 分）设二次型

$f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3(a>0)$ 通过正交变换可化为标准型 $f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，

(1) 求 a 的值；

(2) 求出所用的正交变换矩阵.

解：二次型的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&a\\0&a&3\end{pmatrix}$，其特征多项式为

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}2-\lambda&0&0\\0&3-\lambda&a\\0&a&3-\lambda\end{vmatrix}=-\left(\lambda^2-6\lambda-(a^2-9)\right)(\lambda-2)=0$$

由标准型 $f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$ 知 A 的特征值为 1，2，5，故 1 和 5 是 $\lambda^2-6\lambda-(a^2-9)=0$ 的根，解得 $a=\pm2$，又 $a>0$, 故 $a=2$.

对于 $\lambda_1=1$，所对应的齐次线性方程 $(A-E)x=0$，求得它的一个基础解系为 $\xi_1=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$，再单位化 $e_1=\begin{pmatrix}0\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$.

对于 $\lambda_1=2$，所对应的齐次线性方程 $(A-2E)x=0$，求得它的一个基础解系为 $\xi_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$.

对于 $\lambda_1=5$，所对应的齐次线性方程 $(A-5E)x=0$，求得它的一个基础解系为 $\xi_3=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$，

微信公众号：农大球知道

再单位化 $e_3=\begin{pmatrix}0\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$. 故正交矩阵为： $P=\begin{pmatrix}0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$.

八、（本题满分 8 分）

设 $A=aE+bB$, E 是 n 阶单位矩阵, B 是元素全为 1 的 n 阶矩阵, 其中 $a\neq 0, b\neq 0$.

判断矩阵 A 是否可以对角化并说明理由？如果可以对角化，求出一个可逆矩 P,

使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

证明 因为 $A^T=A$，所以 A 是对称矩阵。于是 A 可以对角化。

微信公众号：农大球知道

又因为 $B=\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}$ 所以 $R(B)=1$ 和 B 的特征值为 $n,0,\cdots,0$.

于是 A 的特征值为 $a+bn,a,\cdots,a$.

当 $\lambda=a+bn$, $b(B-nE)=b\begin{pmatrix}1-n & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1-n & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1-n\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1-n\\ 0 & 1 & 0\cdots & -1\\ \vdots & \vdots & 1\cdots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}$

解得基础解系为 $\xi_1=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}$

当 $\lambda=a$, $A-aE=b\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 0 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}$，解得基础解系为

$\xi_2=\begin{pmatrix}-1\\ 1\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}$ $\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 1\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}$ $\cdots$ $\xi_n=\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 0\\ \vdots\\ 1\end{pmatrix}$

取 $P=\begin{pmatrix}0 & -1 & -1 & -1\\ 1 & 1 & 0 & 0\\ 1\mathrm{M} & \mathrm{MO} & 1\mathrm{M} & 0\mathrm{M}\\ 1 & 0 & \mathrm{L}\ 0 & 1\end{pmatrix}$**，那么** $P^{-1}AP$ **为对角阵.**

微信公众号：农大球知道