天津大学《高等数学》2021-2022学年第一学期期末试卷

（答案写在答题纸上，写在试题纸上无效）

一．填空题（前四题每题4分，第5题8分，满分24分）

1．函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{|x|(x-1)}$ 的全部间断点分别是　，它们的类型依次分别为_____；

2．已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+1}{x+1}-ax-b\right)=0$，则 $a=$，$b=$；

3．设 $y=\arctan f(x)$，其中 $f(x)$ 为可微函数，则微分 $\mathrm{d}y=$；

4．设 $f(x)=\begin{cases}ax+b, & x>1\\ x^3, & x\le 1\end{cases}$，若 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，则 $a=$，$b=$；

5．举出符合各题要求的一例，并将其填写在横线上：

（1）在 $x=0$ 处不连续，但当 $x\to 0$ 时，极限存在的函数有

（2）在 $x=0$ 处连续，但在 $x=0$ 时不可导的函数有

（3）在 $x=0$ 处导数为 0，但 $x=0$ 不为极值点的连续函数有

（4）属于“$\dfrac{0}{0}$”或“$\dfrac{\infty}{\infty}$”未定型，且存在有限极限，但极限不能用洛必达法则求得的有

二.单项选择题（每题4分，满分12分）

1．设 $f(x)$ 是单调增函数，$g(x)$ 是单调减函数，且复合函数 $f(f(x)),f(g(x))$，$g(f(x)),g(g(x))$ 都有意义，则下列函数组中全为单调减函数的是　　[ ]

(A) $f(f(x)),f(g(x))$　　(B) $g(f(x)),g(g(x))$

(C) $f(g(x)),g(f(x))$　　(D) $g(g(x)),f(f(x))$

2．当 $x\to 0$ 时，若 $y=\ln(1+x)-ax-bx^2$ 是比 x^2 更高阶的无穷小，则　[　]

微信公众号：天南情报站

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

(A) $a=1,b=\frac{1}{2}$ (B) $a=1,b=-\frac{1}{2}$ (C) $a=-1,b=\frac{1}{2}$ (D) $a=-1,b=-\frac{1}{2}$

3. 下面四个论述中正确的是 [ ]

(A)若 $x_n\geq 0(n=1,2,\cdots)$，且数列 $\{x_n\}$ 单调递减，则数列 $\{x_n\}$ 收敛，且其极限 $a>0$

(B)若 $x_n>0(n=1,2,\cdots)$，且数列 $\{x_n\}$ 收敛，则其极限 $a>0$

(C)若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\geq 0$，则 $x_n\geq 0(n=1,2,\cdots)$

(D)若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a>0$，则存在正整数 N，当 $n>N$ 时，都有 $x_n>\frac{a}{2}$。

三.计算题

1.（7分）计算 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{(1-\cos x)\ln(1+x)}$

2.（7分）计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x-2}{x+1}\right)^{2x-1}$

3.（7分）设 $\begin{cases}x=t+\arctan t\\ y=\ln(1+t^2)\end{cases}$，求 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=1}$，$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1}$.

4.（7分）设 $y=x^2e^{3x}$，求 $y^{(10)}(x)$.

5.（7分）设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2+y^2-ye^{xy}=2$ 所确定的隐函数，求曲线 $y=y(x)$ 在点 $(0,2)$ 处的切线方程.

6.（8分）设 $x_0=\sqrt{2},x_n=\sqrt{2}+\frac{x_{n-1}-1}{\sqrt{2}+x_{n-1}},(n=1,2,\cdots)$，证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并求极限.

7.（8分）证明：当 $x\geq 0$ 时，有

$$(1+x)^2(2\ln(1+x)-1)+1\geq 4x\arctan x-2\ln(1+x^2).$$

8.(7分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(0)=0$，试证：存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $\frac{3f(\xi)}{1-\xi}=f'(\xi)$

微信公众号 天南情报站

9．(6分) 设 $f_n(x)=\frac{1}{n+1}x-\arctan x$ (其中 n 为正整数)，

（1）证明：$f_n(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有唯一的零点，即存在唯一的 $x_n\in(0,+\infty)$，使 $f_n(x_n)=0$；

（2）计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}$.

微信公众号：天南情报站