大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

座位号 专业 学院 学号 姓名 线 封 密

（密封线内不答题）

诚信应考, 考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《线性代数与解析几何 》(B)试卷(18-19年度第1学期)

注意事项：1. 考前请将密封线内填写清楚;

2. 所有答案请直接答在试卷上;

3. 考试形式：闭卷;

4. 本试卷共 8 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟.

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									

得分 ____ 一、 (15分) 填空题.

1. 若n阶行列式D的值等于d, 若从第2列开始每一列加上它前面的一列，同时对第1列加上D的第n列, 则得到的行列式的值为 $\left(1+(-1)^{n-1}\right)d$

2. 设向量$\alpha=(1,1,1)', \beta=(1,\frac{1}{2},0)', A=\alpha\beta'$, 则$A^4=$ ____ $\frac{27}{8}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{2}&0\\1&\frac{1}{2}&0\\1&\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}$

3. 设$f(x)=x^2-5x+3$为正整数, 矩阵$A=\begin{pmatrix}2&-1\\-3&3\end{pmatrix}$, 则$f(A)=$ ____ $\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$

4. 设矩阵$A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$, 则$A^k=$ ____ $\begin{pmatrix}1&k\\0&1\end{pmatrix}$

5. 设向量组$\alpha_1=(1,1,1)', \alpha_2=(1,2,3)', \alpha_3=(1,1,t)'$线性相关,则$t=$ ____ 1 ____.

得分 ____ 二、 (18分) 选择题:

1. 设n维向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$的秩为3,且满足$2\alpha_3-3\alpha_5=0, \alpha_2=2\alpha_4$, 则该向量组的一个极大线性无关组是(A).

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$ (B) $\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ (C) $\alpha_2,\alpha_4,\alpha_5$ (D) $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5$

2. 设A为$m\times n$矩阵,若线性方程组$Ax=0$有非零解, 则必有(B).

(A) $m<n$ (B) $r(A)<n$

(C) A 中有两列对应成比例 (D) A的行向量组线性相关.

3. 设$f(x)=\begin{vmatrix}x-2&x-1&x-2&x-3\\2x-2&2x-1&2x-2&2x-3\\3x-3&3x-2&4x-5&3x-5\\4x&4x-3&5x-7&4x-3\end{vmatrix}$, 则$f(x)=0$的根为(D)

微信公众号·五山情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(A) 0,1,2,3　　(B) $0,1,2$　　(C) $0,1,1,$　　(D) $0,1.$

4. 设A为一个3阶矩阵,将其第3行乘以5加到第1行, 相当于用一初等矩阵左乘A,这个初等矩阵是(D) .

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\5&0&1\end{pmatrix}$, (B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&5&1\end{pmatrix}$, (C) $\begin{pmatrix}1&5&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, (D) $\begin{pmatrix}1&0&5\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

5. 已知矩阵$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&t\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}5&5&5\\0&3&3\\0&0&1\end{pmatrix}$相似, 则$t=$(D).

(A) 0　　(B) 1　　(C) 3　　(D) 5.

6. 设有二次型$f(x_1,x_2,x_3)=kx_1^2+kx_2^2+k^2x_3^2+2kx_1x_2+2x_1x_3$, 当$k$为(D)时, 二次型$f$必是正定的.

(A) $k>1;$　　(B) $k^2>1;$　　(C) $k<0;$　　(D) k不存在.

得分	

三、(7分)计算n阶行列式:

$$D=\begin{vmatrix}7&5&0&\cdots&0&0\\2&7&5&\cdots&0&0\\0&2&7&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&7&5\\0&0&0&\cdots&2&7\end{vmatrix}.$$

$D_n=7D_{n-1}-10D_{n-2}$　　(+3分)

$D_n-2D_{n-1}=5(D_{n-1}-2D_{n-2})$

$=\cdots$

$=5^{n-2}(D_2-2D_1)=5^n$　　(+2分)

$D_n=2D_{n-1}+5^n$

$=2(2D_{n-2}+5^{n-1})+5^n=2^2D_{n-2}+2\cdot5^{n-1}+5^n$

$=\cdots$

$=2^{n-2}(2D_1+5^2)+2^{n-3}\cdot5^3+\cdots+2\cdot5^{n-1}+5^n$

$=\sum_{i=0}^{n}2^i\cdot5^{n-i}=\frac{5^{n+1}-2^{n+1}}{3}$　　(+2分)

微信公众号：五山情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得分	

四、 (15分) 求解下列非齐次线性方程组：

$$\begin{cases} x_1+x_2 & & -3x_4 & -x_5 & =1, \\ x_1-x_2 & +2x_3 & -x_4 & & =1, \\ 4x_1-2x_2 & +6x_3 & +3x_4 & -4x_5 & =4, \\ 2x_1+4x_2 & -2x_3 & +4x_4 & -7x_5 & =2. \end{cases}$$

$$\tilde{A}=\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 0 & 1 \\ 4 & -2 & 6 & 3 & -4 & 4 \\ 2 & 4 & -2 & 4 & -7 & 2 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & -\frac{7}{6} & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{5}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\begin{cases} x_1+x_3-\frac{7}{6}x_5=1 \\ x_2-x_3-\frac{5}{6}x_5=0 \\ x_4-\frac{1}{3}x_5=0 \end{cases}$$

$$\text{得}\begin{cases} x_1=-k_1+\frac{7}{6}k_2+1 \\ x_2=k_1+\frac{5}{6}k_2 \\ x_3=k_1 \\ x_4=\frac{1}{3}k_2 \\ x_5=k_2 \end{cases}$$

$$\text{通解：}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix} \frac{7}{6} \\ \frac{5}{6} \\ 0 \\ \frac{1}{3} \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad k_1,k_2\text{是任意常数}$$

微信公众号：五山情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得分 | | 五、 (15 分) 在$\mathbb{R}^3$中, 求向量$\alpha = (3,7,1)$关于基$\alpha_1 = (1,3,5)$, $\alpha_2 = (6,3,2)$, $\alpha_3 = (3,1,0)$的坐标.

设α 的坐标为(x_1, x_2, x_3),

则有 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \alpha$ （+5分）

$$\left(\alpha_1^T \quad \alpha_2^T \quad \alpha_3^T \mid \alpha^T\right) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 6 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 1 & 7 \\ 5 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right)$$ （+3分）

$$\xrightarrow{\text{若干初等行变换}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 33 \\ 0 & 1 & 0 & -82 \\ 0 & 0 & 1 & 154 \end{array}\right)$$

坐标$(x_1, x_2, x_3) = (33, -82, 154)$ （+7分）

微信公众号·五山情报站

得分 | | 六、 (9分) 求过直线$\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$, 且平行于直线$\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}$的平面方程.

设所求平面的法向量为$\vec{n}$,

则 $\vec{n}$ ⊥向量$(2,1,-1)$, $\vec{n}$ ⊥向量$(2,1,-2)$

$$\vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -i + 2j$$ （+5分）

点$(1,0,0)$在所求平面上。

所求平面: $-(x-1) + 2y = 0$

即: $x - 2y - 1 = 0$ （+4分）

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得分	

七、 (15 分) 设$A=\begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$,

(1) 求A的特征值、特征向量;

(2) 求正交矩阵T, 使得$T^{-1}AT$为对角形.

(1)

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda-4 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & \lambda-4 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & \lambda-4 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & \lambda-4 \end{vmatrix}=(\lambda-3)^3(\lambda-7)$$ （+5分）

A的特征值为：$\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=3,\quad \lambda_4=7$

齐次线性方程组$(3E-A)X=0$的一个基础解系为：

$\alpha_1=(1,\ 1,\ 0,\ 0)^T,\alpha_2=(-1,\ 0,\ 1,\ 0)^T,\alpha_3=(-1,\ 0,\ 0,\ 1)^T$

A的特征值3的特征向量为：$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$(其中$k_1,\ k_2,\ k_3$不全为0)

齐次线性方程组$(7E-A)X=0$的一个基础解系为：

$\alpha_4=(-1,\ 1,\ 1,\ -1)^T$

A的特征值3的特征向量为：$k_4\alpha_4$(其中k_4不为0) (+5分)

微信公众号·五山情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(2)由于$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$不正交，对它们做斯密特正交化并单位化

得：$\beta_1=(\frac{\sqrt{2}}{2},\ \frac{\sqrt{2}}{2},\ 0,\ 0)^T,\beta_2=(\frac{\sqrt{6}}{6},\ -\frac{\sqrt{6}}{6},\ \frac{\sqrt{6}}{3},\ 0)^T,$

$\beta_3=(-\frac{\sqrt{3}}{6},\ \frac{\sqrt{3}}{6},\ \frac{\sqrt{3}}{6},\ \frac{\sqrt{3}}{2})^T$

对α_4单位化得：$\beta_4=\frac{\alpha_4}{|\alpha_4|}=(-\frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{2},\ -\frac{1}{2})^T$

$$T=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{1}{2}\\ \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{2}\\ 0 & \frac{\sqrt{6}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2}\end{pmatrix},\quad T^{-1}AT=diag(3,3,3,7).$$ （+5分）

微信公众号：五山情报站

得分 | | 八、(6分) 设A为一个具有n重特征值a的$n\times n$矩阵,证明: A可以对角化的充分必要条件是$A=aE$.

充分性

若$A=aE$, 则 A 是对角矩阵，显然，A可以对角化.

必要性

若A 可对角化，由于A有n个特征值 a ,则存在可逆矩阵 P，使得

$P^{-1}AP=aE$

$A=P\cdot aE\cdot P^{-1}=aP\cdot P^{-1}=aE$

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】