

# class04

Xueran Zou

## Simple Calculations

```
2+2
```

```
[1] 4
```

```
3^2
```

```
[1] 9
```

```
sqrt(25)
```

```
[1] 5
```

```
2*(1+1)
```

```
[1] 4
```

```
2*1+1
```

```
[1] 3
```

```
exp(1)
```

```
[1] 2.718282
```


```
log(2.718282)
```

```
[1] 1
```


```
log(10, base=10)
```

```
[1] 1
```

```
x=1:50  
plot(x, sin(x))
```



```
plot(x, sin(x), typ="l", col="blue", lwd=3, xlab="x=1:50")
```



## Object Assignment

```
x <- 3*4  
x
```

```
[1] 12
```

```
r_rocks <- 2^3  
r_rocks
```

```
[1] 8
```

## Calling Functions

```
seq(1,10)
```

```
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

```
seq(1,10, by=2)
```

```
[1] 1 3 5 7 9
```

```
example(seq)
```

```
seq> seq(0, 1, length.out = 11)
[1] 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
```

```
seq> seq(stats::rnorm(20)) # effectively 'along'
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
```

```
seq> seq(1, 9, by = 2)      # matches 'end'
[1] 1 3 5 7 9
```

```
seq> seq(1, 9, by = pi)    # stays below 'end'
[1] 1.000000 4.141593 7.283185
```

```
seq> seq(1, 6, by = 3)
[1] 1 4
```

```
seq> seq(1.575, 5.125, by = 0.05)
[1] 1.575 1.625 1.675 1.725 1.775 1.825 1.875 1.925 1.975 2.025 2.075 2.125
[13] 2.175 2.225 2.275 2.325 2.375 2.425 2.475 2.525 2.575 2.625 2.675 2.725
[25] 2.775 2.825 2.875 2.925 2.975 3.025 3.075 3.125 3.175 3.225 3.275 3.325
[37] 3.375 3.425 3.475 3.525 3.575 3.625 3.675 3.725 3.775 3.825 3.875 3.925
[49] 3.975 4.025 4.075 4.125 4.175 4.225 4.275 4.325 4.375 4.425 4.475 4.525
[61] 4.575 4.625 4.675 4.725 4.775 4.825 4.875 4.925 4.975 5.025 5.075 5.125
```

```
seq> seq(17) # same as 1:17, or even better seq_len(17)
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
```

```
# Some functions don't require arguments
date()
```

```
[1] "Wed May 10 00:35:37 2023"
```

## Getting Help In R

```
# help(function)
# ?function
# example(function)
```

## Vectors, Vectorization, and Indexing

```
length(3.1)
```

```
[1] 1
```

Create longer vectors.

```
y <- c(56, 95.3, 0.4)
y
```

```
[1] 56.0 95.3 0.4
```

```
z <- c(3.2, 1.1, 0.2)
z
```

```
[1] 3.2 1.1 0.2
```

All elements of a vector must be the same type.

```
dbl_var <- c(1, 2.5, 4.5)
dbl_var
```

```
[1] 1.0 2.5 4.5
```

```
log_var <- c(TRUE, FALSE, T, F)
log_var
```

```
[1] TRUE FALSE TRUE FALSE
```

```
chr_var <- c("these are", "some", "strings")
chr_var
```

```
[1] "these are" "some"      "strings"
```

When you attempt to combine different types they will be coerced to be the most flexible type.

```
var <- c(1, "G", "4", 0.05, TRUE)
var
```

```
[1] "1"      "G"      "4"      "0.05"   "TRUE"
```

Name a vector

```
m <- c(a=1, b=2, c=3)
m
```

```
a b c
1 2 3
```

```
m <- 1:3
names(m) <- c("a", "b", "c")
m[c("b", "a")]
```

```
b a
2 1
```

Vectorization

```
y+z
```

```
[1] 59.2 96.4 0.6
```

```
y-z
```

```
[1] 52.8 94.2 0.2
```

```
y/z
```

```
[1] 17.50000 86.63636 2.00000
```

```
sqrt(y)
```

```
[1] 7.4833148 9.7621719 0.6324555
```

```
round(sqrt(y), 3)
```

```
[1] 7.483 9.762 0.632
```

```
log(y)/2 + 1
```

```
[1] 3.0126758 3.2785149 0.5418546
```

Vector Indexing

```
y <- c(56, 95.3, 0.4)
```

```
y[2]
```

```
[1] 95.3
```

```
y[1]
```

```
[1] 56
```

```
y[4]
```

```
[1] NA
```

```
y[3]<-0.5
y
```

```
[1] 56.0 95.3 0.5
```

## Data Frame

Create with the function `data.frame()`

```
dat <- data.frame(id=letters[1:10], x=1:10, y=11:20)
```

Read delimited files with the functions `read.csv()`, `read.table()`, `read_xlsx()`

```
df <- read.csv("https://tinyurl.com/UK-foods")

# Show first 6 rows
head(df)
```

	X	England	Wales	Scotland	N.Ireland
1	Cheese	105	103	103	66
2	Carcass_meat	245	227	242	267
3	Other_meat	685	803	750	586
4	Fish	147	160	122	93
5	Fats_and_oils	193	235	184	209
6	Sugars	156	175	147	139

```
# Show last 6 rows
tail(df)
```

	X	England	Wales	Scotland	N.Ireland
12	Fresh_fruit	1102	1137	957	674
13	Cereals	1472	1582	1462	1494
14	Beverages	57	73	53	47
15	Soft_drinks	1374	1256	1572	1506
16	Alcoholic_drinks	375	475	458	135
17	Confectionery	54	64	62	41

```
dim(df)
```



```
[1] 17 5
```

```
nrow(df)
```

```
[1] 17
```

```
ncol(df)
```

```
[1] 5
```

```
rownames(df)
```

```
[1] "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13" "14" "15"  
[16] "16" "17"
```

```
colnames(df)
```

```
[1] "X" "England" "Wales" "Scotland" "N.Ireland"
```

```
str(df)
```

```
'data.frame': 17 obs. of 5 variables:  
 $ X : chr "Cheese" "Carcass_meat " "Other_meat " "Fish" ...  
 $ England : int 105 245 685 147 193 156 720 253 488 198 ...  
 $ Wales : int 103 227 803 160 235 175 874 265 570 203 ...  
 $ Scotland : int 103 242 750 122 184 147 566 171 418 220 ...  
 $ N.Ireland: int 66 267 586 93 209 139 1033 143 355 187 ...
```