KAKO V LaTeXU PIŠEMO MATEMATIČNE SIMBOLE, ENAČBE IN DIAGRAME

ANDREJ BAUER AND BATMAN

Povzetek. V članku predstavimo, kako v LaTeXu z uporabo paketov AMS stavimo matematiko.

1. Osnovna matematika

Pravilno: za vsak realen pozitiven x obstaja $k \in \mathbb{N}$, da je $0 < 1/k < x$.

Narobe: za vsak realen pozitiven x obstaja $k \in \mathbb{N}$, da je $0 < 1/k < x$.

Pravilno: za nenegativna števila $x_1, \ldots, x_n$ velja

$$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{n}},$$

kjer enakost velja natanko tedaj, ko $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

Narobe: za nenegativna števila $x_1, \ldots, x_n$ velja

$$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \leq \sqrt{\frac{x_1^2 + \cdots + x_n^2}{n}}$$

kjer enakost velja natanko tedaj, ko $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

Za spiske raznih operatorjev in simbolov, ki jih lahko stavimo, glejte dokumentacijo na spletu.

Če želimo vstaviti v formulo besedilo, to naredimo s `\text{...}`:

$$\mathcal{P} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ je praštevilo}\}.$$

Omenimo še okolje cases, s katerim obravnavamo primere:

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{če } x < 1, \\ x & \text{če } -1 \leq x \leq 1, \\ 1 & \text{če } 1 < x. \end{cases}$$

2. Makroji

V LaTeXu lahko definiramo svoje ukaze, ki jim pravimo tudi *makroji*. Tu predstavimo osnovno uporabo. Ukaz definiramo z

`\newcommand{\imeUkaza}[n]{...}`

pri čemer je n število argumentov, ki jih sprejme ukaz. Na argumente se sklicujemo z `#1`, `#2`, ..., `#n`. Ukaz brez argumentov definiramo z

`\newcommand{\imeUkaza}{...}`

Avtor se zahvaljuje Republiki Sloveniji za vsakdanji kruh.

Ali je res, da za vsak $n \in \mathbb{N}$ in $a \in \mathbb{R}$ obstaja natanko en $b \in \mathbb{R}$, da je $b^n = a$?

Ali se urejeni pari pišejo (x, y) ali $\langle x, y \rangle$? Kdo bi vedel. Je pa tako, da se splača uporabiti makro, ker lahko kasneje še spreminjamo njegovo definicijo.

Ne počnimo neumnosti z makoroji: če seštejemo zaporedji $a_1, \ldots, a_n$ in $b_1, \ldots, b_n$, dobimo zaporedje $a + b_1, \ldots, a + b_n$.

Kaj pa dobimo, če napišemo $x_1, \ldots, x_{n+m}$?

3. Oklepaji

Poznamo več vrst oklepajev: (in), [in], { in }, $\langle$ in $\rangle$.

Še posebej opozorimo na $\langle$ in $\rangle$. Prav se piše $\langle x, y \rangle$ in ne $< x, y >$, ker LaTeX obravnava simbola < in > kot relaciji 'večje' in 'manjše'.

Včasih so oklepaji premahjni, denimo

$$(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

V takih primerih pred uklepaj napišemo `\left` in pred zaklepaj `\right`:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

Velikost oklepajev lahko nadzorujemo tudi ročno z ukazi `\big`, `\Big`, `\bigg`, `\Bigg`:

$$\bigg(\Big(\big((())\big)\Big)\bigg)$$

4. Poravnane in večvrstične enačbe

Paket amsmath vsebuje okolja za prikaz raznih enačb. Če uporabimo okolje brez zvezdice, na primer `equation`, dobimo oštevilčeno enačbo, okolje z zvezdico, na primer `equation*`, pa nam da neoštevilčeno enačbo. Vedno oštevilčimo samo tiste enačbe, na katere se tudi sklicujemo.

4.1. **Okolje** `equation`**.** Običajne enačbe naredimo z okoljem `equation`,

$$x^2 + y^2 = 1$$

ali

$$x^2 + y^2 = 1 \tag{1}$$

4.2. **Okolje** `gather`**.** Z okoljem `gather` stavimo izraze enega pod drugega:

$$\log 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots,$$
$$\frac{2}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}} \leq \sqrt{xy} \leq \frac{x + y}{2},$$
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Narobe je

$$\log 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

$$\frac{2}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}} \leq \sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

4.3. **Okolje** `multline`**.** Z okoljem `multtline` zapišemo daljšo izpeljavo čez več vrstic. Prva vrstica je poravnana levo, zadnja desno in vsem vmesne sredinsko:

$$\begin{multline}
\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)^2 = \\
\frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{n} y_i^2 + \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \cdot \sum_{j=1}^{n} x_j y_j = \\
\frac{1}{2} \cdot \sum_{i,j=1}^{2} x_i^2 y_j^2 + \frac{1}{2} \cdot \sum_{i,j=1}^{n} x_j^2 y_i^2 - \sum_{i,j=1}^{n} x_i y_j x_j y_i = \\
\sum_{i,j=1}^{n} \frac{1}{2} \left(x_i^2 y_j^2 + x_j^2 x_i^2 - 2 x_i y_j x_j y_i\right) = \sum_{i,j=1}^{n} \frac{1}{2} \left(x_i y_j - x_j y_i\right)^2 \geq 0.
\end{multline}$$

4.4. **Okolje** `align`**.** Z okoljem `align` lahko poravnamo vrstice na določen znaku. Mesto, kjer morajo biti vrstice poravnane, označimo z znakom `&`, prehod v novo vrsto označimo z `\\`:

$$\begin{aligned}
(x+y)^2 - (x-y)^2 &= (x^2 + 2xy + y^2) - (x^2 - 2xy + y^2) \\
&= x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 2xy - y^2 \\
&= 2xy + 2xy \\
&= 4xy.
\end{aligned}$$

Pozor: začetniki ga pogosto napačno postavijo tudi v zadnjo vrsto in potem dobijo dodatno prazno vrsto:

$$\begin{aligned}
(x+y)^2 - (x-y)^2 &= (x^2 + 2xy + y^2) - (x^2 - 2xy + y^2) \\
&= x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 2xy - y^2 \\
&= 2xy + 2xy \\
&= 4xy.
\end{aligned}$$

Ali vidite, da je nekaj narobe? Z ukazom `\intertext` vstavimo vrstico besedila v izpeljavo, ne da bi pokvarili poravnavno:

$$(x+y)^2 - (x-y)^2 = (x^2 + 2xy + y^2) - (x^2 - 2xy + y^2)$$

in zato

$$\begin{aligned}
&= x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 2xy - y^2 \\
&= 2xy + 2xy \\
&= 4xy.
\end{aligned}$$

Narobe je

$$(x+y)^2 - (x-y)^2 = (x^2 + 2xy + y^2) - (x^2 - 2xy + y^2)$$

in zato

$$\begin{aligned} &= x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 2xy - y^2 \\ &= 2xy + 2xy \\ &= 4xy, \end{aligned}$$

saj smo izgubili poravnavo med obema deloma izpeljave.

Z okoljem `align` lahko poravnamo več stolpcev, ki jih ločimo z znakom `&`:

$$\begin{aligned} 3+5 &= 8 & 2+2 &= 4 & 1+1 &= 2 \\ 3+7 &= 10 & 4+1 &= 5 & 2+3 &= 5 \end{aligned}$$

4.5. **Matrike.** Matriko naredimo z okoljem `matrix`:[1]

$$\begin{bmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \cdots & x_{1,n} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \cdots & x_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n,1} & x_{n,2} & \cdots & x_{n,n} \end{bmatrix}$$

Oklepaje postavimo okoli matrike z `\left` in `\right`, da so pravilne velikosti.

5. Izreki in dokazi

Izrek 5.1. *Vsaka zvezna funkcija na zaprtem intervalu doseže maksimum.*

Dokaz. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse aliquet arcu sit amet augue consequat efficitur. Nam non diam congue, porttitor nisl nec, faucibus ex. Fusce arcu ligula, molestie sit amet ligula sed, finibus sagittis felis. Nulla facilisi. Suspendisse potenti

$$f(x) = \int_0^x f'(t)\,dt,$$

donec ultrices malesuada bibendum. Quisque ac rutrum orci. Aliquam laoreet euismod nulla fermentum fringilla. Fusce bibendum dui enim, sed luctus diam lacinia sit amet. Fusce suscipit sodales vulputate. Suspendisse euismod ante est, ut fermentum mi consequat vitae. Sed vehicula, odio quis aliquam tincidunt, massa dolor tristique ligula, tempus egestas libero sem ac leo. □

Posledica . *Parbola ima maksimum na zaprtem intervalu.*

Dokaz. To sledi iz računa

$$\begin{aligned} (x+y)^2 - (x-y)^2 &= (x^2 + 2xy + y^2) - (x^2 - 2xy + y^2) \\ &= x^2 + 2xy + y^2 - x^2 + 2xy - y^2 \\ &= 2xy + 2xy \\ &= 4xy. \end{aligned}$$

□

[1] Tu imamo izjemo, ko je pisanje ločila na koneč izraza nesmiselno.

Definicija . *Praštevilo* je tako naravno število n, večje od 1, ki ni deljivo z nobenim naravnih šetvilom.

Vaja . Na pamet izračunajte 23×117.

6. Diagrami

O diagramih ne bomo povedali več kot to, da uporabimo paket `xypic`. Primer diagrama:

7. Citati in reference

Z ukazom `label{`*oznaka*`}` naredimo oznako razdelka, izreka ali enačbe. Na tako oznako se lahko sklicujemo z ukazi `ref`, `pageref` in `eqref`.

V razdelku 2 na strani 1 smo spoznali makroje. Izrek 5.1 ni preveč zanimiv, a ga profesorji radi sprašujejo na magistrskem izpitu, enačba (1) pa sploh nepomembna.

Andrej Bauer, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
Email address: Andrej.Bauer@andrej.com

Batman, Batman cave, Under Wayne Manor, Gotham City, USA
Email address: batman@gotham.com