

# 练习

(第三章)

7. 已知向量组A:  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$  与向量组B:  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_t\}$  有相同的秩  
证明: 向量组A与向量组B等价.

8. 设有向量组A:  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$  及向量组B:

$$\{\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_s, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \dots + \alpha_s, \dots,$$

$$\beta_s = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{s-1}\} \quad (s > 1)$$

证明: 向量组A与B有相同的秩.

9. 设向量组 A:  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ ; B:  $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$ ;  
C:  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$  的秩分别为  $r_1, r_2, r_3$ .

证明:  $\max(r_1, r_2) \leq r_3 \leq r_1 + r_2$



10. 有三个向量  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关, 且  $\alpha_3$  不能被  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示, 证明  $\alpha_1, \alpha_2$  线性相关.

# 答案



7. 已知向量组A:  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$  与向量组B:  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_l\}$  有相同的秩

证明: 向量组A与向量组B等价.

证明: 分析, A是B的部分组, 所以A可由B线性表示,  
需证明B可以由A线性表示即可.

设  $R(A) = R(B) = r$ , 向量组A和B的极大无关组有  $r$  个向量,  
不妨设A的极大无关组为  $A_1: \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$ ,

由于向量组A<sub>1</sub>也是B的线性无关部分组,  
且  $R(B) = r$ , 所以它也是B的一个极大无关组.

所以B可以由向量组A<sub>1</sub>线性表示.

因此B可以由A线性表示.

所以, 向量组A与向量组B等价.

8. 设有向量组A:  $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$

$$\{\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_s, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \dots + \alpha_s, \dots, \beta_s = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{s-1}\} \quad (s > 1)$$

证明: 向量组A与B有相同的秩.

$$\begin{aligned} \text{证明: 构造矩阵 } D_1 &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \xrightarrow{c_1 + c_i \ (i=2,3,\dots,s)} \\ & \quad ((s-1)(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s), \beta_2, \dots, \beta_s) \\ & \xrightarrow[c_i - c_1 \ (i=2,\dots,s)]{c_1/(s-1)} ((\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s), -\alpha_2, \dots, -\alpha_s) \\ & \xrightarrow[(-1) \times c_i \ (i=2,\dots,s)]{c_1 + c_i \ (i=2,\dots,s)} (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = D_2 \end{aligned}$$

矩阵的初等变换不改变矩阵的秩, 所以  $R(D_1) = R(D_2)$

故向量组A与B有相同的秩.



另证：显然  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性表示.

$$\text{又 } \sum_{i=1}^s \beta_i = (s-1) \sum_{i=1}^s \alpha_i$$

$$\text{故 } \alpha_i = \frac{1}{s-1} \sum_{i=1}^s \beta_i - \beta_i \quad (i=1, 2, \dots, s)$$

即  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$  线性表示.

从而这两个向量组等价。再证明等价的向量组有相同的秩即可。

9. 设向量组  $A: \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$ ;  $B: \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$ ;  
 $C: \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\}$  的秩分别为  $r_1, r_2, r_3$ .

证明:  $\max(r_1, r_2) \leq r_3 \leq r_1 + r_2$

证明: 设向量组  $A, B, C$  的极大无关组依次为向量组  $A_1, B_1, C_1$ , 则它们依次含有  $r_1, r_2, r_3$  个向量.

由于向量组  $A_1$  中向量也是  $C$  中向量, 且线性无关  
向量组  $A_1$  可由向量组  $C$  的极大无关组  $C_1$  线性表出,  
因此  $r_1 \leq r_3$ , 同理  $r_2 \leq r_3$ .

$C_1$  中向量若是  $A$  中向量, 则可由  $A_1$  线性表出,  
否则是  $B$  中向量, 则可由  $B_1$  线性表出, 且线性无关  
向量组  $C_1$  可由向量组  $\{A_1, B_1\}$  线性表出, 因此  $r_3 \leq r_1 + r_2$

$$\therefore \max(r_1, r_2) \leq r_3 \leq r_1 + r_2$$



# 总结关于矩阵秩的几个结论

$$(1) R(A) \leq R(A, b), \quad R(A) \leq R\begin{pmatrix} A \\ b \end{pmatrix}$$

$$(2) R\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \leq R(A) + R(B)$$

根据上面  
例题可得

$$R(A, B) \leq R(A) + R(B)$$

特别的  $R\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = R(A) + R(B)$

原因：设A的列向量某极大无关组为  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r_A}$

设B的列向量某极大无关组为  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{r_B}$

则  $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \alpha_{r_A} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \beta_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \beta_2 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ \beta_{r_B} \end{pmatrix}$

线性无关，且  $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$  中每个列向量都可被它们线性表出。

$$(3) \quad R(A+B) \leq R(A) + R(B)$$

仿照上面  
例题可证

另外证法：设 $A, B$ 为 $m \times n$ 矩阵则

$$A+B = (A, B) \begin{pmatrix} E_n \\ E_n \end{pmatrix}$$

$$\therefore R(A+B) \leq R(A, B) \leq R(A) + R(B)$$

(4) 设矩阵 $A_{m \times n}$ 与 $B_{n \times p}$ 满足 $AB=O$ , 证明 $R(A)+R(B) \leq n$ .

【课本习题26，课上已证】



10. 有三个向量  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关, 且  $\alpha_3$  不能被  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示, 证明  $\alpha_1, \alpha_2$  线性相关.

证明: 由向量  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关知, 存在非全零的数  $k_1, k_2, k_3$  使得下式成立

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0 \quad (1)$$

若  $k_3 \neq 0$ , 则(1)化为  $\alpha_3 = -\frac{k_1}{k_3}\alpha_1 - \frac{k_2}{k_3}\alpha_2$

这与  $\alpha_3$  不能被  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示矛盾.

因此(1)式中必有  $k_3=0$ , 此时(1)化为

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0$$

且其中  $k_1, k_2$  非全零.

因此有:  $\alpha_1, \alpha_2$  线性相关. 另外可以用反证法.

- 证明：反正法

假设  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关，由于  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关，可得  $\alpha_3$  可被  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示，这与  $\alpha_3$  不能被  $\alpha_1, \alpha_2$  线性表示矛盾，故假设错误，即  $\alpha_1, \alpha_2$  线性相关。