2015 级信息类一元函数微分学

(1) 设
$$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{\sin x} = 1$$
,则当 $x\to 0$ 时,函数 $f(x)$ 与(C)是等价无穷小:

(A)
$$\ln(1-x)$$
; (B) $\sin |x|$; (C) $\sqrt{1+2x}-1$; (D) $1-\cos |x|$.

(2) 设
$$f(x) = |x \sin x| e^{\cos x}, x \in (-\infty, +\infty)$$
, 则函数 $f(x)$ 是(D):

(A) 有界函数; (B) 单调函数; (C) 周期函数; (D) 偶函数.

(3) 设
$$f(x)$$
 对任意 x 满足 $f(x+1) = af(x)$,且 $f'(0) = b$,其中 a,b 为非零常数,则

f(x)在x=1处(C):

(A) 不可导; (B) 可导,且
$$f'(1) = a$$
; (C) 可导,且 $f'(1) = ab$;

(D) 可导, 且
$$f'(1) = b'$$

解法一
$$f'(1) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(1 + \Delta x) - f(1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{af(\Delta x) - af(0)}{\Delta x} = af'(0) = ab.$$

解法二 设
$$f(x) = c \cdot a^x$$
, 则 $f'(1) = ac \ln a = af'(0) = ab$, 可排除选项 A,B,D.

(4) 设函数
$$f(x) = (\sin x) \sin \frac{1}{x}$$
 ,则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的(A):

(A) 可去间断点; (B) 跳跃间断点; (C) 无穷间断点; (D) 振荡间断点.

(5) 设
$$f(x)$$
 在 $x = 1$ 处有连续的导函数,又 $\lim_{x \to 1} \frac{f'(x)}{x-1} = 1$,则 $x = 1$ 是函数 $f(x)$ 的 (B),

(A) 驻点, 但不是极值点; (B) 驻点, 且是极小值点; (C) 驻点, 且是极大值点; (D) 以上答案都不正确

解法一
$$f'(1) = \lim_{x \to 1} \frac{f'(x)}{x-1} \lim_{x \to 1} (x-1) = 0.$$

$$f''(1) = \lim_{x \to 1} \frac{f'(x) - f'(1)}{x - 1} = 1 > 0.$$
 (此处不可用洛必达,因为没说 f 二阶可导)

所以选B.

解法二 设
$$f(x) = \frac{1}{2}(x-1)^2$$
,则 $\lim_{x\to 1} \frac{f'(x)}{x-1} = 1$,可排除选项 A,C,D.

二、填空题(每小题4分):

(1)
$$\lim_{x \to 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = 0$$

(2)
$$\lim_{x \to \infty} \frac{2x^2 + 1}{3x - 1} \sin \frac{1}{x + 1} = \frac{2}{3}$$

(3) 函数
$$y = \ln[\cos(\arctan x)]$$
, 则 $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{1+x^2}$

(4) 设曲线
$$y = ax^2 + bx$$
 在点(1,0)处的切线与直线 $y = x$ 平行,则 $a = 1, b = -1$

(5)
$$\mathcal{C}_{f(x)} = \begin{cases} (\cos x)^{1/x^2}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases} x = 0^{\text{DE}} x, \quad \mathcal{D}_{g(x)} = e^{-0.5}$$

三、求下列极限: (每小题5分)

(1)
$$\lim_{n \to \infty} (\sqrt{n+3\sqrt{n}} - \sqrt{n-\sqrt{n}}) = \lim_{n \to \infty} \frac{4\sqrt{n}}{\sqrt{n+3\sqrt{n}} + \sqrt{n-\sqrt{n}}}$$

$$= \lim_{n \to \infty} \frac{4}{\sqrt{1 + \frac{3}{\sqrt{n}} + \sqrt{1 - \frac{1}{\sqrt{n}}}}} = 2$$

(2)
$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}\right) = \lim_{x\to 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x \ln(1+x)} = \lim_{x\to 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{1 - \frac{1}{1+x}}{2x} = \frac{1}{2}$$

(3)
$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n^2]{n!}$$

四、求下列函数的导数(每小题5分):

(1)
$$\stackrel{\text{in}}{\boxtimes} y = (1 + x + x^2)^x, \stackrel{\text{in}}{\boxtimes} \frac{dy}{dx};$$

$$\frac{dy}{dx} = (e^{x \ln(1+x+x^2)})' = e^{x \ln(1+x+x^2)} (x \ln(1+x+x^2))'$$

$$= (1+x+x^2)^x \left(\frac{x+2x^2}{1+x+x^2} + \ln(1+x+x^2)\right)$$

(2) 设
$$y = y(x)$$
 是参数方程 $\left\{ x = ax \cos x \right\}$ 所确定的函数, $(a \neq 0)$,求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2};$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(at\sin t\cos t)'}{(at\cos t)'} = \frac{\sin t + t\cos t}{\cos t - t\sin t}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}$$

$$=\frac{\left(\frac{\sin t + t \cos t}{\cos t - t \sin t}\right)'}{(at \cos t)'} = \frac{(\sin t + t \cos t)'(\cos t - t \sin t) - (\sin t + t \cos t)(\cos t - t \sin t)'}{a(\cos t - t \sin t)^3}$$

$$=\frac{t^2+2}{a(\cos t-t\sin t)^3}$$

(3) 设
$$y = y(x)$$
 由方程 $y \sin x - \cos(x - y) = 3y$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$

$$\Re y' \sin x + y \cos x + (1 - y') \sin(x - y) = 3y'$$

$$y' = \frac{y\cos x + \sin(x - y)}{3 - \sin x + \sin(x - y)}$$

(4) 设
$$f(x) = x^2 \ln(1+x)$$
, 求 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的 2014 阶导数值.

$$f^{(2014)}(x) = C_{2014}^{0}x^{2}(\ln(1+x))^{(2014)} + C_{2014}^{1}(x^{2})'(\ln(1+x))^{(2013)} + C_{2014}^{2}(x^{2})''(\ln(1+x))^{(2012)}$$

$$f^{(2014)}(0) = -\frac{(2014)!}{2012}$$

五、证明下列不等式: (每小题6分)

(1)
$$\stackrel{\text{def}}{=} x > 0, \ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x};$$

$$f'(x) = 1 + \ln(1+x) - \frac{1}{1+x^2}$$

$$f''(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{2x}{(1+x^2)^2} > 0, x \ge 0$$

所以 f'(x) 在 $[0,+\infty)$ 严格单增,

所以f(x)在 $[0,+\infty)$ 严格单增,

$$f(x) > f(0) = 0,$$

$$\mathbb{II} \stackrel{\text{def}}{=} x > 0, \ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x}.$$

$$(2) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\pi}{2} > x > 0, \sin x + \tan x > 2x$$

$$f'(x) = \cos x + \sec^2 x - 2 = \frac{\cos^3 x + 1 - 2\cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x - \cos^2 x)}{\cos^2 x} > 0$$

所以 f(x) 在 $[0,\frac{\pi}{2})$ 严格单增,

$$f(x) > f(0) = 0,$$

$$\mathbb{II} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\pi}{2} > x > 0, \sin x + \tan x > 2x.$$

六、设函数 f(x) 在区间 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上连续,在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内可导,且 f(0)=0,

证: 存在
$$\xi \in (0, \frac{\pi}{2})$$
,使 $f'(\xi)\cos \xi - f(\xi)\sin \xi = 0$. (本题 7分)

证 令 $F(x) = f(x)\cos x$,对 F(x) 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上使用罗尔定理即可。

七、(6分)设f(x)在区间[a,b]上连续,在(a,b)内有二阶导数,且 $f'(\frac{a+b}{2})=0$,

证明: 存在
$$\xi \in (a,b)$$
, 使 $\frac{4}{(b-a)^2} |f(b)-f(a)| \le f''(\xi)|$

证明参见习题课讲义79页最后一行。80页9行等号后面两项应该相减。

证明 利用 Taylor 公式,
$$f(b) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f'(\frac{a+b}{2})}{1!}\left(\frac{b-a}{2}\right) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}\left(\frac{b-a}{2}\right)^2,$$
其中 $\xi_1 \in \left(\frac{a+b}{2}, b\right)$;
$$f(a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{f'(\frac{a+b}{2})}{1!}\left(\frac{a-b}{2}\right) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}\left(\frac{a-b}{2}\right)^2,$$
其中 $\xi_2 \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right)$;
因此
$$|f(b) - f(a)| = \left|\frac{f''(\xi_1)}{2!}\left(\frac{b-a}{2}\right)^2 + \frac{f''(\xi_2)}{2!}\left(\frac{a-b}{2}\right)^2\right| \leq \frac{(b-a)^2}{4}|f''(\xi)|,$$
其中 $|f''(\xi)| = \max\{|f''(\xi_1)|, |f''(\xi_2)|, |f''(\xi$

笔指的地方改成减号