

课程考核试题卷 (A 卷)

试卷编号_____

(2011 至 2012 学年 第 2 学期)

课程名称: 线性代数 A

考试时间: 110 分钟

课程代码: 7100059

试卷总分: 100 分

考试形式: 闭卷

学生自带普通计算器: 否

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	总分
得分													
评卷教师													

得分

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、 A 和 B 均为 n 阶矩阵, 且 $(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$, 则必有 ()

A. $A = E$; B. $B = E$; C. $A = B$; D. $AB = BA$.

2、设 A 是方阵, 如有矩阵关系式 $AB=AC$, 则必有 ()

A. $A = 0$ B. $B \neq C$ 时 $A=0$ C. $A \neq 0$ 时 $B=C$ D. $|A| \neq 0$ 时 $B=C$

3、设 A 是 $s \times n$ 矩阵, 则齐次线性方程组 $Ax=0$ 有非零解的充分必要条件是 ()

A. A 的行向量组线性无关 B. A 的列向量组线性无关
C. A 的行向量组线性相关 D. A 的列向量组线性相关

4、若 x_1 是方程 $AX=B$ 的解, x_2 是方程 $AX=O$ 的解, 则 () 是方程 $AX=B$ 的解 ($c \in R$)

A. $x_1 + cx_2$ B. $cx_1 + cx_2$ C. $cx_1 - cx_2$ D. $cx_1 + x_2$

5、设矩阵 A 的秩为 r , 则 A 中 ()

A. 所有 $r-1$ 阶子式都不为 0 B. 所有 $r-1$ 阶子式全为 0
C. 至少有一个 r 阶子式不等于 0 D. 所有 r 阶子式都不为 0

得分

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、已知向量 $\alpha = (1, 3, 2, 4)^T$ 与 $\beta = (k, -1, -3, 2k)^T$ 正交, 则 $k =$ _____.

2、 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} =$ _____.

3、设 3 阶矩阵 A 的行列式 $|A|=8$, 已知 A 有 2 个特征值 -1 和 4 , 则另一特征值为_____.

4、如果 X_1, X_2 都是方程 $A_{n \times n} X = O$ 的解, 且 $X_1 \neq X_2$, 则 $|A_{n \times n}| =$ _____;

5、设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (-1, 3, 0)^T, \alpha_3 = (1, 2, -1)^T$ 线性_____ (填相关或无关)

得分

三、(10 分) 计算行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$ 。

得分

四、(10 分) 已知 $f(x) = x^2 + 4x - 1$ ， $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ，求 $f(A)$ 。

得分

五、(10 分) 求齐次线性方程组 $\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 = 0 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$ 的一个基础解系及其

通解.

得分

六、(12 分) 判定二次型 $f = -x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 4x_2x_3$ 的正定性, 并求该二次型的秩。

得分

七、(10 分) 求向量组: $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -7 \\ -4 \end{bmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \\ 17 \\ 9 \end{bmatrix}$ 的秩及一

个极大线性无关组, 并将其余向量通过该极大线性无关组表示出来.

得分

八、(12 分) 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & x \end{bmatrix}$ 相似

(1) 求 x ;

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$ 。

得分

九、(6 分) 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 2 (二重), -4 , 求 $\left| \left(-\frac{1}{2} A^* \right)^{-1} \right|$ 。

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

评分标准: 选对得 3 分, 不选或选错得 0 分

1、D; 2、D; 3、D; 4、A; 5、C

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）：

评分标准：填对得 3 分，不填或填错得 0 分

1、24; 2、; $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 3、-2; 4、0; 5、无关

三、计算行列式（12 分）

1、原式 =40;10 分

四、（10 分）

解

$$A^2 = \begin{pmatrix} -3 & -4 & 0 \\ 4 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{.....4 分}$$

$$4A = \begin{pmatrix} 4 & -8 & 0 \\ 8 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{.....8 分}$$

$$f(A) = \begin{pmatrix} 0 & -12 & 0 \\ 12 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{.....10 分}$$

五、（12 分）

解：齐次线性方程组的系数矩阵 A 为：
$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 + 5x_4 = 0 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & 5 \\ -3 & 1 & 2 & -4 \\ -1 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 7 & -7 & -7 \\ 0 & -7 & 7 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \cdots 4 \text{ 分}$$

$$\text{一般解为: } \begin{cases} x_1 = x_3 - x_4 \\ x_2 = x_3 + x_4 \\ x_3 = x_3 \\ x_4 = x_4 \end{cases} \quad (x_3 \text{ 为自由未知量}) \quad \text{.....6 分}$$

故齐次线性方程组的通解为 $\mathbf{x} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (k_1, k_2 为常数)10 分

六、(12 分)

解：二次型对应的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{.....4 分}$$

$$|-1| = -1 < 0; \quad \text{.....2 分}$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3 < 0 \quad \text{.....2 分}$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{vmatrix} = -13 < 0 \quad \text{.....2 分}$$

所以矩阵的秩为 3，即二次型的秩为 3 2 分

七、(10 分)

解：向量组对应的矩阵为

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & 5 & 6 \\ -1 & 2 & -7 & 17 \\ -1 & -1 & -4 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{.....3 分}$$

所以矩阵的秩为 3 6 分

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为一组极大无关组 8 分

$$\alpha_3 = -5\alpha_1 + \alpha_2 \quad \text{.....10 分}$$

八、(8 分)

解：解：(1)、由于 A 与 B 相似，则 $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ 。因为 $\text{tr}(A) = 5$ ， $\text{tr}(B) = 3 + x$ ，

则 $x = 2$ 。4 分

(2)、因为 B 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 2$ ，所以 A 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 2$ 。

当 $\lambda_1 = 0$ 时，它对应的特征向量为 $a_1 = (1, -1, 0)^T$

当对于 $\lambda_2 = 3$ 时，它对应的特征向量为 $a_2 = (0, 0, 1)^T$

当 $\lambda_3 = 2$ 时，它对应的特征向量为 $a_3 = (1, 1, 0)^T$ 。

取 $P = (a_1, a_2, a_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 $P^{-1}AP = B$ 。 12 分

九、(6 分)

证明： $\left| \left(-\frac{1}{2}A^* \right)^{-1} \right| = -8 \left| (A^*)^{-1} \right| = -\frac{1}{2} =$ 6 分