矩阵理论课程作业

研-MATH6005-M05-矩阵理论〔2026〕第 5 次作业

第五次作业习题

作业提交截至: 2026 年 11 月 11 日凌晨 03:59.

问题一 斜坐标下的镜面反射.

在通常的直角坐标系中, 两个向量的内积就是对应坐标乘积的和. 如果改用一组不相互垂直的基, 直接这样计算就可能出错. 下面以镜面反射为例, 看看换一组基后, 变换的矩阵表示会有什么变化.

在通常的欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 取基 $\mathcal{B} = (b_1, b_2, b_3)$, 其中

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

记 $G=(b_i\cdot b_j)_{3\times 3}$. 对 $v=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix}$, 定义线性变换

$$Tx=x-2\frac{x\cdot v}{v\cdot v}\,v.$$

1. 求 G 以及 T 在基 $\mathcal{B}$ 下的矩阵 M, 即

$(Tb_1,Tb_2,Tb_3)=(b_1,b_2,b_3)M$.

2. 求伴随变换 T^* 在同一基下的矩阵 N, 并判断 T 是否为自伴变换. 比较 N 与 M^T.

3. 判断 T 是否为保距变换, 并判断 M 是否为正交矩阵. 解释这两个判断是否必须一致, 即, 保距变换在任意一组基下的表示矩阵是否一定是正交矩阵.

问题二 交替投影与数据校正.

一组数据需要满足两个条件. 我们轮流用正交投影调整数据, 每次让它满足其中一个条件. 但满足了一个条件, 可能又不满足另一个条件. 这样反复调整, 最后能否同时满足两个条件?

在通常的欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中, 设

$$U=\left\{\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}:x_3=0\right\},$$
$$W=\left\{\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}:x_1+x_2+x_3=0\right\}.$$

分别用 P,Q 表示向 U,W 的正交投影矩阵, 记 $C=PQ$.

从任意初值 $x^{(0)}=\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix}$ 出发, 每一轮先投影到 W, 再投影到 U, 即

$$x^{(m+1)}=Cx^{(m)}\qquad(m=0,1,2,\ldots).$$

1. 求 P,Q 以及 C, 并判断 C 是否为正交投影矩阵.

2. 求 $\mathrm{Im}\, C$ 和 $\mathrm{Ker}\, C$ 的各一组基及维数.

3. 求 $m \geq 1$ 时 $x^{(m)}$ 的表达式及其极限.

4. 证明该极限是 $x^{(0)}$ 在 $U \cap W$ 上的正交投影.

研-MATH6005-M05-矩阵理论

2026 年 11 月 5 日

助教: 张陈成　　2026 年 11 月 5 日发布