

卷积的反向传播

这篇文章我们讲解一下卷积的反向传播理论，我们会给相应的数学证明。卷积反向传播比普通的全连接层要复杂一些。刚开始接触卷积的对其反向传播会觉得很神秘，很难理解。本篇文章尽量用通俗的语言，并且尽量细致的讲解一下卷积的反向传播计算方法和原理。本文参考了知乎的一篇文章, CNN 卷积层反向传播(<https://zhuanlan.zhihu.com/p/40951745>)。在这篇文章上做了更为细致的说明，并且给出多通道情况下卷积的反向传播数学证明，而知乎这篇仅仅给出了单通道的反向传播证明。好了，让我们开始吧。

卷积前向传播算法过程：

我们再讲解反向传播理论之前，首先得了解卷积的前向过程是如何计算的。为了便于描述，我们给出一些数学表达符号。用 $X_{B \times H \times W \times C_{in}}$ 表示单通道的输入数据。其形状定义为(批量大小,高度,宽度,通道数)，用 (B, H, W, C_{in}) 来表示。卷积核用 $K_{k \times k \times C_{in} \times C_{out}}$ 表示。该符号表达的意思是卷积核高和宽大小为 k ，通道数和输入 X 一样都是 C_{in} ，输出通道数用 C_{out} 表示，即是卷积核的深度，步长 stride 设置为 1。输出为 $Y_{B \times (H-k+1) \times (W-k+1) \times C_{out}}$ 。我们首先考虑一种最简单的情况，即是 C_{in} 和 C_{out} 都是 1 的时候，然后我们再推广到多个输入和输出通道的情况。这样比较好理解一些。考虑 C_{in} 和 C_{out} 都是 1，说明我们处理的是个单通道的输入数据，并且卷积核的深度也是 1。我们将这种情况绘制成矩阵：

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} Conv \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix}$$

我们知道运算过程就是用卷积核根据步长 stride 在输入数据 X 上先左右滑动再上下滑动，用卷积核覆盖住的 X 上的元素和卷积核的元素按位相乘，即是以下表达式：

$$y_{11} = x_{11}k_{11} + x_{12}k_{12} + x_{21}k_{21} + x_{22}k_{22}$$

$$y_{12} = x_{12}k_{11} + x_{13}k_{12} + x_{22}k_{21} + x_{23}k_{22}$$

$$y_{21} = x_{21}k_{11} + x_{22}k_{12} + x_{31}k_{21} + x_{32}k_{22}$$

$$y_{22} = x_{22}k_{11} + x_{23}k_{12} + x_{32}k_{21} + x_{33}k_{22}$$

可以写成矩阵相乘的形式：

$$\begin{pmatrix} y_{11} \\ y_{12} \\ y_{21} \\ y_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{21} & x_{22} \\ x_{12} & x_{13} & x_{22} & x_{23} \\ x_{21} & x_{22} & x_{31} & x_{32} \\ x_{22} & x_{23} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k_{11} \\ k_{12} \\ k_{21} \\ k_{22} \end{pmatrix}$$

由上面给出的矩阵相乘，我们得到启发，其实卷积的前向运算本质上可以转换为矩阵乘

法运算的。如果是矩阵乘法的运算，那么和全连接层的计算方式就一致了。我们完全熟悉矩阵乘法形式的前向传播，是如何进行反向传播计算的。之前写的深度学习的反向传播的数

学推导已经详细说明了。 $\begin{pmatrix} k_{11} \\ k_{12} \\ k_{21} \\ k_{22} \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} y_{11} \\ y_{12} \\ y_{21} \\ y_{22} \end{pmatrix}$ 就是单通道卷积核 K 做一个 reshape(4,1)，输出结果

Y 做个 reshape(4,1)。就这个 $\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{21} & x_{22} \\ x_{12} & x_{13} & x_{22} & x_{23} \\ x_{21} & x_{22} & x_{31} & x_{32} \\ x_{22} & x_{23} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix}$ 麻烦一些。如果读者看过一些框架的源码，

或者一些书籍介绍卷积的内容，会把将输入 X 转换为 $\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{21} & x_{22} \\ x_{12} & x_{13} & x_{22} & x_{23} \\ x_{21} & x_{22} & x_{31} & x_{32} \\ x_{22} & x_{23} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix}$ 的过程称为

im2col (image to column)。其实就是把每次做卷积运算时，卷积窗口对应的 X 的元素给排

成一行，比方说第一个值 y_{11} ，它是卷积核 $\begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{12} & x_{13} \end{pmatrix}$ 按位乘得到的。我们把

$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{12} & x_{13} \end{pmatrix}$ 转换为 1 行，即 $(x_{11} \ x_{12} \ x_{21} \ x_{22})$ ，每行的大小是 $k \times k$ 。这样的一行和卷积

核转换成的列，进行点乘就是输入值了。依次类推，每个输出都是将卷积窗口中对应 X 的元素排成一行，和卷积核的列相乘。那么总共要计算的次数就是输出值的高 \times 宽， $(H - k + 1) \times (W - k + 1)$ 。

这是单通道的情况，下面我们考虑多个通道。其实道理也是一样的。我们将输入数据的形状设置为 $X_{3 \times 3 \times 3}$ ，高和宽以及通道数都设置为 3，卷积核设置为 $K_{2 \times 2 \times 3 \times 2}$ ，其深度设置为 2.其余保持不变。为了方便描述，我们给出具体的矩阵形式，请看如下表达式：

$$X_{3 \times 3}^{[1]} = \begin{pmatrix} x_{11}^{[1]} & x_{12}^{[1]} & x_{13}^{[1]} \\ x_{21}^{[1]} & x_{22}^{[1]} & x_{23}^{[1]} \\ x_{31}^{[1]} & x_{32}^{[1]} & x_{33}^{[1]} \end{pmatrix}$$

$$X_{3 \times 3}^{[2]} = \begin{pmatrix} x_{11}^{[2]} & x_{12}^{[2]} & x_{13}^{[2]} \\ x_{21}^{[2]} & x_{22}^{[2]} & x_{23}^{[2]} \\ x_{31}^{[2]} & x_{32}^{[2]} & x_{33}^{[2]} \end{pmatrix}$$

$$X_{3 \times 3}^{[3]} = \begin{pmatrix} x_{11}^{[3]} & x_{12}^{[3]} & x_{13}^{[3]} \\ x_{21}^{[3]} & x_{22}^{[3]} & x_{23}^{[3]} \\ x_{31}^{[3]} & x_{32}^{[3]} & x_{33}^{[3]} \end{pmatrix}$$

这里 $X_{3 \times 3}^{[1]}$ 表示输入数据中第一个通道代表的 9 个元素。以此类推， $X_{3 \times 3}^{[2]}$ 和 $X_{3 \times 3}^{[3]}$ 是第二个

和第三个通道对应的 9 个元素。我们再按照这个方式，对卷积核 $K_{2 \times 2 \times 3 \times 2}$ 做如下分解：

$$K_{2 \times 2}^{\{1\}[1]} = \begin{pmatrix} k_{11}^{\{1\}[1]} & k_{12}^{\{1\}[1]} \\ k_{21}^{\{1\}[1]} & k_{22}^{\{1\}[1]} \end{pmatrix} K_{2 \times 2}^{\{1\}[2]} = \begin{pmatrix} k_{11}^{\{1\}[2]} & k_{12}^{\{1\}[2]} \\ k_{21}^{\{1\}[2]} & k_{22}^{\{1\}[2]} \end{pmatrix} K_{2 \times 2}^{\{1\}[3]} = \begin{pmatrix} k_{11}^{\{1\}[3]} & k_{12}^{\{1\}[3]} \\ k_{21}^{\{1\}[3]} & k_{22}^{\{1\}[3]} \end{pmatrix}$$

$$K_{2 \times 2}^{\{2\}[1]} = \begin{pmatrix} k_{11}^{\{2\}[1]} & k_{12}^{\{2\}[1]} \\ k_{21}^{\{2\}[1]} & k_{22}^{\{2\}[1]} \end{pmatrix} K_{2 \times 2}^{\{2\}[2]} = \begin{pmatrix} k_{11}^{\{2\}[2]} & k_{12}^{\{2\}[2]} \\ k_{21}^{\{2\}[2]} & k_{22}^{\{2\}[2]} \end{pmatrix} K_{2 \times 2}^{\{2\}[3]} = \begin{pmatrix} k_{11}^{\{2\}[3]} & k_{12}^{\{2\}[3]} \\ k_{21}^{\{2\}[3]} & k_{22}^{\{2\}[3]} \end{pmatrix}$$

这里大括号里面的数字表示的是卷积核的深度，即 C_{out} ，中括号里的数字表示的是通道数，即 C_{in} 。这样 $K_{2 \times 2}^{\{1\}[1]}$ 就表示第一个深度为 1，第一通道的四个元素，然后以此类推。那么这种多通道的卷积计算是如何转换为矩阵相乘的形式呢。首先输出数据的形状是 $Y_{2 \times 2 \times 2}$ ，即高和宽还有通道数都是 2。我们依然是按照上面的方式把 $Y_{2 \times 2 \times 2}$ 按照通道分解一下：

$$Y_{2 \times 2}^{[1]} = \begin{pmatrix} y_{11}^{[1]} & y_{12}^{[1]} \\ y_{21}^{[1]} & y_{22}^{[1]} \end{pmatrix} Y_{2 \times 2}^{[2]} = \begin{pmatrix} y_{11}^{[2]} & y_{12}^{[2]} \\ y_{21}^{[2]} & y_{22}^{[2]} \end{pmatrix}$$

我们先来看下卷积的前向传播计算过程。我们把输出 Y 的每个元素计算表达式写出来：

$$Y_{2 \times 2}^{[1]} = X_{3 \times 3} \text{Conv} K_{2 \times 2}^{\{1\}} = X_{3 \times 3}^{[1]} \text{Conv} K_{2 \times 2}^{\{1\}[1]} + X_{3 \times 3}^{[2]} \text{Conv} K_{2 \times 2}^{\{1\}[2]} + X_{3 \times 3}^{[3]} \text{Conv} K_{2 \times 2}^{\{1\}[3]}$$

$$\begin{pmatrix} y_{11}^{[1]} & y_{12}^{[1]} \\ y_{21}^{[1]} & y_{22}^{[1]} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11}^{[1]} & x_{12}^{[1]} & x_{13}^{[1]} \\ x_{21}^{[1]} & x_{22}^{[1]} & x_{23}^{[1]} \\ x_{31}^{[1]} & x_{32}^{[1]} & x_{33}^{[1]} \end{pmatrix} \text{Conv} \begin{pmatrix} k_{11}^{\{1\}[1]} & k_{12}^{\{1\}[1]} \\ k_{21}^{\{1\}[1]} & k_{22}^{\{1\}[1]} \end{pmatrix} +$$

$$\begin{pmatrix} x_{11}^{[2]} & x_{12}^{[2]} & x_{13}^{[2]} \\ x_{21}^{[2]} & x_{22}^{[2]} & x_{23}^{[2]} \\ x_{31}^{[2]} & x_{32}^{[2]} & x_{33}^{[2]} \end{pmatrix} \text{Conv} \begin{pmatrix} k_{11}^{\{1\}[2]} & k_{12}^{\{1\}[2]} \\ k_{21}^{\{1\}[2]} & k_{22}^{\{1\}[2]} \end{pmatrix} +$$

$$\begin{pmatrix} x_{11}^{[3]} & x_{12}^{[3]} & x_{13}^{[3]} \\ x_{21}^{[3]} & x_{22}^{[3]} & x_{23}^{[3]} \\ x_{31}^{[3]} & x_{32}^{[3]} & x_{33}^{[3]} \end{pmatrix} \text{Conv} \begin{pmatrix} k_{11}^{\{1\}[3]} & k_{12}^{\{1\}[3]} \\ k_{21}^{\{1\}[3]} & k_{22}^{\{1\}[3]} \end{pmatrix}$$

$$y_{11}^{[1]} = \begin{pmatrix} x_{11}^{[1]} & x_{12}^{[1]} \\ x_{21}^{[1]} & x_{22}^{[1]} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} k_{11}^{\{1\}[1]} & k_{12}^{\{1\}[1]} \\ k_{21}^{\{1\}[1]} & k_{22}^{\{1\}[1]} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_{11}^{[2]} & x_{12}^{[2]} \\ x_{21}^{[2]} & x_{22}^{[2]} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} k_{11}^{\{1\}[2]} & k_{12}^{\{1\}[2]} \\ k_{21}^{\{1\}[2]} & k_{22}^{\{1\}[2]} \end{pmatrix} \\ + \begin{pmatrix} x_{11}^{[3]} & x_{12}^{[3]} \\ x_{21}^{[3]} & x_{22}^{[3]} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} k_{11}^{\{1\}[3]} & k_{12}^{\{1\}[3]} \\ k_{21}^{\{1\}[3]} & k_{22}^{\{1\}[4]} \end{pmatrix}$$

从 $y_{11}^{[1]}$ 的计算表达算式，结合之前说的单通道卷积如何转换成矩阵相乘的形式。我们可以得到多通道转换矩阵相乘的方法。取卷积核 $K_{k \times k \times C_{in}}$ 这一部分，在我们的例子里即是 $[K_{2 \times 2}^{\{1\}[1]}, K_{2 \times 2}^{\{1\}[2]}, K_{2 \times 2}^{\{1\}[3]}]$ 这些元素，将他们排成一行：

$$(k_{11}^{\{1\}[1]} \quad k_{12}^{\{1\}[1]} \quad k_{21}^{\{1\}[1]} \quad k_{22}^{\{1\}[1]} \quad k_{11}^{\{1\}[2]} \quad k_{12}^{\{1\}[2]} \quad k_{21}^{\{1\}[2]} \quad k_{22}^{\{1\}[2]} \quad k_{11}^{\{1\}[3]} \quad k_{12}^{\{1\}[3]} \quad k_{21}^{\{1\}[3]} \quad k_{22}^{\{1\}[3]})^T$$

然后取 $[K_{2 \times 2}^{\{1\}[1]}, K_{2 \times 2}^{\{1\}[2]}, K_{2 \times 2}^{\{1\}[3]}]$ 这部分对应的输入数据 X ，即 $\begin{pmatrix} x_{11}^{[1]} & x_{12}^{[1]} \\ x_{21}^{[1]} & x_{22}^{[1]} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_{11}^{[2]} & x_{12}^{[2]} \\ x_{21}^{[2]} & x_{22}^{[2]} \end{pmatrix},$

$\begin{pmatrix} x_{11}^{[3]} & x_{12}^{[3]} \\ x_{21}^{[3]} & x_{22}^{[3]} \end{pmatrix}$ ，将他们排成一行。即：

$$(x_{11}^{[1]} \quad x_{12}^{[1]} \quad x_{21}^{[1]} \quad x_{22}^{[1]} \quad x_{11}^{[2]} \quad x_{12}^{[2]} \quad x_{21}^{[2]} \quad x_{22}^{[2]} \quad x_{11}^{[3]} \quad x_{12}^{[3]} \quad x_{21}^{[3]} \quad x_{22}^{[3]})$$

用这一行和前面卷积组成的列按位乘，就得到输出元素了。每个输出值都是通过这种方式计算的出来的，就不一个一个举例了。所以我们总结到规律就是将卷积核做一次 reshape，从 $K_{k \times k \times C_{in} \times C_{out}}$ 变为 $K_{[k \times k \times C_{in}, C_{out}]}$ 。即变为一个二维矩阵。行数为 $k \times k \times C_{in}$ ，列数为 C_{out} 。输入数据 X ，通过 im2col 这个过程，将对应的和卷积核元素按位乘的数据排成行。整个 X 转换完后的形状是 $[B, (H - k + 1) \times (W - k + 1), k \times k \times C_{in}]$ 。这里 B 是批量数大小。然后将这两个矩阵做点乘：

$$Y_{[B, (H-k+1) \times (W-k+1), C_{out}]} = \text{im2col}(X)_{[B, (H-k+1) \times (W-k+1), k \times k \times C_{in}]} \cdot K_{[k \times k \times C_{in}, C_{out}]}$$

这样多通道的卷积前向传播的矩阵相乘形式就做出来了。最后我们给出im2col的实现过程，这里用 python 代码描述。

```
def im2col(X, ksize, stride):
    # X shape:[B, H, W, Cin]
    X_col = []

    #总共有(H - k + 1) × (W - k + 1)这个多次
    for h in range(0, X.shape[1] - ksize + 1, stride):
        for w in range(0, X.shape[2] - ksize + 1, stride):
            col = X[:, h:h + ksize, w:w + ksize, :].reshape([-1])
            X_col.append(col)

    #最终得到的 X_col 的 shape:[(H - k + 1) × (W - k + 1), B × k × k × Cin].
    #这个 shape 不是我们需要的，所以要进行调整
```

```

X_col = np.array(X_col)

#调整为[B, (H - k + 1) × (W - k + 1), k × k × Cin],
#交换轴向是要考虑数据在内存的存储顺序
X_col = X_col.reshape(X_col.shape[0], X_col.shape[0], -1).swapaxes(0, 1)
return X_col

```

卷积反向传播：

我们开始通过方向传播来计算梯度。我们用 L 来表示损失函数。我们需要求解的是 $\frac{\partial L}{\partial X}$, $\frac{\partial L}{\partial K}$ 以及 $\frac{\partial L}{\partial b}$ 。前面我们得到了将卷积前向传播转为矩阵相乘的计算公式。根据这个公式我们可以很容易求得 $\frac{\partial L}{\partial K}$ 以及 $\frac{\partial L}{\partial b}$ 。我们先将卷积的矩阵相乘关系式列出：

$$Y_{[B, (H-k+1) \times (W-k+1), C_{out}]} = \text{im2col}(X)_{[B, (H-k+1) \times (W-k+1), k \times k \times C_{in}]} \cdot K_{[k \times k \times C_{in}, C_{out}]}$$

我们设置当前层传递过来的误差为 $\frac{\partial L}{\partial Y}$ 。为了描述方便，我设置 $(B, H, W, K, C_{in}, C_{out})$ 的值为 $(1, 3, 3, 2, 3, 2)$ 。Stride 步长设置为 1。我们用将所有相关参数用矩阵和向量来表示。

$$\frac{\partial L}{\partial Y_{2 \times 2 \times 2}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial Y_{2 \times 2}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial Y_{2 \times 2}^{\{2\}}} \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial L}{\partial Y_{2 \times 2}^{\{1\}}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{1\}}} \\ \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{1\}}} \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial L}{\partial Y_{2 \times 2}^{\{2\}}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{2\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{2\}}} \\ \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{2\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{2\}}} \end{pmatrix}$$

$$K_{2 \times 2 \times 3 \times 2} = (K_{2 \times 2 \times 3}^{\{1\}} \quad K_{2 \times 2 \times 3}^{\{2\}})$$

$$K_{2 \times 2 \times 3}^{\{1\}} = (K_{2 \times 2}^{\{1\}[1]} \quad K_{2 \times 2}^{\{1\}[2]} \quad K_{2 \times 2}^{\{1\}[3]})$$

$$K_{2 \times 2 \times 3}^{\{2\}} = \begin{pmatrix} K_{2 \times 2}^{\{2\}[1]} & K_{2 \times 2}^{\{2\}[2]} & K_{2 \times 2}^{\{2\}[3]} \end{pmatrix}$$

$$K_{2 \times 2}^{\{1\}[1]} = \begin{pmatrix} k_{11}^{\{1\}[1]} & k_{12}^{\{1\}[1]} \\ k_{21}^{\{1\}[1]} & k_{22}^{\{1\}[1]} \end{pmatrix} K_{2 \times 2}^{\{1\}[2]} = \begin{pmatrix} k_{11}^{\{1\}[2]} & k_{12}^{\{1\}[2]} \\ k_{21}^{\{1\}[2]} & k_{22}^{\{1\}[2]} \end{pmatrix} K_{2 \times 2}^{\{1\}[3]} = \begin{pmatrix} k_{11}^{\{1\}[3]} & k_{12}^{\{1\}[3]} \\ k_{21}^{\{1\}[3]} & k_{22}^{\{1\}[3]} \end{pmatrix}$$

$$K_{2 \times 2}^{\{2\}[1]} = \begin{pmatrix} k_{11}^{\{2\}[1]} & k_{12}^{\{2\}[1]} \\ k_{21}^{\{2\}[1]} & k_{22}^{\{2\}[1]} \end{pmatrix} K_{2 \times 2}^{\{2\}[2]} = \begin{pmatrix} k_{11}^{\{2\}[2]} & k_{12}^{\{2\}[2]} \\ k_{21}^{\{2\}[2]} & k_{22}^{\{2\}[2]} \end{pmatrix} K_{2 \times 2}^{\{2\}[3]} = \begin{pmatrix} k_{11}^{\{2\}[3]} & k_{12}^{\{2\}[3]} \\ k_{21}^{\{2\}[3]} & k_{22}^{\{2\}[3]} \end{pmatrix}$$

$$X_{3 \times 3 \times 3} = \begin{pmatrix} X_{3 \times 3}^{[1]} & X_{3 \times 3}^{[2]} & X_{3 \times 3}^{[3]} \end{pmatrix}$$

$$X_{3 \times 3}^{[1]} = \begin{pmatrix} x_{11}^{[1]} & x_{12}^{[1]} & x_{13}^{[1]} \\ x_{21}^{[1]} & x_{22}^{[1]} & x_{23}^{[1]} \\ x_{31}^{[1]} & x_{32}^{[1]} & x_{33}^{[1]} \end{pmatrix}$$

$$X_{3 \times 3}^{[2]} = \begin{pmatrix} x_{11}^{[2]} & x_{12}^{[2]} & x_{13}^{[2]} \\ x_{21}^{[2]} & x_{22}^{[2]} & x_{23}^{[2]} \\ x_{31}^{[2]} & x_{32}^{[2]} & x_{33}^{[2]} \end{pmatrix}$$

$$X_{3 \times 3}^{[3]} = \begin{pmatrix} x_{11}^{[3]} & x_{12}^{[3]} & x_{13}^{[3]} \\ x_{21}^{[3]} & x_{22}^{[3]} & x_{23}^{[3]} \\ x_{31}^{[3]} & x_{32}^{[3]} & x_{33}^{[3]} \end{pmatrix}$$

我们将所有相关参数均用矩阵和向量方式表达出来了。接着我们就使用这些表达符号来进行反向传播的说明。我们先给出 $\frac{\partial L}{\partial K}$ 以及 $\frac{\partial L}{\partial b}$ 的求解公式。

$$\frac{\partial L}{\partial K} = \frac{\partial L}{\partial Y} \cdot (\text{im2col}(X))^T$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \text{sum}(\frac{\partial L}{\partial Y}, \text{axis} = 0) / B$$

这是根据 $Y_{[B, (H-k+1) \times (W-k+1), C_{out}]} = \text{im2col}(X)_{[B, (H-k+1) \times (W-k+1), k \times k \times C_{in}]} \cdot K_{[k \times k \times C_{in}, C_{out}]}$ 得到的，其实和全连接反向传播求导的方式没有区别。但是得到的 $\frac{\partial L}{\partial K}$ 的形状是 $(k \times k \times C_{out})$ ，我们做一次 reshape 操作，将形状转为 (k, k, C_{in}, C_{out}) 即可。 $\frac{\partial L}{\partial b}$ 的结果是因为，首先 $b.shape = (1, C_{out})$ 。 $\frac{\partial L}{\partial Y}.shape = ((H-k+1) \times (W-k+1), C_{out})$ ， Y 和 $\frac{\partial L}{\partial Y}$ 的形状是一致的。所以 b 是

通过广播机制将行扩展为 $(H - k + 1) \times (W - k + 1)$ 这么多，然后和 Y 相加得到的。最后反向传播的求导的时候， $\frac{\partial Y}{\partial b} = 1$ ，所以是按照行顺序将 $\frac{\partial L}{\partial Y}$ 相加，除以批量数 B ，求得平均值。

最后我们再看下 $\frac{\partial L}{\partial X}$ 。我们根据这个等式：

$$Y_{[B, (H-k+1) \times (W-k+1), C_{out}]} = \text{im2col}(X)_{[B, (H-k+1) \times (W-k+1), k \times k \times C_{in}]} \cdot K_{[k \times k \times C_{in}, C_{out}]}$$

可以得到 $\frac{\partial L}{\partial \text{im2col}(X)}$ ，但是将 $\frac{\partial L}{\partial \text{im2col}(X)}$ 还原到 $\frac{\partial L}{\partial X}$ ，是非常复杂艰难的，计算量非常大。所以

以我们需要给出另外一种计算方式。根据前向传播的计算过程和链式求导法则 $\frac{\partial L}{\partial X} = \frac{\partial L}{\partial Y} \cdot \frac{\partial Y}{\partial X}$ ，

我们可以写出 $\frac{\partial L}{\partial X}$ 的每个元素的表达式，我们列举 X 的第一个通道的相关导数。

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial x_{11}^{[1]}} &= 0 \times k_{22}^{\{1\}[1]} + 0 \times k_{21}^{\{1\}[1]} + 0 \times k_{12}^{\{1\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{1\}}} k_{11}^{\{1\}[1]} \\ &\quad + 0 \times k_{22}^{\{2\}[1]} + 0 \times k_{21}^{\{2\}[1]} + 0 \times k_{12}^{\{2\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{2\}}} k_{11}^{\{2\}[1]} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{12}^{[1]}} &= 0 \times k_{22}^{\{1\}[1]} + 0 \times k_{21}^{\{1\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{1\}}} k_{12}^{\{1\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{1\}}} k_{11}^{\{1\}[1]} \\ &\quad + 0 \times k_{22}^{\{2\}[1]} + 0 \times k_{21}^{\{2\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{2\}}} k_{12}^{\{2\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{2\}}} k_{11}^{\{2\}[1]} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{13}^{[1]}} &= 0 \times k_{22}^{\{1\}[1]} + 0 \times k_{21}^{\{1\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{1\}}} k_{12}^{\{1\}[1]} + 0 \times k_{11}^{\{1\}[1]} \\ &\quad + 0 \times k_{22}^{\{2\}[1]} + 0 \times k_{21}^{\{2\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{2\}}} k_{12}^{\{2\}[1]} + 0 \times k_{11}^{\{2\}[1]} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{21}^{[1]}} &= 0 \times k_{22}^{\{1\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{1\}}} k_{21}^{\{1\}[1]} + 0 \times k_{12}^{\{1\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{1\}}} \times k_{11}^{\{1\}[1]} \\ &\quad + 0 \times k_{22}^{\{2\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{2\}}} \times k_{21}^{\{2\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{2\}}} \times k_{12}^{\{2\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{2\}}} k_{11}^{\{2\}[1]} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{22}^{[1]}} &= \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{1\}}} k_{22}^{\{1\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{1\}}} k_{21}^{\{1\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{1\}}} k_{12}^{\{1\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{1\}}} \times k_{11}^{\{1\}[1]} \\ &\quad + \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{2\}}} k_{22}^{\{2\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{2\}}} k_{21}^{\{2\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{2\}}} k_{12}^{\{2\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{2\}}} k_{11}^{\{2\}[1]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial L}{\partial x_{23}^{[1]}} &= \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{1\}}} k_{22}^{\{1\}[1]} + 0 \times k_{21}^{\{1\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{1\}}} k_{12}^{\{1\}[1]} + 0 \times k_{11}^{\{1\}[1]} \\
&\quad + \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{2\}}} k_{22}^{\{2\}[1]} + 0 \times k_{21}^{\{2\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{2\}}} k_{12}^{\{2\}[1]} + 0 \times k_{11}^{\{2\}[1]} \\
\frac{\partial L}{\partial x_{31}^{[1]}} &= 0 \times k_{22}^{\{1\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{1\}}} k_{21}^{\{1\}[1]} + 0 \times k_{12}^{\{1\}[1]} + 0 \times k_{11}^{\{1\}[1]} \\
&\quad + 0 \times k_{22}^{\{2\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{2\}}} k_{21}^{\{2\}[1]} + 0 \times k_{12}^{\{2\}[1]} + 0 \times k_{11}^{\{2\}[1]} \\
\frac{\partial L}{\partial x_{32}^{[1]}} &= \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{1\}}} k_{22}^{\{1\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{1\}}} k_{21}^{\{1\}[1]} + 0 \times k_{12}^{\{1\}[1]} + 0 \times k_{11}^{\{1\}[1]} \\
&\quad + \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{2\}}} k_{22}^{\{2\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{2\}}} k_{21}^{\{2\}[1]} + \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{2\}}} k_{12}^{\{2\}[1]} + 0 \times k_{11}^{\{2\}[1]} \\
\frac{\partial L}{\partial x_{33}^{[1]}} &= \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{1\}}} k_{22}^{\{1\}[1]} + 0 \times k_{21}^{\{1\}[1]} + 0 \times k_{12}^{\{1\}[1]} + 0 \times k_{11}^{\{1\}[1]} \\
&\quad + \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{2\}}} k_{22}^{\{2\}[1]} + 0 \times k_{21}^{\{2\}[1]} + 0 \times k_{12}^{\{2\}[1]} + 0 \times k_{11}^{\{2\}[1]}
\end{aligned}$$

那么我们可以写成以下形式:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_{11}^{[1]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{12}^{[1]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{13}^{[1]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{21}^{[1]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{22}^{[1]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{23}^{[1]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{31}^{[1]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{32}^{[1]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{33}^{[1]}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{1\}}} & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{2\}}} \\ 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{1\}}} & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{2\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{2\}}} \\ 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{1\}}} & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{2\}}} & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{1\}}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{1\}}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{2\}}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{2\}}} \\ \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{2\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{2\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{2\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{2\}}} \\ \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{1\}}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{1\}}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{2\}}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{2\}}} & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{1\}}} & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{2\}}} & 0 & 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{1\}}} & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{2\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{2\}}} & 0 & 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{1\}}} & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{2\}}} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k_{22}^{\{1\}[1]} \\ k_{21}^{\{1\}[1]} \\ k_{12}^{\{1\}[1]} \\ k_{11}^{\{1\}[1]} \\ k_{22}^{\{2\}[1]} \\ k_{21}^{\{2\}[1]} \\ k_{12}^{\{2\}[1]} \\ k_{11}^{\{2\}[1]} \end{pmatrix}$$

这是一个通道的，同理，按照我们之前的推导过程。如果是多个通道，则有如下等式：

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_{11}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{11}^{[2]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{11}^{[3]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{12}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{12}^{[2]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{12}^{[3]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{13}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{13}^{[2]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{13}^{[3]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{21}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{21}^{[2]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{21}^{[3]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{22}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{22}^{[2]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{22}^{[3]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{23}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{23}^{[2]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{23}^{[3]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{31}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{31}^{[2]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{31}^{[3]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{32}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{32}^{[2]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{32}^{[3]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{33}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{33}^{[2]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{33}^{[3]}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{1\}}} & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{2\}}} \\ 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{1\}}} & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{2\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{2\}}} \\ 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{1\}}} & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{2\}}} & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{1\}}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{1\}}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{2\}}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{2\}}} \\ \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{2\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{2\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{2\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{2\}}} \\ \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{1\}}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{1\}}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{2\}}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{2\}}} & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{1\}}} & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{2\}}} & 0 & 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{1\}}} & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{2\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{2\}}} & 0 & 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{1\}}} & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{2\}}} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} k_{22}^{\{1\}[1]} & k_{22}^{\{1\}[2]} & k_{22}^{\{1\}[3]} \\ k_{21}^{\{1\}[1]} & k_{21}^{\{1\}[2]} & k_{21}^{\{1\}[3]} \\ k_{12}^{\{1\}[1]} & k_{12}^{\{1\}[2]} & k_{12}^{\{1\}[3]} \\ k_{11}^{\{1\}[1]} & k_{11}^{\{1\}[2]} & k_{11}^{\{1\}[3]} \\ k_{22}^{\{2\}[1]} & k_{22}^{\{2\}[2]} & k_{22}^{\{2\}[3]} \\ k_{21}^{\{2\}[1]} & k_{21}^{\{2\}[2]} & k_{21}^{\{2\}[3]} \\ k_{12}^{\{2\}[1]} & k_{12}^{\{2\}[2]} & k_{12}^{\{2\}[3]} \\ k_{11}^{\{2\}[1]} & k_{11}^{\{2\}[2]} & k_{11}^{\{2\}[3]} \end{pmatrix}$$

我们将这几个矩阵从左到右命名为 $\nabla X_{9 \times 3}$ 、 $\nabla Y_{9 \times 8}$ 、 $\nabla K_{8 \times 3}$ 。它们满足 $\nabla X = \nabla Y \cdot \nabla K$ 。

$$\Delta X^{[1]} = \begin{pmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_{11}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{12}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{13}^{[1]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{21}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{22}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{23}^{[1]}} \\ \frac{\partial L}{\partial x_{31}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{32}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial x_{33}^{[1]}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{\{1\}}} & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{\{1\}}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{\{1\}}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{Conv} \begin{pmatrix} k_{22}^{\{1\}[1]} & k_{21}^{\{1\}[1]} \\ k_{12}^{\{1\}[1]} & k_{11}^{\{1\}[1]} \end{pmatrix} +$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{[2]}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{[2]}} & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{[2]}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{[2]}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{Conv} \begin{pmatrix} k_{22}^{[2][1]} & k_{21}^{[2][1]} \\ k_{12}^{[2][1]} & k_{11}^{[2][1]} \end{pmatrix}$$

$\Delta X^{[2]}$ 和 $\Delta X^{[3]}$ 也是如此。就不再罗列出。从这个式子可以看到这是个卷积操作。

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{[1]}} & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{[1]}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{和} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{[2]}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{[2]}} & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{[2]}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{[2]}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{就是} \frac{\partial L}{\partial Y_{2 \times 2 \times 2}} \text{矩阵进行了填充 0 的操作。填充之后}$$

得到的矩阵和旋转 180 度后的卷积核 $K_{2 \times 2 \times 3 \times 2}$ 做卷积运算。得到的结果的高(H)和宽 W 就是原输入数据 $X_{3 \times 3 \times 3}$ 的高(H)和宽 W ，这里是 3。至于填充多少呢，设置填充大小 P ，卷积核大小为 k 。给出计算填充大小的公式：

$$OH = \frac{H + 2P - k}{S} + 1, OW = \frac{W + 2P - k}{S} + 1$$

这里的 OH 和 OW 是卷积后的输出大小，即是 $X_{3 \times 3 \times 3}$ 的高(H)和宽 W ，也就是 3。 H 和 W 就是 $\frac{\partial L}{\partial Y_{2 \times 2 \times 2}}$ 的高(H)和宽 W ，均是 2。 S 是步长，这里是 1。代入公式计算得到 $P = 1$ 。表示在四

周都填充一个单元。原来的 H 和 W 是 2，经过此填充变为 4。即是 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{[1]}} & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{[1]}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{[1]}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 和

$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{[2]}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{[2]}} & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{[2]}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{[2]}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。这里要注意的是此时的卷积核 $K_{2 \times 2 \times 3 \times 2}$ 不仅仅是旋转 180 度，而且它

的 C_{in} 和 C_{out} 发生了互换。从前面我们推导的式子不难发现这一点。那么这种操作和原先前向传播做卷积的操作，似乎是个逆操作。之前对输入数据 X 通过卷积核 $K_{[k,k,C_{in},C_{out}]}$ ，输出 Y 。

而现在我们实行的这个卷积是将 $\frac{\partial L}{\partial Y}$ 通过对卷积核旋转 180，再对 $K_{[k,k,C_{in},C_{out}]}$ 做轴变换，转换

成 $K_{[k,k,C_{out},C_{in}]}$ ，然后执行卷积操作输出 $\frac{\partial L}{\partial X}$ 。这里 C_{out}, C_{in} 发生了对换，所以对 C_{in} 组进行这个操作，每组有 $k \times k \times C_{out}$ 元素。

$$\text{而 } \nabla Y_{9 \times 8} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{(1)}} & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{(2)}} \\ 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{(1)}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{(1)}} & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{(2)}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{(2)}} \\ 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{(1)}} & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{(2)}} & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{(1)}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{(1)}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{(2)}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{(2)}} \\ \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{(1)}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{(1)}} & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{(1)}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{(1)}} & \frac{\partial L}{\partial y_{11}^{(2)}} & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{(2)}} & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{(2)}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{(2)}} \\ \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{(1)}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{(1)}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{12}^{(2)}} & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{(2)}} & 0 \\ 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{(1)}} & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{(2)}} & 0 & 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{(1)}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{(1)}} & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{21}^{(2)}} & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{(2)}} & 0 & 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{(1)}} & 0 & 0 & 0 & \frac{\partial L}{\partial y_{22}^{(2)}} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 就是 } \frac{\partial L}{\partial Y_{2 \times 2 \times 2}} \text{ 矩阵进行了}$$

填充 0，再执行im2col操作就可以得到。我们给出一个具体的公式：

$$\nabla Y = \text{im2col}(\text{Padding}(\frac{\partial L}{\partial Y}))$$

得到 ∇Y 后，再做之前将的卷积操作就得到了 ∇X 。此时 ∇X 的 shape 是 $[(\frac{H+2P-k}{s} + 1) \times (\frac{W+2P-k}{s} + 1), C_{in}]$ 。进行一下 reshape 调整为 $[(\frac{H+2P-k}{s} + 1, (\frac{W+2P-k}{s} + 1, C_{in})]$ 。问题就得到解决了。好了这就是卷积的反向传播过程。最后给出如何对卷积核旋转 180 度再调整 C_{in} 和 C_{out} 两个轴向的 python 代码：

```
#conv.weights 维度为:(k, k, Cin, Cout)
swap_weights = conv.weights.swapaxes(2,3) #调整Cin和Cout两个轴
re_weights = swap_weights.reshape(-1, swap_weights.shape[2], swap_weights.shape[3])
flip_weights = re_weights[::-1,...] #实现旋转 180 度的操作
flip_weights = flip_weights.reshape(-1, swap_weights.shape[3])
return flip_weights
```