微分方程 || 学习建议:

预备知识:实分析、泛函分析,不需要微分方程1。主要是以下内容:

实分析: 积分收敛定理、Holder/Young/Minkowski/Gronwall 不等式、卷积光滑子逼近、Lebesgue 微分定理。

泛函分析: Riesz 表示定理(及其推论 Lax-Milgram 定理)、紧算子的谱理论(Fredholm 二择一)、对称紧算子的谱、弱收敛的相关性质(见 Evans 附录 D)、Mazur 引理(第八章需要)。

参考书:没有、不需要。

顺序:

基本内容(普通班)

第五章(Sobolev 空间)**:** 5.1~5.7、5.8.1(Poincare 不等式)、5.8.3(W^{1,∞}=Lipschitz, 课本该定理证明出现大跳步,详见 2017 年微分方程 2 期中考试第三题)、5.9.1(H⁻¹空间)**;**

第六章 (二阶线性椭圆方程): 6.1、6.2 (存在性定理)、5.8.2 (差商极限逼近导数)、6.3 (正则性)、6.4 (极大值原理)、6.5.1 (对称椭圆算子的谱);

第七章 (线性发展方程): 7.1 (抛物方程弱解的 Galerkin 方法)、7.2.4 (双曲方程有限传播速度)。

用到泛函的地方:

- 5.7 需要弱收敛和紧算子定义(附录 D.4+D.5 的第一条定义)
- 6.2.2 需要 Lax-Milgram 定理(6.2.1 讲了, 需要 Hilbert 空间的 Riesz 表示定理结论)
- 6.2.3 需要附录 D.5(紧算子的谱 Fredholm 二择一, 真正用上的是 726 页最下方那个 Remark, 类似线性方程组存在唯一解/齐次方程有非零解二择一)
- 6.5.1 需要附录 D.6 (对称紧算子的谱,联想实对称方阵特征值的结论,一模一样)
- 7.1 节需要自反空间的 Banach-Alaoglu 定理(自反 Banach 空间中,有界序列必有弱收敛子列)

可以跳过的部分:

- 5.3.3 整体光滑逼近的证明(知道思路即可,先有限覆盖边界,然后用个大球盖里面);
- 5.4 的延拓定理证明;
- 5.5 的零迹定理证明(结论在第六章一个习题用到);
- 5.6.3 (高阶 Sobolev 不等式)的所有证明:
- **6.3、7.1** 的所有高阶正则性证明(数学归纳法即可)和边界正则性证明(边界附近进行局部 拉直,化成上半平面的情况)**:**

所有 Harnack 不等式证明;

7.2 节除了最后一个定理其它全部跳过 (全部照搬 7.1, 但须注意双曲方程正则性结果和抛物方程不一样)。

进阶内容:

我认为,微分方程 2 这门课的目的是让学生掌握接触现代 PDE 的语言和基本方法,课程本身并不涉及过难、过于专业的例子。但是,如果一整个学期都聚焦于第 5~7 章的线性方程理论的话,即使学到了这些内容,也不知道如何能够将它们应用到实际的 PDE 问题中。所以,我们理应在课上接触更多的例子。若以 Evans 的书为为教材的话,可以抽出第 7~12 章的少部分内容进行教学。

1、粘性法: 7.3 节的 vanishing viscosity method, 光滑化并塞入抛物项,构造逼近解。后用

压缩映射原理证明(这是一个证明 PDE 解的局部存在性时极其常用的套路)逼近解存在,再用一致估计造出弱极限,证明弱极限是原方程的解。注意:粘性法在椭圆方程和几何分析中是重要的。

2、傅立叶方法: 书上 7.3 节的例子并不好,可以换成证明 3D 质量临界的 Schrodinger 方程($iu_t+\Delta u=\pm|u|^{4/3}u$)解的局部存在性(需要少量调和分析知识补充,但不是主体)。利用插值得出自由方程解 L^p 范数衰减估计,再利用 TT*方法+Hardy-Littlewood-Sobolev 不等式得出 Strichartz 估计,即对方程齐次/非齐次部分的时间-空间 L^qL^r 估计,这个估计是用来确定方程解的存在于何种函数空间 X 的。之后,再将原方程化成积分方程,方程的解等价于解映射的不动点存在性,所以只需证明解映射是 $X\to X$ 的压缩映射,再利用压缩映射原理即可。而整体解存在性则需要守恒量与 scaling。

有关 Sobolev 空间的傅立叶刻画、Besov 空间等理论,最好另外学习,并且要会 Littlewood-Paley 理论才好理解。关于傅立叶刻画,可看 Folland 实分析第 9 章,或者 Bahouri 的 Fourier Analysis and Nonlinear PDE 一书的前两章(查结论);这部分的理解,可看 Tao 的非线性色散方程一书的附录 A。

3、变分法(第八章): 核心想法是把某个能量泛函的临界点(极小化子)等价于方程(也是该能量泛函的 Euler-Lagrange 方程)的解。

第八章前三节讨论的是基本定义与极小化子存在性、正则性,但注意正则性的估计不能推广到高阶,否则非线性的结构会被破坏(线性项求导仍是线性项,但非线性项求导之后,初始满足的限制条件可能不再满足)。第四节讨论的是某些限制条件下的极小化子,其中有一些重要的例子,例如到球面的调和映照、流体中的 Stokes 问题。

第五节则是引入了翻山定理(Mountain-Pass),去讨论 Euler-Lagrange 方程其他的解有何性质,这节的例子- $\Delta u=\pm |u|^{p\cdot 1}u$ 零边值问题在 p<临界指标(n+2)/(n-2)的情况(证明解存在)可与 9.4 节 p>(n+2)/(n-2)(证明星型域上只有 0 解)的情况放在一起学,后者是利用 8.6 节的诺特定理导出了 Derrick-Pohozaev 恒等式从而导出矛盾。这一节里面提到的 Palais-Smale 条件在 PDE 中很重要,可用于其它方程的证明中。例如 3D 质量临界的散焦 Schrodinger 方程的散射猜想证明的关键步骤就用到了它。

第八章第6节非常的重要,诺特定理给出了构造方程守恒律、单调量的方法。我们在一些问题的证明或解答中,经常会看见乘一项东西,分部积分之后就能构造出我们想要的守恒量、单调量。这些乘子的构造,实际上可以通过诺特定理给出:前提是你需要知道区域的移动和函数的变化。很多微分方程中有用的估计都可由诺特定理导出,例如波动方程的 Morawetz 恒等式就是由诺特定理,将波方程这个二阶方程化为一阶方程。

- 4、其它非变分方法(第九章): 单调量与不动点法(不止压缩映射原理,拓扑学中的 Brower 不动点定理、吉洪诺夫 Tychonoff 不动点定理)、上下解方法、移动平面法(椭圆方程)、梯度流方法(凸分析)。
- 5、非线性波动方程(第 12 章)Evans 避开了使用傅立叶分析,所以有一个 L4L12 估计没有证明。这套理论也可以利用傅立叶方法+Strichartz 估计完成

关于教学: 我认为基本内容(线性方程弱解理论)应该在两个月之内结束(Sobolev 空间+傅立叶刻画一个月,椭圆方程半个月,抛物方程半个月)。后两个月选讲第 8~12 章的部分内容(变分法+9.4 节 4~5 周,粘性法 1 周、傅立叶方法 1~2 周)。

调和分析初学建议:

预备知识:

- (1) 实分析: 积分收敛定理、基本的 Lp 不等式;
- (2) 泛函分析中的各种基本定义(只需要知道定义);

参考书:

- [1] Javier Duoandikoetxea: Fourier Analysis, GSM 19, AMS (2000);
- [2] Loukas Grafakos: Classical/Modern Fourier Analysis, GTM 249/250;
- [3] 苗长兴:调和分析及其在偏微分方程中的应用;
- [4] Camil Muscalu, Wilhelm Schlag: Classical and Multilinear Harmonic Analysis, Vol.1, 2014;
- [5] Elias M. Stein: Harmonic Analysis, 1993;
- [6] Elias M. Stein: 奇异积分和函数的可微性, 1971;
- [7] Thomas Wolff: Lecture Notes on Harmonic Analysis, 2003.

学习顺序:

第一部分: 古典调和分析(研究核心: 奇异积分)

(1) 傅立叶变换、H-L 极大函数(包括 Riesz-Thorin 插值、Marcinkiewicz 插值),这是后继作各类估计的基本工具。

参考: Folland 实分析的第 8、9 章相关内容,后者参考[1]的第二章;

(2) Calderon-Zygmund 奇异积分(卷积型): Calderon-Zygmund 分解是这里最重要的技术。 另外还有一些关于奇异积分逐点收敛的结果(齐次核+cδ)。

参考: [4]的第7章前3节,细节可查[6].

(3) H^1 与 BMO 空间: C-Z 奇异积分算子没有 L1, L∞这两个端点有界性,所以我们考虑修改函数空间。这部分是作为(2)的补充。但 BMO 空间在后继的学习,乃至多线性调和分析的估计中都会用到(见[4]第二卷前 2 章)。

参考: [1]的第6、7章。

(4)几乎正交原理——Littlewood-Paley 理论(乘子观点的奇异积分、频率空间局部化思想)

熟知卷积经过傅立叶变换后变成乘子形式,所以这部分的 Mikhlin-Hormander 乘子定理可以看作是乘子版本的 C-Z 奇异积分定理,而这在部分(流体/色散)PDE 的估计中往往比 C-Z 定理更加实用。同时,Littlewood-Paley 理论的核心想法就是"频率局部化"(| ξ |的大、小直接影响了函数的性质,需要分别估计)、"几乎正交"(Littlewood-Paley 投影只与相邻的有穷个有交),所谓"几乎"一词的含义,可参考 Stein 实分析第四章的习题 23,或者直接看 Cotlar 引理的内容。

参考: [4]的第 8.1, 8.2, 8.5, 9.1, 9.2, 9.3 节。

(5) T1 定理(非卷积型奇异积分)可以视作奇异积分部分的结束。T1 定理(及其衍生的 Tb 定理)在水波方程中也会用到。更重要的是,其证明过程中衍生出的工具,便是后来多 线性调和分析中仿积(Paraproduct)、多线性乘子定理(Coifman-Meyer 定理等)的雏形。可以说,这是一个走向多线性调和分析的定理,承上启下。

参考: [1]第9章、[2]的第二册。

第二部分: 近现代调和分析(震荡积分)

参考: [5]的第 8~10章,没有书比这写得更好了。简要了解可以看[4]的第 4、11章。

第一型震荡积分:衰减估计与固相法。

第二型震荡积分:傅立叶限制性估计。其来源可以看成是色散方程的解,但背后隐藏与联系的东西,却是当今调和分析四大猜想(傅立叶限制性猜想、局部光滑性猜想、Kakeya 猜想、

Bocher-Riesz 猜想)。

关于教学:

一个学期应该上完第一部分+第二部分的第一型震荡积分+Tomas-Stein 限制性估计。其中,傅立叶变换基本性质、广义函数、Lp 插值定理、H-L 极大函数的 Lp 有界性最好在高等实分析课程中完成。以便直接进入调和分析的主题内容。

关于调和分析在 PDE 中的应用:

[3]是字典型书籍,适合查结论,不适合拿来自学。

需要用到的主要是:

- (1)Sobolev 空间的 Fouier 或 L-P 刻画,及其衍生的函数空间 Besov 空间、Triebel-Lizorkin 空间、Bourgain X^{s,b}空间。
- (2) Littlewood-Paley 理论: Bernstein 不等式、仿积分解。
- (3) 乘子定理: Mikhlin-Hormander、Coifman-Meyer 等等。
- (4) 对色散方程: Strichartz 估计,这是证明 GWP+Scattering 的关键。