2019年（数一）真题答案解析

一、选择题

(1) C

解 $\tan x$ 的麦克劳林展开式为 $x+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$，

故 $x-\tan x\sim-\frac{1}{3}x^3$，则 $k=3$. 故应选 C.

(2) B

解 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的右导数 $\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\ln x$ 不存在，

则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的不可导点. $f(0)=0$，在 $x=0$ 点的左邻域内 $f(x)<0$，

右邻域内 $f(x)<0$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极大值点. 故应选 B.

(3) D

解 取 $u_n=-\frac{1}{\ln n}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$ 发散，A 错误.

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{u_n}$ 收敛，则由莱布尼茨判别法，$\frac{1}{u_n}$ 应单调递减趋向于零，

而由题意 $\{u_n\}$ 是单调增加的有界数列，则 $\frac{1}{u_n}$ 单调递减不趋于零，B 错误.

取 $u_n=-\frac{1}{n}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{u_n}{u_{n+1}}\right)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(-\frac{1}{n}\right)$ 发散，C 错误.

对于 D 选项：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2-u_n^2)=(u_2^2-u_1^2)+(u_3^2-u_2^2)+\cdots=\lim\limits_{n\to\infty}(u_{n+1}^2-u_1^2)$ 存在，

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2-u_n^2)$ 收敛. 故应选 D.

(4) D

解 曲线积分与数径无关，则应使 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，排除 A、B.

对于 C 选项，$x=0$ 不连续，排除. 故应选 D.

(5) C

解 设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，根据 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$ 得：$\lambda^2+\lambda=2$，解得 $\lambda=1$ 或 -2.

由于 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值的积为 $|\boldsymbol{A}|$ 的值，

故 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值为 1，-2，-2，正惯性指数为 1，负惯性指数为 2，

故二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的规范型为 $y_1^2-y_2^2-y_3^2$. 故应选 C.

(6) A

解 三张平面无公共交线，则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 无解 $\Rightarrow r(\boldsymbol{A})<r(\overline{\boldsymbol{A}})$，排除 B、D.

又因为三张平面两两相交，且交线相互平行，则齐次方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$

只有一个线性无关解，所以 $r(\boldsymbol{A})=2$，

故应选 A.

(7) C

解 由 $P(A\overline{B})=P(B\overline{A})$ 得

$P(A\overline{B})=P(A)-P(AB)=P(B\overline{A})=P(B)-P(AB)\Leftrightarrow P(A)=P(B)$.

故应选 C.

(8) A

解 由 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,$Y\sim N(\mu,\sigma^2)$,且相互独立,

则 $E(X-Y)=0$,$D(X-Y)=DX+DY=2\sigma^2$,得 $\dfrac{X-Y}{\sqrt{2}\sigma}\sim N(0,1)$,

故 $P\{|X-Y|<1\}=P\left\{\dfrac{|X-Y|}{\sqrt{2}\sigma}<\dfrac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right\}=2\Phi\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}\sigma}\right)-1$ 与 σ^2 有关,与 μ 无关.

故应选 A.

二、填空题

(9) $\dfrac{y}{\cos x}+\dfrac{x}{\cos y}$

解 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\cos x\cdot f'+y$,$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\cos y\cdot f'+x$,代入得

$\dfrac{1}{\cos x}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{\cos y}\cdot\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{y}{\cos x}+\dfrac{x}{\cos y}$. 故应填 $\dfrac{y}{\cos x}+\dfrac{x}{\cos y}$.

(10) $\sqrt{3e^x-2}$

解 $2yy'-y^2-2=0\Rightarrow\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{y^2+2}{2y}\Rightarrow\dfrac{2y}{y^2+2}dy=dx\Rightarrow\int\dfrac{2y}{y^2+2}dy=\int dx$,

则通解 $y^2+2=ce^x$,再由 $y(0)=1$,得 $c=3$,

故特解 $y=\sqrt{3e^x-2}$. 故应填 $\sqrt{3e^x-2}$.

(11) $\cos\sqrt{x}$

解 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}x^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}(\sqrt{x})^{2n}=\cos\sqrt{x}$. 故应填 $\cos\sqrt{x}$.

(12) $\dfrac{32}{3}$

解 将曲面方程代入积分表达式中,原积分 $=\iint\limits_{\Sigma}|y|\,dx\,dy$,

由于 Σ 关于 xoz 平面对称,则 $\iint\limits_{\Sigma}|y|\,dx\,dy=2\iint\limits_{\Sigma_1}y\,dx\,dy$,其中 Σ_1 为 Σ 的右半侧($y\geqslant 0$),

原积分 $=2\iint\limits_{D_{xy}}y\,dx\,dy$,其中 D_{xy} 为 Σ_1 在 xoz 平面的投影,

$D_{xy}=2\int_0^{\pi}d\theta\int_0^2 r^2\sin\theta\,dr=\dfrac{32}{3}$. 故应填 $\dfrac{32}{3}$.

(13) $\boldsymbol{x}=k(1,-2,1)^{\mathrm{T}}$,$k\in\mathbf{R}$

解 先计算 $\boldsymbol{A}$ 的秩,由于 $\boldsymbol{\alpha}_1$,$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,可知 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$;又由于 $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$,

可知 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$. 从而有 $r(\boldsymbol{A})=2$,$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系中含有一个向量.

由 $\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，可知 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，从而 $\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$ 即为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系.

$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k(1,-2,1)^{\mathrm{T}}$，故应填 $\boldsymbol{x}=k(1,-2,1)^{\mathrm{T}}$，$k$ 为任意常数.

(14) $\dfrac{2}{3}$

解 由随机变量 X 的概率密度 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 可知 X 的分布函数

$$F(X)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x^2}{4}, & 0\leqslant x<2,\\ 1, & x\geqslant 2,\end{cases} EX=\int_0^2 xf(x)\mathrm{d}x=\int_0^2 x\cdot\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\frac{4}{3},$$

$$P\{F(X)>EX-1\}=P\left\{F(X)>\frac{4}{3}-1\right\}=P\left\{\frac{X^2}{4}>\frac{1}{3}\right\}$$

$$=P\left\{X>\frac{2}{\sqrt{3}}\right\}=\int_{\frac{2}{\sqrt{3}}}^2\frac{x}{2}\mathrm{d}x=\frac{2}{3}.$$

故应填 $\dfrac{2}{3}$.

三、解答题

(15) **解** (Ⅰ) 这是一阶线性微分方程，由公式法可得方程的通解为

$$y=\mathrm{e}^{-\int x\mathrm{d}x}\left(\int\mathrm{e}^{\int x\mathrm{d}x}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x+C\right)=(x+C)\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}},$$

因为 $y(0)=0$，可知 $C=0$，则 $y=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$.

(Ⅱ) $y'=\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}+(-x^2)\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}=(1-x^2)\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$，进一步 $y''=x(x^2-3)\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$，

令 $y''=0$，得 $x=0$，$x=\pm\sqrt{3}$.

	$(-\infty,-\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3},0)$	0	$(0,\sqrt{3})$	$\sqrt{3}$	$(\sqrt{3},+\infty)$
y''	−	0	+	0	−	0	+
y	凸	拐点	凹	拐点	凸	拐点	凹

则函数的凸区间为：$(-\infty,-\sqrt{3})$，$(0,\sqrt{3})$，

凹区间为：$[-\sqrt{3},0)$，$[\sqrt{3},+\infty)$，

拐点：$(-\sqrt{3},-\sqrt{3}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}})$，$(0,0)$，$(\sqrt{3},\sqrt{3}\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}})$.

(16) **解** (Ⅰ) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=2ax$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=2by$，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(3,4)}=6a$，$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(3,4)}=8b$，

由于方向导数最大方向即为梯度方向，从而 $\dfrac{6a}{-3}=\dfrac{8b}{-4}$，所以 $a=b$ 且 $a<0$，$b<0$.

又由于 $6a\left(-\frac{3}{5}\right)+8b\left(-\frac{4}{5}\right)=10$，所以 $a=b=-1$.

（Ⅱ）要计算曲面 $z=2-x^2-y^2(z\geqslant 0)$（设为 Σ）的面积，只需对函数 l 在曲面上求第一型曲面积分.

即 $S=\iint\limits_{\Sigma}\mathrm{d}S=\iint\limits_{D}\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_{D}\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，

其中 D 为 Σ 在 xOy 平面上的投影，$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 2\}$.

用极坐标计算该积分可得 $S=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}}r\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r=\frac{13\pi}{3}$.

（17）**解**　由题意，所求面积为

$$S=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mid\sin x\mid\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x,$$

因为
$$\begin{aligned}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x&=-\mathrm{e}^{-x}\cos x\Big|_{n\pi}^{(n+1)\pi}-\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}\cos x\,\mathrm{d}x\\&=(-1)^n[\mathrm{e}^{-(n+1)\pi}+\mathrm{e}^{-n\pi}]-\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

得
$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\mathrm{e}^{-x}\sin x\,\mathrm{d}x=\frac{(-1)^n}{2}[\mathrm{e}^{-(n+1)\pi}+\mathrm{e}^{-n\pi}]$$

所以
$$S=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}[\mathrm{e}^{-n\pi}+\mathrm{e}^{-(n+1)\pi}]=\frac{\mathrm{e}^{\pi}+1}{2(\mathrm{e}^{\pi}-1)}.$$

（18）**解**　（Ⅰ）$a_{n+1}-a_n=\int_0^1 x^n(x-1)\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$.

因为在积分区间$[0,1]$上，$x^n(x-1)\sqrt{1-x^2}\leqslant 0$ 且不恒等于 0，

所以 $a_{n+1}-a_n<0$，即$\{a_n\}$ 单调减少.

当 $n\geqslant 2$ 时，因为 $a_n=\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$

$$\begin{aligned}&=-\frac{1}{3}x^{n-1}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1+\frac{n-1}{3}\int_0^1 x^{n-2}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x\\&=\frac{n-1}{3}\int_0^1 x^{n-2}\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x-\frac{n-1}{3}\int_0^1 x^n\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{n-1}{3}a_{n-2}-\frac{n-1}{3}a_n,\end{aligned}$$

所以 $a_n=\frac{n-1}{n+2}a_{n-2}(n=2,3,\cdots)$.

（Ⅱ）$\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{n-1}{n+2}\frac{a_{n-2}}{a_{n-1}}$.

因为$\{a_n\}$ 单调减少且 $a_n>0$，所以$\frac{n-1}{n+2}<\frac{a_n}{a_{n-1}}<1$，从而$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}=1$.

（19）**解**　设形心坐标$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$，由于 Ω 是关于 yOz 平面对称的，

由对称性可知 $\bar{x}=0$，由先二后一法可知：

$$\iiint\limits_{\Omega}\mathrm{d}V=\int_0^1\mathrm{d}z\iint\limits_{x^2+(y-z)^2\leqslant(1-z)^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\pi\int_0^1(1-z)^2\mathrm{d}z=\frac{\pi}{3},$$

$$\iiint_{\Omega} z\,dV=\int_0^1 dz \iint_{x^2+(y-z)^2\leqslant(1-z)^2} z\,dx\,dy=\frac{\pi}{12};$$

则 $\bar{z}=\dfrac{\iiint_{\Omega} z\,dV}{\iiint_{\Omega} dV}=\dfrac{1}{4}$.

$$\iiint_{\Omega} y\,dV=\int_0^1 dz \iint_{x^2+(y-z)^2\leqslant(1-z)^2} y\,dx\,dy,$$

其中 $\iint\limits_{x^2+(y-z)^2\leqslant(1-z)^2} y\,dx\,dy \xlongequal{u=y-z} \iint\limits_{x^2+u^2\leqslant(1-z)^2} (u+z)\,dx\,du$

$$=\iint_{x^2+u^2\leqslant(1-z)^2} z\,dx\,du=\pi z(1-z)^2,$$

则 $\iiint_{\Omega} y\,dV=\int_0^1 \pi z(1-z)^2\,dz=\dfrac{\pi}{12}$,

故 $\bar{y}=\dfrac{\iiint_{\Omega} y\,dV}{\iiint_{\Omega} dV}=\dfrac{1}{4}$,则形心为$\left(0,\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{4}\right)$.

(20) **解** （Ⅰ）由题目可知：

$\boldsymbol{\beta}=b\boldsymbol{\alpha}_1+c\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，代入可得$\begin{cases}b+c+1=1\\2b+3c+a=1\\b+2c+3=1\end{cases}$，解得$\begin{cases}a=3\\b=2\\c=-2\end{cases}$.

（Ⅱ）由于 $|(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})|=\begin{vmatrix}1&1&1\\0&0&-2\\0&1&-1\end{vmatrix}=2\neq 0$,

故 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，则 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 为 R^3 的一个基；

设过渡矩阵为 $\boldsymbol{C}$，则$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})\boldsymbol{C}$，进而有

$$\boldsymbol{C}=(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta})^{-1}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}2&2&0\\-1&0&2\\1&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&0\\-\frac{1}{2}&0&1\\\frac{1}{2}&0&0\end{pmatrix}.$$

(21) **解** （Ⅰ）因为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，所以 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$，$|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$，

即$\begin{cases}x-4=y+1,\\4x-8=-2y,\end{cases}$解得 $x=3,y=-2$.

（Ⅱ）矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的特征多项式为 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=(\lambda-2)(\lambda+1)(\lambda+2)$，

所以 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $2,-1,-2$.

由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值也为 $2,-1,-2$.

$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 2 的特征向量为 $\xi_1=(1,-2,0)^{\mathrm{T}}$；

$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -1 的特征向量为 $\xi_2=(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$；

$\boldsymbol{A}$ 的属于特征值 -2 的特征向量为 $\xi_3=(1,-2,-4)^{\mathrm{T}}$.

记 $P_1=(\xi_1,\xi_2,\xi_3)$,于是 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$.

$\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 2 的特征向量为 $\eta_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$;

$\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 -1 的特征向量为 $\eta_2=(1,-3,0)^{\mathrm{T}}$;

$\boldsymbol{B}$ 的属于特征值 -2 的特征向量为 $\eta_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

记 $P_2=(\eta_1,\eta_2,\eta_3)$,于是 $\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}$.

由 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2$,

得 $(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1})=\boldsymbol{B}$.

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&1&-2\\0&0&-4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&\frac{1}{3}&0\\0&-\frac{1}{3}&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\-2&-1&-2\\0&0&-4\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

(22) **解** (Ⅰ) Z 的分布函数为

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}\\&=P\{XY\leqslant z\mid Y=-1\}P\{Y=-1\}+P\{XY\leqslant z\mid Y=1\}P\{Y=1\}\\&=pP\{-X\leqslant z\}+(1-p)P\{X\leqslant z\}.\end{aligned}$$

当 $z<0$ 时,$F_Z(z)=pP\{X\geqslant -z\}+(1-p)\cdot 0=p\mathrm{e}^{z}$;

当 $z\geqslant 0$ 时,$F_Z(z)=p\cdot 1+(1-p)P\{X\leqslant z\}=1-(1-p)\mathrm{e}^{-z}$.

所以 Z 的概率密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}p\mathrm{e}^{z}, & z<0,\\(1-p)\mathrm{e}^{-z}, & z\geqslant 0.\end{cases}$$

(Ⅱ) $\begin{aligned}\mathrm{Cov}(X,Z)&=E(XZ)-EX\cdot EZ\\&=E(X^2Y)-EX\cdot E(XY)\\&=E(X^2)\cdot E(Y)-(EX)^2\cdot E(Y)\\&=DX\cdot EY\\&=1-2p,\end{aligned}$

$\mathrm{Cov}(X,Z)=0$,得 $p=\frac{1}{2}$. 所以 $p=\frac{1}{2}$ 时,X 与 Z 不相关.

(Ⅲ) 因为

$P\{X\leqslant 1,Z\leqslant -1\}=P\{X\leqslant 1,XY\leqslant -1\}=0$,

$P\{X\leqslant 1\}>0,P\{Z\leqslant -1\}>0$,

所以

$P\{X\leqslant 1,Z\leqslant -1\}\neq P\{X\leqslant 1\}P\{Z\leqslant -1\}$.

故 X 与 Z 不相互独立.

(23) **解** （Ⅰ）由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x;\sigma^2)\mathrm{d}x = 1$，得

$$1 = \int_{\mu}^{+\infty} \frac{A}{\sigma} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \mathrm{d}x = A\int_{0}^{+\infty} \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}} \mathrm{d}t$$

$$= A \cdot \frac{\sqrt{2\pi}}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}} \mathrm{d}t$$

$$= \frac{\sqrt{2\pi}}{2} A,$$

所以 $A = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$.

（Ⅱ）设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的观测值，则似然函数为

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\sigma^2)$$

$$= \begin{cases} \left(\frac{2}{\pi}\right)^{\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \mathrm{e}^{-\sum_{i=1}^{n}\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x_1, x_2, \cdots, x_n \geqslant \mu, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

对数似然函数为

$$\ln L(\sigma^2) = \frac{n}{2}\ln\frac{2}{\pi} - \frac{n}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2.$$

$$\frac{\mathrm{d}\ln L(\sigma^2)}{\mathrm{d}\sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2,$$

令 $\frac{\mathrm{d}\ln L(\sigma^2)}{\mathrm{d}\sigma^2} = 0$，得 σ^2 的最大似然估计值为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2$，

所以 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$.