选择题(每小题2分,共20分) (请将答案填写在首页的答题纸中,在本处答题无效!) AΔB=φ的充要条件是: A. A=B, B. $B=\phi$; C. $A=\phi$; D. $A\cap B=\phi$ 2. A={1,2,3}到 B={a, b, c, d, e}的单射的个数是: **A 6**0; B. 20; C. 120; D. 30_o |A|=7, A 中既自反又反对称二元关系的个数是: 3. A. 3^{21} : B. 0: C. 3^{42} . D. 2^{21} . 在无穷集合基数的讨论中,以下哪个说法不正确? 4. A. 可数集的幂集还是可数集。 B.连续统个连续统集的并集还是连续约 C.可数集与连续统的并集是连续统。 D.可数个可数集的并集还是可数集 5. 6个顶点的3条边的无向简单图有多少(同构的算一个) A. 3 C. 4 D. 6 B. 5 f 是集合 A 到 B 的单射,则: A. |A|=|B| **B**. |A|≤|B| C. |A|≥|B| B. 不能确定 7. 以下哪个答案可能是6个顶点的图的度数分布: A. (2,2,2,2,2,6) **B**. (1,1,1,1,1,1) (1,2,2,3,5,5)D. (3,3,3,3,3,4)C. n(n>1)个顶点的图, 去掉一个顶点, 可形成的最大支数和最小支数分别是: A. n 和 1 B. n-1 和 1 C. n-1 和 2 D. n 和 2 9. 图 G1 和 G2 同构, 下面哪条不正确?

B. G1 和 G2 边数相等 C. 如果 G1 有一个 m 度顶点,则 G2 也有一个 m 度顶点。

D. G1 的边数+G2 的边数=完全图的边数

A. G1 和 G2 顶点数相等

10. 色数是1的图当且仅当是?

A.1 个顶点 B. 偶图 C. 稀疏图 D.零图

二、判断题(每小题2分,共10分)

(对的打√, 错的打×, 请将答案填写在首页的答题纸中, 在本处答题无效!)

- 1. 去掉一个割点可以形成很多分支,去掉桥正好形成两个分支。√
- 2. 简单来说,映射和关系都可以看做是笛景尔积的子集。√
- 3. 既对称又反对称的关系是存在的。√
- 4. 极大平面图不一定是连通图×
- **Ź 5. A, B** 为集合,则 **A×B⊆A** 不可能成立。

三、简答题(每小题5分,共40分)

- 1. 简述: (1) 简述什么是等价关系? (2分)
 - (2) 给出集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 上的一个 6 个元素的等价关系 (3 分)
- 答: (1) 具有自反性,对称性,传递性的关系称作等价关系。
 - (2) {(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (a, b), (b, a) }
- 2. (1) 简述哈斯图的画法

(2分)

(2) 画出集合 A = {a, b, c, d, e}上的偏序关系 R={(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, b), (a, c), (a, d), (a, e), (b, c), (b, d), (b, e), (c, d), (c, e), (d, e)}的哈斯图(3分)


答: (1)

偏序关系是自反的,因此其关系图中,每个节点上都有环。既然都有,就可以省略。

由于反对称性,x, y 之间只能有一条有向边。如果从 x 到 y 有边,则把 y 放在 x 上方。表示箭头的方向。这样就可以省略箭头。

偏序关系是传递的,只要有(x, y)和(y, z),就必然有(x, z),因此只要在前驱和后继之间连线即可。

(2)



3. (1) 简述什么是关系 R 的相容闭包。

(2分)

- (2) 给出集合 $A = \{a, b, c, d, e\}$ 上的关系 $R = \{(a, b), (a, c), (a, d)\}$ 的相容闭包 (3分)
- 答: (1) 包含 R 的自反对称关系的交集成为 R 的相容闭包。
 - (2) {(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, b), (b, a), (a, c), (c, a), (a, d), (d, a)}
- 4. (1) 说明什么是欧拉图? 什么是哈密顿图?


(2分)

(2) 给出一个既是欧拉图又是哈密顿图的图。

(3分)

答: (1) 包含图 G 的所有顶点和所有边的闭迹称为欧拉闭迹,有欧拉闭迹的图成为欧拉图。

包含图 G 的所有顶点的圈成为哈密顿圈,有哈密顿圈的图称为哈密顿图。 (2)




- 5. (1) 说明什么是顶点连通度、边连通度和最小度? (2分)
 - (2) 现有1个图的的顶点连通度、边连通度和最小度分别为3,4,5,请画出这个图。 (3分)

答: (1)

图 G 的顶点连通度 $\kappa=\kappa$ (G) 是为了产生一个不连通图或平凡图 所需要从 G 中去掉的最少顶点的数目。

图 G 的边连通度 $\lambda=\lambda$ (G) 是为了使 G 产生不连通图或平凡图所需要从 G 中去掉的最少边数。

(2)



6. (1) 说明什么是割点? 桥和割集?

- (2分)
- (2) 画出一个图,该图中有两个割点和两个桥。

(3分)


答: (1)

设 v 是图 G 的一个顶点,如果 G-v 的支数大于 G 的支数,则称顶点 v 为图 G 的一个割点。

图 G 的一条边 x 称为 G 的一座桥,如果 G-x 的支数大于 G 的支数。

图 G=(V,E), $S\subseteq E$,如果从 G 中去掉 S 中的所有边得到的图 G-S 的支数大于 G 的支数,而去掉 S 的任一真子集中的边得到的图的支数不大于 G 的支数,则称 S 为 G 的一个割集。


(2)



- 7. (1) 简述什么是左逆映射和存在左逆映射的条件?
- (2分)

(2) 给出如下映射 f 的两个左逆映射。

(3分)



答: (1) 设 f: $X \rightarrow Y$, 如果存在一个映射 h: $Y \rightarrow X$, 使得: $hf = I_x$, 则称映射 f

是左可逆的, h 称为 f 的左逆映射

- (2) $\{(a, 1), (b, 2), (c, 3), (d, 1)\}\$ $\{(a, 1), (b, 2), (c, 3), (d, 2)\}\$
- 8. (1) 简述什么树。

(2分)

(2) 给出树的三个性质(定义中的性质除外)

(3分)

答:(1)无圈的连通图成为树。

(2) 设顶点数为 p, 边数为 q, 则 p = q+1 去掉一条边, 正好形成两个支 加一条边,形成唯一的一个圈

树是偶图

至少有两个1度顶点

四、证明题(每小题5分,共10分)

1. 证明:证明恰有两个一度顶点的树是一条路。

证明:用归纳法

当 p=2 时成立

设 p=k 时成立

当 p=k+1 时, 去掉一条边正好形成两个树,

可证每棵树恰有两个一度顶点或只有一个顶点。

也就是说每棵树要么是一条路,要么是一个顶点,

合起来还是一条路。

2. 设 R, S 都是非空集合 A 上的二元关系, 且他们都是对称的。证明: R°S 具有 对称性当且仅当 $R^{\circ}S = S^{\circ}R$ 。

证明:

(1) 如果 R°S 具有对称性, \forall (x, z) \in R°S,则: (z, x) \in R°S, \exists y, (z, y) $\in R$, $(v, x) \in S$, 由 R, S 的对称性得:

 $(y, z) \in R$, $(x, y) \in S$, 因此 $(x, z) \in S^{\circ}R$, 因此 $R^{\circ}S \subset S^{\circ}R$

 \forall (x, z) \in S°R, \exists y, (x, y) \in S, (y, z) \in R, 由 R, S 的对称性得: $(y, x) \in S$, $(z, y) \in R$, 因此 $(z, x) \in R^{\circ}S$, 由 $R^{\circ}S$ 的对称性, $(x, z) \in R^{\circ}S$ 因此 S°R ⊆ R°S

因此 R°S = S°R

(2) 如果 $R^{\circ}S = S^{\circ}R$ 。 $\forall (x, z) \in R^{\circ}S$, $\exists y$, $(x, y) \in R$, $(y, z) \in S$,由 R, S 的对称性得:

 $(y, x) \in R$, $(z, y) \in S$, 因此 $(z, x) \in S^{\circ}R$, $(z, x) \in R^{\circ}S$, 所以: R°S 对称

五、计算题(每小题5分共20分)

【1.集合|A|=5, 计算 A 上商集基数为 3 的等价关系的个数。(计算结果并给出步骤)

答:

设 A={a, b, c, d, e}, 则 A 的三划分有:

 $\{\{a\},\{b\},\{c,d,e\}\},\{\{a\},\{c\},\{b,d,e\}\},\{\{a\},\{d\},\{b,c,e\}\},\{\{a\},\{e\},\{b,c,d\}\},$

 $\{\{b\}, \{c\}, \{a, d, e\}\}, \{\{b\}, \{d\}, \{a, c, e\}\}, \{\{b\}, \{e\}, \{a, c, d\}\},\$

 $\{\{c\}, \{d\}, \{a, b, e\}\}, \{\{c\}, \{e\}, \{a, b, c\}\}$

 $\{\{d\}, \{e\}, \{a, b, c\}\}\$

C(5, 2)=10

 $\{\{a\}, \{b, c\}, \{d, e\}\}, \{\{a\}, \{b, d\}, \{c, e\}\}, \{\{a\}, \{b, e\}, \{c, d\}\}\}$

 $C(5, 1) \times C(4, 2)/2=15$


A上商集基数为3的等价关系的个数为25

2. 求 K₄ 的子图的个数(计算出结果并给出说明)。

答:

- 1个节点的子图个数为4
- 2个节点的子图个数为 C(4,2)*2=12
- 3 个节点的子图的个数为 C(4,3)*2³=32
- 4个节点的子图的个数为26=64

K4的子图的个数是112



答:

设A为E上自反关系的个数,B为E上反自反关系的个数,C为E上对称关系的个数。

则原题要求的个数为

$$\begin{split} |A^c \cap B^c \cap C^c| &= N \\ &\quad - |A| - |B| - |C| \\ &\quad + |A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| \\ &\quad - |A \cap B \cap C| \\ \\ &= 2^{n \times n} - 2^{n(n-1)} - 2^{n(n-1)} - 2^{n(n+1)/2} \\ &\quad + 0 + 2^{n(n-1)/2} + 2^{n(n-1)/2} \\ &\quad - 0 \\ &= 2^{n \times n} - 2^{n(n-1)} - 2^{n(n-1)} - 2^{n(n+1)/2} + 2^{n(n-1)/2} + 2^{n(n-1)/2} \\ &\stackrel{\longrightarrow}{\mathbb{R}} \\ &= 2^{n \times n} - 2^{n(n-1)+1} - 2^{n(n+1)/2} + 2^{n(n-1)/2+1} \\ &\stackrel{\longrightarrow}{\mathbb{R}} \\ &= (2^n - 2)(4^{(n \times n - n)/2} - 2^{(n \times n - n)/2}) \\ &\stackrel{\longrightarrow}{\mathbb{R}} \\ &= (2^n - 2)(2^{n(n-1)} - 2^{n(n-1)/2}) \\ &\stackrel{\longrightarrow}{\mathbb{R}} \\ &= (2^n - 2)(2^{n \times n - n} - 2^{(n \times n - n)/2}) \end{split}$$

4 求集合 A={a, b, c, d}到集合 B={1, 2, 3}的满射的个数 答:

设Ai为i没有原象映射集合,则从A到B的满射个数是:

$$\begin{aligned} & |\overline{A}_{1} \cap \overline{A}_{2} \cap \overline{A}_{3}| \\ &= N - \sum_{i=1}^{3} |A_{i}| + \sum_{i=1}^{3} \sum_{j>i} |A_{i} \cap A_{j}| \\ &- |A_{1} \cap A_{2} \cap A_{3}| \\ &= 3^{4} - C(3,1)(3-1)^{4} + C(3,2)(3-2)^{4} - C(3,3)0^{4} \\ &= 81 - 48 + 3 \\ &= 36 \end{aligned}$$